QE
1
N48
Index
1860-69
NH

S. I. LIBRARY

Allgemeines

# REPERTORIUM

für das

**Decennium 1860—1869.**

QE
148
.N48
Index
1860-69
NH

# Allgemeines

# Repertorium

der

## Mineralogie, Geologie und Paläontologie,

für das

## Decennium 1860—1869.

**Ein Real-, Personal- und Lokal-Index**

zu den in

**Leonhard's & Geinitz's** Neuem Jahrbuch

für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Jahrgänge 1860—1869, enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Auszügen.

---

**STUTTGART.**

Druck und Verlag von Friedrich Schweizerbart.

1870.

LIBRARY

Smithsonian Institution
Natural History
OCT 22 1902

# I. Autoren-Register.

## A.

A. bedeutet Aufsatz, — B. briefliche Mittheilung, R. Referat, Recension, Anzeige selbst ständiger Schriften. Dis Autor-Namen in blossen Bücher- und Aufsatz-Titeln sind nicht beachtet.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Abich, H.: über den Meteoriten von Stawropol R. | 1862 | 108 |
| — — über Daghestan. R. | 62 | 371 |
| — — geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes. R. | 69 | 604 |
| Agassiz: „on the Embryology of Echinoderms". R. | 66 | 117 |
| — — Löss-Bildungen im Thale des Amazonen-Stromes. B. | 67 | 180 |
| — — das Essex-Institut in Salem. B. | 67 | 593 |
| — — „glacial phenomena in Maine". R. | 67 | 621 |
| Agassiz, L.: über den Ursprung des Löss. A. | 67 | 676 |
| Allport: fossile Reste von Bahia. R. | 60 | 494 |
| — — dasselbe. R. | 60 | 764 |
| Althaus, v.: die Blätter Carlsruhe und Freiburg der geognostischen Karte von Baden. B. | 60 | 328 |
| Anca: zwei neue Knochenhöhlen in Sicilien. R. | 60 | 743 |
| — — Elephas Africanus fossil in Sicilien. R. | 61 | 505 |
| — — Elephas primigenius bei Palermo. B. | 63 | 346 |
| Anca und Gemmellaro: „monografia degli elephanti fossili di Sicilia. R. | 68 | 247 |
| Andrae: Pseudomorphosen nach Steinsalz. R. | 61 | 573 |
| — — Eisenkies-Nieren mit organischen Resten in der Steinkohlen-Formation. R. | 61 | 746 |
| — — Lias-Conchylien bei Echternach in Luxemburg. R. | 63 | 383 |
| — — fossile Farren aus der preussischen Steinkohlen-Formation. R. | 63 | 497 |
| — — „Lehrbuch der gesammten Mineralogie. 1. Bd. Oryktognosie". R. | 65 | 89 |
| — — vorweltliche Pflanzen aus dem Steinkohlen-Gebirge der preussischen Rheinlande und Westphalens. R. | 67 | 249 |
| André, J.: Studien über die Verwitterung des Granits | 67 | 209 |
| Andree, R.: die Versteinerungen der Steinkohlen-Formation von Stradonitz in Böhmen. A. | 64 | 160 |
| Andrian, F. v.: geologische Verhältnisse im Satzawa-Thale. R. | 61 | 747 |
| — — Gneiss-Gebiet des Czaslauer und Chrudimer Kreises. R. | 63 | 203 |
| — — Umgegend von Deutschland in Böhmen. R. | 63 | 731 |
| — — der s. Abhang der kleinen Karpathen R. | 64 | 483 |
| — — geologische Verhältnisse der kleinen Karpathen. R. | 65 | 500 |
| — — chemische Untersuchung von Trachyt-Gesteinen von Schemnitz. R. | 66 | 735 |
| d'Archiac: die Corbières. R. | 60 | 101 |
| — — über Otostoma. R. | 60 | 767 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| d'Archiac: Schichten-weise Verbreitung und Synonymie einiger Rhizopoden. R. | 1861 | 634 |
| Arents: Partzit, ein neues Mineral. R. | 67 | 476 |
| Armbrust: Feuerstein-Kreide mit Foraminiferen in Hannover. B. | 60 | 220 |
| Arnaud: Kreide der Dordogne. R. | 63 | 126 |
| Auerbach: Kohlen in Central-Russland. R. | 60 | 738 |
| — — chemische Zusammensetzung des Meteoriten von Tula. R. | 63 | 362 |
| — — der Kalkstein von Malöwka. R. | 74 | 373 |


## B.


| | | |
|---|---|---|
| Baily: Graptolithen in der unteren Silur-Formation der Grafschaften Meath, Tipperary und Clare. R. | 63 | 114 |
| — — Balinurus-Arten aus der Steinkohlen-Formation von Irland. R. | 63 | 868 |
| — — cambrische Gesteine der britischen Inseln. R. | 66 | 108 |
| — — fossile Reptilien in der Steinkohle dea s. Irland R | 66 | 621 |
| — — fossile Pflanzen aus d. s. Irland. R. | 66 | 636 |
| — — Structur des Palaechinus. R. | 66 | 637 |
| — — „figures of characteristic british fossils". R. | 68 | 373 |
| Bain: zur Geologie Südafrika's. R. | 61 | 638 |
| Balch: Orthit von Swampscot in Massachusetts. R. | 63 | 471 |
| Barbot de Marny: über Kämmererit. R. | 61 | 699 |
| — — Steinkohle in Russland. R. | 61 | 725 |
| — — Beschreibung der Astrachanskischen Steppe. R. | 64 | 374 |
| — — jüngere Ablagerungen des s. Russland. R. | 67 | 252 |
| — — dyadische Fossilien bei Soligalith. B. | 67 | 345 |
| — — Bericht über eine Reise 1865 in Galizien, Volhynien und Podolien. R. | 67 | 630 |
| — — Ergebnisse seiner geologischen Untersuchungen in Russland; die Trias ist die verbreitetste Formation. B. | 68 | 724 |
| — — über russische dyadische Fossilien B. | 69 | 60 |
| Barkas: über Climaxodus und Poecilodus. R. | 69 | 620 |
| Barrande, J.: die Lehre von den Colonien. B. | 60 | 62 |
| — — Trilobiten der Primordial-Fauna in Massachusetts. B. | 60 | 429 |
| — — über die regelmässige periodische Abstossung der Schaale bei gewissen paläolithischen Cephalopoden. A. | 60 | 641 |
| — — neue Beweise einer weiteren Verbreitung der Primordial-Fauna in Nordamerika. A. | 60 | 769 |
| — — geologische und paläontologische Erscheinungen in Canada. A. | 61 | 286 |
| — — Supplemente zu seiner Silur-Fauna Böhmens; über die Primordial-Fauna Nordamerika's. B. | 62 | 336 |
| — — „Défence des Colonies". I. R. | 62 | 99 |
| — — dasselbe. II. R. | 62 | 225 |
| — — über Dalmaniopsis. B. | 63 | 85 |
| — — neue Beweise für die Primordial-Fauna in N.-Amerika. R. | 63 | 748 |
| — — die Kablikia silurica. B. | 63 | 813 |
| — — Primordial-Fauna bei Hof. R. | 64 | 119 |
| — — Vertretung der böhmischen Colonien im Silurbecken des n.w. Frankreichs und in Spanien. R. | 64 | 120 |
| — — „Défence des Colonies". III. R. | 65 | 631 |
| — — Vorkommen von Landpflanzen im Silurbecken von Böhmen. B. | 66 | 209 |
| — — Beleuchtung einiger Ansichten über die Colonien. A. | 66 | 293 |
| — — „systéme silurien du centre de la Bohême. vol. II. Cephalopodes. R. | 66 | 622 |
| — — die Fauna in den Schiefern von Hof zeigt den engen Zusammenhang zwischen der primordialen und der zweiten Fauna. B. | 67 | 181 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Barrande, J.: Arethusina Koninecki bezeichnet die erste Phase der dritten Silurfauna Böhmens. B. | 1867 | 702 |
| — — „Système silurien du centre de la Bohême". R. | 67 | 753 |
| — — Système silurien du centre de la Bohême. I. Recherches paléontologiques. R. | 68 | 115 |
| — — Wiedererscheinung der Gattung Arethusina. A. | 68 | 257 |
| — — „Système silurien du centre de la Bohême. I. Recherches paléontologiques. vol. II. Cephalopodes". R. | 68 | 638 |
| — — silurische Fauna aus der Umgebung von Hof in Baiern. A. | 68 | 641 |
| — — über die Entdeckung der Calymene ceratophthalma bei Dudley; über Hyponeme Sarsi; Entdeckung monocotyledoner Pflanzen in untercambrischen Schichten. B. | 69 | 211 |
| — — über Nicholson's Arbeit über die Schiefer von Coniston. B. | 69 | 353 |
| Barret: Kreide-Gesteine auf Jamaika. R. | 60 | 751 |
| Bauermann: zur Geologie von Vancouvers-Insel. R. | 60 | 746 |
| Beck, W.: Analysen russischer Mineralien. R. | 63 | 468 |
| E Becker: über das Mineral-Vorkommen im Granit von Striegau. R. | 69 | 236 |
| — — über die trigonale Pyramide P2 an Quarz von Baveno. R. | 69 | 748 |
| Becker und Ludwig: geologische Karte des Grossherzogthums Hessen; Dieburg. R. | 62 | 373 |
| Beckles: fossile Fährten in den Sandsteinen von Elgin. R. | 60 | 107 |
| — — Saurier-Fährten in der Wealden-Formation der Insel Wight. R. | 63 | 760 |
| Beggiato: fossile Früchte vom Monte Bolca. R. | 68 | 254 |
| Behn: Osteologie der Dronte, Didus ineptus. R. | 68 | 766 |
| Beissel: Bryozoen der Aachener Kreidebildung. R. | 66 | 629 |
| Bell: a Monograph of the fossil Malacostracous Crustacea of Great Britain. R. | 64 | 115 |
| Belli: sulla mare delle rocce liquide sotta crosta solida terrestre". R. | 65 | 246 |
| Bellinger: Braunstein-Vorkommen in den Provinzen Huelva und Almeria in Spanien. R. | 65 | 483 |
| Belt: die Lingula-Flags oder Festiniog-Gruppe des Dolgelly Districtes. R. | 68 | 376 |
| Benecke, W.: über Trias und Jura in den Südalpen. R. | 66 | 370 |
| — — Bedeutung des Ammonites scissus und A. tatricus. B. | 66 | 71 |
| — — über das Alter des calcaire de la Porte-de-France. A. | 67 | 60 |
| — — Bericht über seine bisherigen Untersuchungen des Muschelkalkes am unteren Neckar; Übereinstimmung mit Würzburg. B. | 67 | 450 |
| — — geognostisch-paläontologische Beiträge. R. | 67 | 499 |
| Beneden, van: zu St. Nicolas gefundene Seethier-Knochen. R. | 60 | 372 |
| — — Squalodon Antwerpiensis. R. | 62 | 750 |
| Bennigsen-Förder, v.: das nordeuropäische und besonders das vaterländische Schwemmland. R. | 64 | 95 |
| Berendt, G.: die Diluvial-Ablagerungen der Mark Brandenburg. R. | 64 | 96 |
| — — marine Diluvial-Fauna in Westpreussen. R. | 67 | 252 |
| — — Geologische Karte der Provinz Preussen. R. | 69 | 106 |
| Bergemann: Konit in Basalt am Siebengebirge. R. | 61 | 697 |
| — — Pastréit, ein neues Mineral. R. | 67 | 611 |
| Bergeron: Phosphorescenz einer Varietät von Lapis Lazuli. R. | 60 | 571 |
| Bernoulli: über Wolfram. R. | 61 | 492 |
| — — über Kieserit. R. | 61 | 574 |
| Bertelli: electrische Versuche an den Schwefelquellen von Fornovo in Parma. R. | 67 | 752 |
| Beust, C. v.: Contact-Einfluss der Gesteine auf Erzführung der Gänge. R. | 62 | 492 |
| — — die Gänge der barytischen Bleiformation. R. | 64 | 481 |
| Beverley, Burton: Beiträge zur Mineralogie. R. | 68 | 747 |
| Bevrich: Semnopitecus Pentelicus. R. | 61 | 384 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Beyrich: zwei im deutschen Muschelkalk noch nicht bekannte Avicula-Arten. R. | 1862 | 753 |
| — — St. Cassianer Versteinerungen bei Füssen. R. | 63 | 239 |
| — — Kohlenkalk bei Konpang auf Timor; die neue Gattung Hypocrinus. R. | 63 | 383 |
| — — Lagerung der Lias- und Jura-Bildungen bei Vils. R. | 63 | 748 |
| — — Schaumkalk bei Lauterberg am Harz. R. | 64 | 720 |
| — — Gyps am s. Harzrand. R. | 65 | 873 |
| — — Kohlenkalk-Fauna in Timor. R. | 65 | 886 |
| — — über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und verwandte Arten. R. | 68 | 123 |
| Bibra, v.: chemische Bestandtheile einiger Sandsteine. R. | 63 | 226 |
| — — über Kupfererze aus der Algodon-Bay. R. | 66 | 227 |
| Bigsby: paläolithisches Gebirge in New-York. R. | 60 | 236 |
| — — paläolithisches Central-Becken in N.-Amerika. R. | 61 | 109 |
| — — über Thesaurus siluricus. R. | 67 | 757 |
| Billings: neue unter- und mittelsilurische Evertebraten aus Canada. R. | 62 | 238 |
| — — neue Arten aus der unteren Silurformation. R. | 64 | 378 |
| — — Parallelismus der Quebec-Gruppe mit dem Llandeilo in England und der Chazy-Gruppe in N.-Amerika. R. | 64 | 501 |
| — — neue Phillipsia-Arten aus Neu-Schottland. R. | 64 | 509 |
| — — die inneren Spiralbänder von Cyrtina. R. | 64 | 509 |
| — — Überreste fossiler Elephanten in Canada. R. | 64 | 509 |
| — — Veränderung des Namens Stricklandia. R. | 64 | 751 |
| — — über M'Coy's Gattung Athyris. R. | 68 | 372 |
| — — Beschreibung zweier neuer Arten von Stricklandinia. R. | 68 | 372 |
| Binkhorst van den Binkhorst: Monographie des Gastéropodes et de Céphalopodes de la craie supérieure de Limbourg. I. R. | 61 | 878 |
| Binney: Sigillaria und ihre Wurzeln. R. | 63 | 117 |
| — — Pflanzen aus der Kohlenformation von Lancashire. R. | 63 | 118 |
| — — „observations on the structure of fossil plants found in the carboniferous strata. R. | 69 | 381 |
| — — über carbonische, permische und triadische Schichten von Cumberland und Dumfries. R. | 64 | 863 |
| — — über die Gattung Polyporites. R. | — | — |
| — — Structur der Stigmaria und Sigillaria. R. | 66 | 248 |
| — — fossile Pflanzen, welche Structur zeigen, aus den unteren Steinkohlen-Lagern von Lancashire und Yorkshire. R. | 66 | 510 |
| — — die obere Steinkohlenformation in England und Schottland. R. | 67 | 493 |
| Bischof, C.: quantitative Bestimmung der absoluten und relativen Menge der Alkalien in festen und verwitterten Basalten. R. | 65 | 342 |
| Blake, W.: Geologie des Felsgebirges bei Santa-Fé. R. | 60 | 365 |
| — — „California minerals". R. | 67 | 195 |
| Blanchet: über Palaeobates Agassizi. R. | 62 | 753 |
| Blandford: über die Geologie eines Theiles von Cutch. R. | 68 | 108 |
| Bleekrode: Platin von Goenoeng auf Borneo. R. | 60 | 231 |
| Blomstrand: über neue schwedische Mineralien. R. | 69 | 481 |
| Bluhme: Braunbleierz von der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnstein. R. | 68 | 848 |
| Blum, R.: Handbuch der Lithologie oder Gesteinslehre. R. | 60 | 363 |
| — — Rösslerit, ein neues Mineral. R. | 61 | 335 |
| — — Pseudomorphosen in der Wetterau. R. | 61 | 486 |
| — — Foyait, ein neues Gestein aus Süd-Portugal. A. | 61 | 426 |
| — — neue Fundorte von Mineralien in der Wetterau. R. | 61 | 574 |
| — — der Epidot in petrographischer und genetischer Beziehung. A. | 62 | 419 |
| — — das Manebacher Gesetz am Feldspath. B. | 63 | 343 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Blum, R.: grosse Apophyllit-Krystalle. R. | 1863 | 464 |
| — — dritter Nachtrag zu den Pseudomorphosen. R. | 63 | 538 |
| — — über Olivin-Pseudomorphosen. R. | 63 | 832 |
| — — Pseudomorphosen von Epidot und Quarz nach Fassait. A. | 64 | 41 |
| — — über einige Pseudomorphosen. A. | 65 | 257 |
| — — Krystall-Formen des Anhydrit von Stassfurt. B. | 65 | 600 |
| — — die Mineralien, nach den Krystallsystemen geordnet. R. | 66 | 456 |
| — — bunter Sandstein in Formen von Kalkspath. A. | 67 | 320 |
| — — nähere Angaben des Fundortes des von ihm beschriebenen bunten Sandsteins in Formen von Kalkspath. B. | 67 | 839 |
| — — über die Concretionen genannten begleitenden Bestandmassen mancher Gesteine. A. | 68 | 294 |
| — — eigenthümliche Augit-Krystalle vom Wolfsberg bei Czernoschein in Böhmen und vom Puy de la Vache in der Auvergne. B. | 68 | 464 |
| — — über einige Pseudomorphosen. A. | 68 | 805 |
| — — Pseudomorphose von Epidot nach Granat; ausgezeichneter Topas-Krystall aus dem Ilmengebirge im Mineralien-Cabinet der Universität Heidelberg B. | 69 | 721 |
| Bock: über Beyrichia Grewingkii. B. | 67 | 592 |
| Bölsche: die Korallen des norddeutschen Kreide- und Jura-Gebirges. R. | 67 | 635 |
| Böttger: vanadinhaltiges Bohnerz von Salzgitter. R. | 64 | 365 |
| Boll: paläontologische Kleinigkeiten aus Geschieben Mecklenburgs. R. | 60 | 244 |
| Bombicci: „notice intorno alcuni minerali italiani". R. | 68 | 750 |
| Boricky: über das Meteoreisen von Karthago. B. | 66 | 808 |
| — — über den Delvauxit von Neuacovic in Böhmen. R. | 67 | 608 |
| — — Dufrenit, Beraunit und Kakoxen von der Grube Hrbek bei St. Benigna, Böhmen. R. | 68 | 81 |
| Bornemann: Pflanzen-Reste in Quarz-Krystallen. R. | 62 | 728 |
| Bosquet: die fossile Gasteropoden-Sippe Sandbergeria. R. | 61 | 507 |
| Boucheporn und Raulin: Geologie des Meerbusens von Panama. R. | 60 | 89 |
| Boucher de Perthes: über das Diluvium, welches im Sommethale die Steingeräthe enthält. R. | 62 | 617 |
| Boué, A.: dolomitische Breccie bei Vöslau als ein Beispiel für den Dolomitisations-Process. B. | 66 | 574 |
| — — geologische Gruppen in der Türkei. R. | 66 | 857 |
| — — über die Rolle der Veränderungen des unorganischen Festen im grossen Maassstabe der Natur. R. | 68 | 762 |
| Bourgeois: Vertheilung der Arten in der Kreide des Dep. Loire-et-Cher. R. | 63 | 219 |
| Boussingault: Guano am stillen Meere. R. | 61 | 206 |
| — — Stickstoff-Gehalt des Eisens in den Meteorsteinen. R. | 62 | 600 |
| Bradley: neuer Conocephalites aus Potsdam-Sandstein. R. | 61 | 113 |
| Brady: Katalog der lebenden Foraminiferen von Northumberland und Durham. R. | 66 | 119 |
| Brandt: A.: Mastodon tapiroides bei Nikolajew. R. | 61 | 371 |
| — — Rhytina-Skelette. R | 62 | 507 |
| — — über die Naturgeschichte des Mammuth. R. | 66 | 757 |
| — — zoogeographische und paläontologische Beiträge. R. | 67 | 495 |
| — — nochmaliger Nachweis der Vertilgung der nordischen oder Steller'schen Seekuh, Rhytina borealis. R. | 67 | 498 |
| — — Kurze Bemerkungen über aufrecht stehende Mammuth-Leichen. R. | 69 | 876 |
| Braun, Fr.: Versuchs-Bau auf Kohlen auf der Theta; Ostrakopoden im Muschelkalk. B. | 60 | 62 |
| — — das versteinerte Holz von Bayreuth. B. | 60 | 494 |
| — — Schädel von Placodus bei Bayreuth. B. | 60 | 692 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Braun, F.: Thiere in den Pflanzenschiefern von Bayreuth. R. | 1861 | 510 |
| — — einige fossile Pflanzen und ihre Lagerstätte am Saserberg bei Bayreuth. R. | 62 | 895 |
| — — über fossile Pflanzen in Franken. B. | 63 | 84 |
| — — Beiträge zur Urgeschichte der Pflanzen. R. | 63 | 119 |
| — — Pflanzenreste im Pallisyen-Sandstein. B. | 63 | 190 |
| — — über Placodus-Schädel; Analogien in der Vegetations-Periode der paläozoischen und Trias-Formation. B. | 63 | 348 |
| — — Placodus gigas und P. Andriani. R. | 63 | 510 |
| Braun, W. v.: über sphäroidische Concretionen. R. | 65 | 629 |
| Brauns: der Sandstein bei Seinstedt. R. | 63 | 748 |
| Breithaupt, A: Pseudomorphosen von Anhydrit. R. | 60 | 229 |
| — — die 13 Krystallsysteme des Mineralreichs und deren optisches Verhalten. R. | 60 | 341 |
| — — neues Vorkommen von Prehnit. R. | 60 | 444 |
| — — regelmässige Verwachsung je zweier Felsit-Arten. R. | 60 | 445 |
| — — Timazit, neue Gebirgsart in Serbien. R. | 60 | 843 |
| — — Dachschiefer mit Eisenkies-Eindrücken. R. | 61 | 189 |
| — — Verwachsung von zweierlei Mineralien, die Pseudomorphosen ähnlich. R. | 61 | 575 |
| — — neue Krystallformen bekannter chemischer Verbindungen im Mineralreich. R. | 62 | 483 |
| — — Meteoreisen von Rittersgrün. R. | 62 | 490 |
| — — das Manebacher Gesetz. B. | 63 | 814 |
| — — über den Spiauterit. R. | 63 | 837 |
| — — über Cuprein, oder hexagonalen Kupferglanz. R. | 63 | 838 |
| — — über den Christophit. R. | 64 | 79 |
| — — über den Quarz von Euba. R. | 64 | 480 |
| — — Gold-Bergbau in England. R. | 65 | 323 |
| — — Fauserit, ein neues Mineral. R. | 65 | 479 |
| — — über den Stübelit. R. | 65 | 743 |
| — — über den Fritscheit. R. | 65 | 743 |
| — — Magnesia enthaltender Aragonit. R. | 65 | 743 |
| — — über den Globosit. R. | 65 | 743 |
| — — über den Konarit. R. | 65 | 857 |
| — — über den Pterolith. R. | 65 | 858 |
| — — über den Fauserit. R. | 65 | 858 |
| — — Berichtigung, den Kokscharowit und Richterit betreffend. B. | 66 | 442 |
| — — über den Nakrit. R. | 66 | 91 |
| — — über den Raimondit. R. | 66 | 593 |
| — — über den Sandbergerit. R. | 66 | 719 |
| — — Verbesserung zu dessen mineralogischen Studien. B. | 66 | 807 |
| — — Nantokit, ein neues Mineral. R. | 68 | 354 |
| Brewster: Hohlräume in Topas, Beryll und Diamant. R. | 64 | 78 |
| Brigham: die vulcanischen Erscheinungen auf den Sandwich-Inseln. R. | 69 | 611 |
| Bristow: geology of the isle of Wight. R. | 64 | 731 |
| Broderip: über den Dodo. R. | 61 | 128 |
| Brodie: Chirotherium-Fährten im Keuper von Warwickshire. R. | 60 | 493 |
| — — ein alter Hammer im Gerölle bei Coventry. R. | 62 | 495 |
| Bronn: Stufengang des organischen Lebens von den Insel-Felsen des Oceans bis auf die Festländer. R. | 60 | 112 |
| — — die Klassen und Ordnungen des Thierreichs. I. u. II. R. | 60 | 869 |
| — — fossile Thier-Reste von Santa-Maria, Azoren. R. | 60 | 376 |
| — — zur näheren Kenntniss der Sippe Merista von Süss. A. | 61 | 772 |
| — — Beschreibung der organischen Reste aus den Tertiär-Schichten von Santa Maria. A. | 62 | 23 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Bronn, H. G.: über das Blatt einer Dattelpalme aus Molasse-Mergel und seine eigenthümliche Versteinerungsweise. A. | 1862 | 860 |
| Brooks: der Suez-Kanal. R. | 63 | 496 |
| Browell und Kirkby: chemische Zusammensetzung verschiedener Schichten des Zechsteins. R. | 67 | 494 |
| Brush: Chloritoid und Chloritoidschiefer in Canada. R. | 61 | 577 |
| — — über Albit in New-York. R. | 61 | 578 |
| — — Krystall-Form des Magnesiahydrates von Texas in Pennsylvanien. R. | 62 | 350 |
| — — neuer Fundort von Amblygonit. R. | 64 | 78 |
| — — Childrenit bei Hebron in Maine. R. | 64 | 78 |
| — — Bleiglanz von Lebanon in Pennsylvanien. R. | 64 | 244 |
| — — über den Tephroit. R. | 64 | 360 |
| — — Göthit am Oberen See. R. | 64 | 478 |
| — — Diaspor bei Newlin in Pennsylvania. R. | 67 | 106 |
| — — Uwarowit bei Neu-Idria in Californien. R. | 67 | 106 |
| — — über den Turgit. R. | 68 | 352 |
| — — Sussexit, ein neues Mineral. R. | 69 | 83 |
| — — „Cataloque of Meteorites in the Mineralogical Collection of Yale College“. R. | 69 | 872 |
| Bryson: über den neptunischen Ursprung des Granits. R. | 62 | 370 |
| Buchner: Meteortein-Fall zu Wedde 1852. R. | 61 | 748 |
| Buckmann: Reptilien-Eier aus dem Gross-Oolith von Cirencester. R. | 60 | 878 |
| Bütschly: Übersichtstabelle der krystallisirten Mineralien. R. | 66 | 366 |
| — — mikroskopische Untersuchung von Augiten; eigenthümliche Farbenerscheinungen im polarisirten Licht. B. | 67 | 700 |
| Bunbury: fossile Pflanzen von Nagpur, Ostindien. R. | 62 | 122 |
| Bunsen, R.: Bildung des Granits. R. | 61 | 856 |
| — — Cäsium und Rubidium, zwei neue Alkalimetalle. R. | 61 | 692 |
| — — Analyse des Lepidolith. R. | 62 | 600 |
| Bureau: „note sur les plantes du depot houiller de la Rhone“. R. | 68 | 249 |
| Burkart: über einige neue Fundorte mexicanischer Meteoriten. A. | 66 | 401 |
| — — über einige mexicanische Mineralien. A. | 66 | 409 |
| — — nähere Angaben über die Fundorte des Domeykits und der Manganblende in Mexico. B. | 67 | 826 |
| — — die Quarternärschichten des Beckens oder Hochthales von Mexico. A. | 68 | 513 |
| — — über die geologische Erforschung der central-amerikanischen Republiken Guatemala und Salvador durch A. Dollfuss und R. de Montserrat. A. | 69 | 769 |
| Burmeister und Giebel: die Versteinerungen von Juntas am Rio de Copiapo. R. | 62 | 237 |
| Burmeister: über Glyptodon. R. | 65 | 376 |
| Burmeister, H.: über im Museum zu Buenos Aires befindliche Glyptodon-Arten. R. | 67 | 123 |
| Burmeister, G.: „Anales del Museo publico de Buenos Aires“. R. | 66 | 873 |
| Busk: a Monograph of the fossil Polyzoa of the Crag. R. | 60 | 484 |
| Buteux: die Ablagerungen bei Amiens. R. | 64 | 635 |


## C.


| | | |
|---|---|---|
| Cabany: Kannel-Kohle in der Grube von Roeulx, Distr. Anzin. R. | 62 | 192 |
| Calberla: Analyse eines Titaneisens aus dem Nephelin-Dolerit von Löbau. R. | 67 | 479 |
| Canestrini: „Oggetti trovati nelle terramare del Modenese“. R. | 67 | 636 |
| — — „Origine del uomo“. R. | 67 | 638 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Capellini: neue Forschungen in der Knochen-Höhle von Cassana. R. | 1860 | 93 |
| — — Lignit-Ablagerungen im Magrathale. R. | 61 | 761 |
| — — „Studii stratigraphici palaeontologici sull' Infralias nelle montagne delle golfo della Spezzia". R. | 63 | 765 |
| — — „le schegge di diaspro dei monti della Spezzia e l'epoca della pietra". R. | 63 | 875 |
| Capellini und Pagenstecher: mikroskopischer Bau fossiler Schwämme. R. | 60 | 510 |
| Carpenter: Structur von Peneroplis, Operculina und Amphistegina. R. | 61 | 616 |
| — — über die Foraminiferen Polystomella, Calcarina, Pinoporus, Carpenteria. R. | 62 | 504 |
| Carruthers: Fruchtzapfen aus der Steinkohlen-Formation von Airdrie in Lancashire. R. | 66 | 126 |
| — — über Caulopteris punctata aus dem oberen Grünsand von Shaftesbury. R. | 66 | 378 |
| — — über einige fossile Coniferen-Früchte. R. | 67 | 247 |
| — — über Cycadoidea Yatesi. R. | 67 | 876 |
| — — über einige Cycadeen-Früchte aus secundären Schichten Britanniens. R. | 68 | 110 |
| — — über eine Aroideen-Frucht aus dem Schiefer von Stonesfield. R. | 68 | 110 |
| — — Revision der britischen Graptolithen. R. | 68 | 374 |
| — — über britische fossile Pandaneen. R. | 68 | 873 |
| Carte und Baily: über Plesiosaurus Cramptoni aus dem Lias von Whitby. R. | 64 | 254 |
| Carter: Bau der Foraminiferen und insbesondere der grösseren Arten aus Sind. R. | 62 | 624 |
| — — färbende Substanz des rothen Meeres. R. | 61 | 374 |
| Casselmann: über Nickelerze von Dillenburg. R. | 61 | 488 |
| — — Graphit bei Montabaur. R. | 61 | 602 |
| Castelnau: Erdbeben und Fischregen zu Signapore. R. | 62 | 105 |
| Castillo, A. del: Erzreichthum Californiens. R. | 67 | 112 |
| Catullo: „Discorimenti sopra alcuni importanti satti geognostico-palaeozoici". R. | 66 | 251 |
| Cavalieri: über Aepyornis. R. | 62 | 127 |
| Chapman: über Agelacrinus. R. | 61 | 127 |
| — — Gediegenes Blei am Oberen See. R. | 66 | 457 |
| — — über einige Mineralien vom Oberen See. R. | 66 | 724 |
| Church: über Tasmannit. R. | 65 | 479 |
| — — über Bayldonit: R. | 66 | 727 |
| — — Woodwardit, ein neues Mineral. R. | 67 | 100 |
| — — über Cornwallit. R. | 69 | 580 |
| Chydenius: Analyse des Orangit. R. | 63 | 830 |
| Clarke: Kohlenführende Schichten in Neu-Südwales. R. | 61 | 700 |
| — — mesozoische und permische Fauna im ö. Australien. R. | 63 | 239 |
| Cleve: Analyse des Cerins von Bastnäs. R. | 64 | 712 |
| Close: Karte der allgemeinen Eisbedeckung von Irland. R. | 67 | 867 |
| Cnowlton: Kyrtolit, ein neues Mineral. R. | 68 | 201 |
| Cocchi: „sulla geologia dell' Italia centrale". R. | 65 | 362 |
| — — „Monografia di Pharingodopilidae". R. | 65 | 381 |
| — — „di alcuni resti umani e degli oggetti di umana industria di tempi preistorici racolti in Toscana". R. | 66 | 878 |
| Cochius: chemische Zusammensetzung der wichtigsten vulcanischen Gesteine von Madeira und Porto Santo. R. | 65 | 343 |
| Coemans und Kickx: Monographie des Sphenophyllum d'Europe. R. | 65 | 362 |
| Cohn, F.: über die Entstehung des Travertin in den Wasserfällen von Tivoli. A. | 64 | 580 |
| — — Staubfall vom 22. Jan. 1864. R. | 66 | 250 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Colbeau: Beschreibung einer fossilen Art aus der Familie der Vermeten. R. | 1869 | 250 |
| Collingwood: geologische Mittheilungen über die chinesische Insel Formosa. R. | 69 | 108 |
| Collomb: Dasein des Menschen vor den alten Vogesen-Gletschern. R. | 61 | 107 |
| — — Bericht über die Versammlung der geologischen Gesellschaft in Montpellier. B. | 69 | 213 |
| — — über das von alten Gletschern abgegebene Wasser-Volumen | 69 | 598 |
| Conrad: Eocän- und Kreide-Versteinerungen aus Mississippi und Alabama. R. | 61 | 763 |
| — — Catalog der miocänen Schalthiere an dem atlantischen Abhange. R. | 63 | 871 |
| — — eocäne Lignit-Formation in den Vereinigten Staaten R | 66 | 630 |
| Conti: „il Monte Mario edi savi fossili subapennini". R. | 64 | 870 |
| — — neue fossile Pteropoden vom Monte Mario. R. | 67 | 768 |
| Cooke, J.: über den Danalit. R. | 67 | 194 |
| — — Kryophyllit, ein neues Mineral. R. | 68 | 201 |
| Coquand: die Pflanzen- und Thierarten in der Kreide im s.w. Frankreich. R. | 60 | 851 |
| — — neue Etage in der unteren Kreide. R. | 63 | 218 |
| — — Aufstellung einer neuen Etage in der Gruppe der mittlen Kreide. R. | 63 | 751 |
| — — geologische Beschreibung der bituminösen und Petroleum führenden Schichten von Selenitza in Albanien und Chirri auf Zante. R. | 69 | 250 |
| Cordella: über eine neue Gesteins-Bildung oder alluviales Schlacken-Conglomerat. R. | 65 | 93 |
| Cornalia: Wirbelthiere aus lombardischen Höhlen. R. | 61 | 369 |
| Cornalia: Terramaralager bei Salso maggiore. R. | 65 | 768 |
| Cornuel: über Pinus-Zapfen aus limnischen Schichten der Neocom-Etage des Pariser Beckens. R. | 67 | 249 |
| Cornet et Briart: „Notice sur l'extension du calcaire grossier de Mons dans la vallée de la Haine. R. | 67 | 509 |
| Cotta, B. v.: das Altenberger Zinnstockwerk. R. | 60 | 96 |
| — — Erzlagerstätten von Neu-Sinka in Siebenbürgen. R. | 60 | 360 |
| — — Basalt von Remagen mit Titaneisen. R. | 60 | 604 |
| — — „Lehre von den Erzlagerstätten". R. | 61 | 231 |
| — — geognostische Karte vom s. Theil des Ural. B. | 61 | 236 |
| — — Platin in Goldseifen von Nischne Tagilsk. R. | 61 | 327 |
| — — Realgar und Auripigment bei Neusohl. R. | 61 | 333 |
| — — „die Lehre von den Erzlagerstätten". | 61 | 459 |
| — — Antimonerze von Magurka. R. | 61 | 494 |
| — — Erzlagerstätten in Ungarn und Siebenbürgen. R. | 61 499 | 602 |
| — — die Erzlagerstätten von Nagyag in Siebenbürgen. R. | 62 | 368 |
| — — Untersuchung der Gesteine von Altenberg. R. | 62 | 358 |
| — — über den Miascit von Ditro in Siebenbürgen. R. | 62 | 491 |
| — — über Gesteine und deren Entstehung. A. | 62 | 641 |
| — — das Vorkommen von Kupfererzen bei Totos unfern Sigeth. R. | 62 | 883 |
| — — die Gesteins-Lehre. 2. Aufl. R. | 62 | 1006 |
| — — Alter der granitischen Gesteine von Monzoni und Predazzo in Tyrol. A. | 63 | 16 |
| — — über Agordo. R. | 63 | 103 |
| — — der Pfundrersberg bei Klausen in Tyrol. R. | 63 | 205 |
| — — Blei- und Zinkerz-Lagerstätten Kärnthens. R. | 63 | 367 |
| — — über eigenthümliche Quarz-Krystalle. R. | 64 | 244 |
| — — eruptive Gesteine und Erzlagerstätten im Banat und in Serbien. R. | 64 | 492 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Cotta, B. v.: Eindrücke in den Geschieben der Nagelflue. B. . . | 1864 | 611 |
| — — Resultate aus seinem Werke „Erzlagerstätten im Banat". B. . | 64 | 822 |
| — — die Kieslagerstätte am Rammelsberg bei Goslar. R. . . . . | 65 | 241 |
| — — Gangthonschiefer von Clausthal. R. . . . . | 65 | 336 |
| — — Kupfer- und Silbererz-Lagerstätten der Matra. R. . . . . | 66 | 235 |
| — — die Erzlagerstätten von Turcz. R. . . . . | 66 | 367 |
| — — Vorkommen und Gewinnung des Erdöls in Galizien. R. . . | 66 | 367 |
| — — „Bischof's Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie. A. . . . . | 66 | 537 |
| — — die Goldgänge von Iloba in Ungarn. R. . . . . | 66 | 605 |
| — — „die Geologie der Gegenwart". R. . . . . | 66 | 839 |
| — — das Entwickelungs-Gesetz der Erde. R. . . . . | 67 | 230 |
| — — die Geologie der Gegenwart. 2. Aufl. R. . . . . | 68 | 222 |
| — — der reichste Silbererzgang der Erde, der Comstockgang in Nevada. R. . . . . | 68 | 352 |
| — — Glimmerschiefer-Geschiebe aus dem Conglomerat der Culm-Formation mit Zinkblende. B. . . . . | 69 | 560 |
| — — über den geologischen Bau des Altaigebirges. R. . . . . | 69 | 487 |
| — — über den alten Bergbau von Grasslitz in Böhmen. R. . . . | 69 | 488 |
| Cotteau: Heliocidaris. R. . . . . | 61 | 112 |
| — — die Familie der Saleniiden. R. . . . . | 62 | 507 |
| — — Echiniden der Nummuliten-Schichten von Biarritz. R. . . . | 65 | 376 |
| M'Coy: alte und neue Organismen in Victoria. R. . . . . | 63 | 115 |
| — — über die australischen tertiären Arten von Trigonia. R. . . | 67 | 253 |
| — — über fossile Voluten aus den Tertiärschichten von Melbourne. R. | 67 | 503 |
| — — Vorkommen von Ichthyosaurus und Plesiosaurus in Australien. R. . . . . | 68 | 246 |
| — — über die Paläontologie von Victoria. R. . . . . | 69 | 115 |
| — — über zwei neue fossile Cypraeen aus tertiären Schichten bei Melbourne. R. . . . . | 69 | 123 |
| Cravert: Idografia sotteranea della cita di Bra. R. . . . . | 65 | 380 |
| Credner, Heinr.: Dolerit der Pflasterkaute bei Eisenach. A. . . . | 60 | 57 |
| — — die Grenz-Gebilde zwischen dem Keuper und Lias am Seeberg bei Gotha in Norddeutschland. A. . . . . | 60 | 293 |
| — — geognostische Verhältnisse der Umgegend von Bentheim. R. . | 62 | 890 |
| — — Vorkommen von Asphalt in Bentheim. R. . . . . | 62 | 883 |
| — — Gliederung der oberen Juraformation und der Wealdenbildung im n.w. Deutschland. R. . . . . | 64 | 103 |
| — — geognostische Karte der Gegend von Hannover. R. . . . . | 66 | 376 |
| Credner, Herm.: die Pteroceras-Schichten. R. . . . . | 65 | 252 |
| — — Brachiopoden der Hilsbildung im n.w. Deutschland. R. . . | 65 | 253 |
| — — geognostische Reise-Skizze aus New Brunswick in Nordamerika. A. | 65 | 803 |
| — — geologische Verhältnisse von Californien. B. . . . . | 65 | 729 |
| — — Hübnerit, ein neues Mineral. R. . . . . | 66 | 87 |
| — — Geognostische Beschreibung des Bergwerks-Districts von Andreasberg. R. . . . . | 66 | 99 |
| — — der Andreasberger Kalkspath. R. . . . . | 66 | 230 |
| — — Zone der Opis similis im Oxford in Hannover. R. . . . . | 66 | 243 |
| — — Verbreitung des Gault bei Hannover. R. . . . . | 66 | 243 |
| — — Beschreibung einiger paragenetisch interessanter Gold-Vorkommen in Georgia. A. . . . . | 67 | 442 |
| — — Kupfergruben von Ducktown, Tennessee. R. . . . . | 67 | 612 |
| — — Beschreibung einiger charakteristischer Vorkommen des gediegenen Kupfers auf Keweenaw Point am Oberen See Nordamerika's. A. . . . . | 69 | 1 |
| — — über seine Reise in Nordamerika. B. . . . . | 69 | 63 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Crivelli: Eridanosaurus Brambillae. R. | 1865 | 766 |
| Czech: über krystallisirten Graphit. B. | 65 | 309 |
| Czudnowicz: Analyse des Eusynchit. R. | 64 | 237 |


## D.


| | | |
|---|---|---|
| Dach: Vorkommen von Zinnerz auf der Insel Carimon. R. | 64 | 363 |
| Dahll, Teller.: Geologie Tellemarkens. R. | 62 | 603 |
| Dalimier: geologische Skizze des s. Plateau's der Bretagne. R. | 63 | 852 |
| Dalmas: die Oberflächen-Gestaltung des Gebirges der Ardèche. R. | 62 | 500 |
| Daintree: Stellung der Schichten mit Glossopteris in der Steinkohlen-Formation der Provinz Victoria. R. | 64 | 634 |
| Dames: die devonischen Ablagerungen bei Freiburg in Niederschlesien. R. | 69 | 635 |
| Damour: Gmelinit vom Eilande Cypern. R. | 60 | 78 |
| — — metallisches Zinn und Platin in den Goldlagerstätten Guiana's. R. | 62 | 81 |
| — — Analysen einiger Mineralien aus der Familie des Wernerits. R. | 62 | 488 |
| — — mineralogische Untersuchung des unter dem Namen Lherzolith bekannten Gesteins. R. | 63 | 95 |
| — — Tscheffkinit von der Küste von Coromandel. R. | 63 | 202 |
| — — über den Meteorit von Chassigny. R. | 63 | 363 |
| — — über den grünen Jade. R. | 64 | 76 |
| — — Analyse des Parisit. R. | 65 | 238 |
| — — Kallais, ein neues Thonerde-Phosphat. R. | 65 | 475 |
| — — über eine Verbindung des Zinkoxyd mit Arseniksäure vom Cap Garonne. R. | 69 | 479 |
| Dana, J. D.: über die Appalachians und Rocky Mountains. R. | 64 | 101 |
| — — Classification der Thiere. R. | 64 | 864 |
| — — fossile Insecten aus der Kohlenformation von Illinois. R. | 64 | 865 |
| — — über den Ursprung der Prairien. R. | 66 | 236 |
| — — über Whitney's Geologie und Paläontologie von Californien. B. | 66 | 443 |
| — — über Cephalisation. R. | 67 | 120 |
| — — über den Ursprung des Lebens. R. | 67 | 121 |
| — — kündigt die neue Auflage seiner Mineralogie an. B. | 68 | 588 |
| — — „a system of mineralogy". 5. ed. R. | 69 | 237 |
| Darwin, Ch.: „on the origin of species by means of natural selection". R. | 60 | 112 |
| — — Mächtigkeit der Pampas Formation bei Buenos Ayres. R. | 63 | 872 |
| — — „über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Racen im Kampfe ums Dasein". R. | 68 | 111 |
| Dauber: über Apophyllit-Krystalle. R. | 61 | 334 |
| Daubrée: Studien und synthetische Versuche über den Metamorphismus und die Bildung krystallinischer Felsarten. I, R. | 60 | 727 |
| — — dasselbe. II. R. | 60 | 817 |
| — — über Akanthit. R. | 61 | 696 |
| — — Zeolithe im Römischen Mörtel durch Mineralwasser gebildet. R. | 61 | 326 |
| — — Möglichkeit einer kapillaren Infiltration von Wasser durch poröse Gesteine ungeachtet entgegen wirkenden Dampfdruckes. R. | 62 | 93 |
| — — synthetische Versuche über Meteoriten. R. | 66 | 738 |
| — — „Classification adoptée pour la collection des roches du Muséum d'histoire naturelle de Paris". R. | 68 | 216 |
| — — „Expériences synthétiques relatives aux Météorites". R. | 69 | 871 |
| — — „Météorites du Museum d'histoire naturelle" au 31. Mars 1868. R. | 69 | 872 |
| Davidson: über einige Brachiopoden aus Ostindien. R. | 62 | 630 |
| — — Goniophyllum pyramidale. R. | 66 | 637 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Davidson: über Syringothyris und über Waldheimia venosa. R. . | 1868 | 246 |
| — — Nachträge zu Geinitz „Carbonformation und Dyas von Nebraska". R. | 68 | 589 |
| — — „a monograph of the british fossil Brachiopoda". R. | 68 | 766 |
| — — über die ältesten Formen von Brachiopoden in paläozoischen Gesteinen Grossbritanniens. R. | 68 | 871 |
| Dawkins: Hyänen-Höhle zu Wookey-Hole bei Wells. R. | 62 | 755 |
| — — Hyänen-Höhle zu Wookey-Hole bei Wells in Somerset. R. | 63 | 240 |
| — — über britische fossile Ochsen. R. | 66 | 873 |
| — — über den fossilen britischen Ochsen. R. | 67 | 495 |
| Dawkins, Boyd: das Alter der unteren Ziegelerden des Themsethales. R. | 68 | 245 |
| — — über die fossilen britischen Rinder. R. | 68 | 371 |
| — — über den Zahnbau des Rhinoceros leptorhinus. R. | 68 | 371 |
| — — über den Zahnbau des Rhinoceros Etruscus R. | 69 | 511 |
| — — über Cervus Browni und C. Falconeri. R. | 69 | 511 |
| Dawson: Pflanzen-Structur in Steinkohle. R. | 60 | 371 |
| — — fossile Reste aus der Steinkohlen-Formation Neu-Schottlands. R. | 60 | 492 |
| — — fossile Pflanzen aus Devon-Gesteinen Unter-Canada's. R. | 60 | 639 |
| — — Landthier-Reste in der Steinkohlen-Formation Neuschottlands. R. | 60 | 764 |
| — — Landthier-Reste in der Kohle der South-Joggins. R. | 62 | 511 |
| — — Trigonocarpum Hookeri in der Kohle von Cap Breton. R. | 62 | 512 |
| — — devonische Flora von Neu-Braunschweig. R. | 62 | 751 |
| — — pleistocäne Fossilien in Canada. R. | 62 | 768 |
| — — Flora der Devonformation im n.ö. Amerika. R. | 63 | 230 |
| — — die devonischen Pflanzen von Maine, Gaspé und New-York. R. | 64 | 127 |
| — — die Luftathmer der Steinkohlen-Periode in Neu-Schottland. R. | 64 | 507 |
| — — Reptilien-Fährten aus der Steinkohlen-Formation vom Cap Breton. R. | 64 | 752 |
| — — Synopsis der Steinkohlen-Formation in Neuschottland. R. | 64 | 757 |
| — — Fossilien in der Laurentian-Gruppe von Canada. R. | 64 | 867 |
| — — über die Gattung Rusophycus. R. | 65 | 505 |
| — — rhätische Schichten und weisser Lias von Somerset. R. | 65 | 507 |
| — — Steinkohlen-Ablagerungen von Neuschottland und Neubraunschweig. R. | 66 | 760 |
| — — über Bohrlöcher von Würmern in der Laurentian-Gruppe von Canada. R. | 67 | 491 |
| — — die Schichten von St. John unterteufen die untersten Schichten der Steinkohlen-Formation und enthalten eine charakteristische devonische Flora. R. | 67 | 701 |
| — — paläozoische Insecten aus Neuschottland und Neubraunschweig. R. | 67 | 874 |
| — — über die Entdeckung einer neuen Lungenschnecke in der Steinkohlen-Formation von Nova Scotia. R. | 68 | 373 |
| Debey: Alter des Aachener Sandes. R. | 66 | 749 |
| Dechen, H. v.: relatives Alter der Lavenströme in der Eifel. R. | 61 | 95 |
| — — Beschaffenheit der Lava am Laacher See. R. | 61 | 98 |
| — — Magneteisen in den Rheinlanden. R. | 61 | 578 |
| — — geognostischer Führer zur Vulcanreihe der Vordereifel. R. | 61 | 606 |
| — — Obsidian-ähnliche Hüttenproducte. R. | 62 | 192 |
| — — die beiden Kohlenreviere in der Gegend von Aachen. R. | 62 | 609 |
| — — interessante Mineralien vom Laacher See. R. | 62 | 484 |
| — — Pflanzen führende vulcanische Tuffe der Vordereifel. R. | 62 | 1002 |
| — — Lagerung zweier Lavenströme über einander bei Niedermendig. R. | 62 | 1003 |
| — — Feuerstein-Geschiebe mit Eindrücken. R. | 63 | 841 |
| — — geognostische Beschreibung des Laacher See's und seiner vulcanischen Umgebung. R. | 64 | 496 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Decken, H. v.: vulcanische Erscheinungen im Laacher See-Gebiet und in der Eifel. R. | 1866 | 240 |
| — — geologische Karte der Rheinprovinz und von Westphalen. R. | 66 | 377 |
| — — Mittheilung eines Aufsatzes von Laspeyres über Cäsium und Rubidium in plutonischen Gesteinen der preussischen Rheinprovinz. R. | 66 | 755 |
| — — geologische Karten und Sammlungen auf der Kölner Austellung 1865. R. | 66 | 848 |
| — — geologische Übersichtskarte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen. R. | 67 | 222 |
| — — Geognostische Übersichtskarte von Deutschland, Frankreich, England und den angrenzenden Ländern. 2. Ausgabe. R. | 69 | 872 |
| Deffner, C.: Erklärung der Bohnerz-Gebilde. R. | 61 | 599 |
| — — Lagerungs-Verhältnisse zwischen Schönbuch und Schurwald, Württemberg. R. | 61 | 854 |
| Deicke, J. C.: Salmiak-Bildung auf brennenden Steinkohlen-Haufen. R. | 60 | 76 |
| — — Entstehung von Eindrücken an den Nagelflue-Geschieben. B. | 60 | 218 |
| — — Eindrücke in den Geschieben der Nagelflue und den Gesteinen der Quartär-Formation. A. | 64 | 315 |
| — — Bildung der Molassengesteine in der Schweiz. A. | 64 | 665 |
| — — über Erdschlüpfe und Schlammströme mit besonderer Beziehung auf den am Fähnernberg. A. | 68 | 39 |
| — — Untersuchung der Quartärgebilde in der Schweiz mit besonderer Beziehung auf die Kantone St. Gallen und Appenzell. A. | 68 | 563 |
| — — der Erdrutsch am Fähnernberge. B. | 68 | 583 |
| Deiters: die Trachydolerite im Siebengebirge. R. | 62 | 190 |
| Delanoue: Tropfsteine von Eisenoxydhydrat. R. | 64 | 478 |
| Delbos: über Raubthiere in der Sentheimer Höhle. R. | 61 | 755 |
| Delesse: Kupfererze von dem Cap der guten Hoffnung. R. | 60 | 356 |
| — — über Metamorphismus. B. | 60 | 555 |
| — — Stickstoff und organische Bestandtheile in Mineralien. R. | 60 | 711 |
| — — über Pseudomorphosen. R. | 60 | 720 |
| — — über Minette. R. | 60 | 724 |
| — — die hydrologische Karte der Stadt Paris. A. | 61 | 553 |
| — — chemische Untersuchung fossiler Knochen. R. | 61 | 585 |
| — — Stickstoff in Gesteinen R. | 61 | 713 |
| — — über den Pariser Gyps. R. | 62 | 496 |
| — — Untersuchungen über das Wasser im Innern der Erde. R. | 62 | 605 |
| Delesse et Laugel: „Revue de géologie pour l'année 1861". R. | 63 | 734 |
| — — „Revue de géologie pour les années 1862 et 1863". R. | 67 | 221 |
| Delesse: carte géologique du departement de la Seine. R. | 67 | 372 |
| Delesse et Lapparent: „Revue de Géologie pour les années 1864 et 1865". R. | 67 | 751 |
| — — „Revue de Géologie pour les années 1865—1866". R. | 68 | 760 |
| Delesse: Lithologie der Meere der alten Welt. B. | 69 | 848 |
| Delesse et Lapparent: „Revue de Géologie pour les années 1866 et 1867. R. | 69 | 870 |
| Descloizeaux: Kalkuranit von Cornwall. R. | 61 | 184 |
| — — Sillimanit und seine Synonyme. R. | 61 | 647 |
| — — Vorkommen von Flussspath bei Eaux-Bonnes in den Pyrenäen. R. | 63 | 201 |
| — — Carbonat von Magnesia und Eisenoxydul im Meteoriten von Orgueil. R. | 65 | 479 |
| Deshayes: Animaux sans vertébres du Bassins de Paris XIX, XX. R. | 60 | 766 |
| — — Vertheilung der Muschel-Arten in den Pariser Tertiärschichten. R. | 62 | 251 |
| Deslongchamps: jurassische Purpurina-, Trochus- und Turbo-Arten. R. | 61 | 626 |
| — — über Encyclus. R. | 61 | 637 |
| — — Entwickelung des Deltidiums bei den Brachiopoden. R. | 63 | 125 |
| Desor, E.: die Physiognomie der Schweizer Seen. R. | 60 | 369 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Desor, E.: die Sahara. R. | 1864 | 726 |
| — — „les constructions lacustres du lac de Neufchâtel". R. | 65 | 249 |
| — — Gebirgsbau in den Alpen. R. | 65 | 626 |
| — — „aus Sahara und Atlas". R. | 66 | 855 |
| — — über die Dolmen, deren Verbreitung und Deutung. R. | 67 | 498 |
| Dewalque: die artesischen Brunnen von Ostende. R. | 64 | 107 |
| Deville, Ch. St. Cl.: künstliche Darstellung von Schwefel-Metallen. R. | 61 | 588 |
| — — künstliche Darstellung von Eisenglanz- und Metalloxyd-Krystallen. R. | 61 | 703 |
| — — künstliche Darstellung von Willemit. R. | 61 | 705 |
| Deville, H. Ste. Cl.: künstliche Zinnoxyd- und Rutil-Krystalle. R. | 62 | 78 |
| — — künstliche Eisenoxydoxydul-, Martit- und Periklas-Krystalle. R. | 62 | 88 |
| Deville, Saint-Claire: zur Eruptions-Geschichte des Vesuv. R. | 69 | 591 |
| Devine: neuer Trilobit aus der Quebec-Gruppe. R. | 64 | 509 |
| Diesterweg: strahliger Grüneisenstein vom Hollerter Zug bei Siegen. R | 64 | 76 |
| Dieulafait: über die Zone mit Avicula contorta in s. Frankreich. R. | 68 | 229 |
| Döndorff: Beitrag zur Kenntniss der Puddelschlacke. A. | 60 | 668 |
| Dohrn: Eugereon Boeckingi, neue Insectenform aus dem Todtliegenden. R. | 66 | 868 |
| Dollfuss: neue Trigonia aus der Kimmeridge-Etage von Havre. R. | 63 | 256 |
| — — Trigonia Heva. R. | 64 | 119 |
| Dove: Anwendung des Aragonit als Polarisator. R. | 62 | 601 |
| Drescher: die Kreidebildungen der Gegend von Löwenberg. R. | 64 | 112 |
| Dressel, J.: die Basalt-Bildung in ihren einzelnen Umständen erläutert. R. | 67 | 726 |
| Dufour: Untersuchungen über die Föhn am 23. Septbr. 1866 in der Schweiz. R. | 69 | 597 |
| — — specifisches Gewicht des Eises. R. | 63 | 588 |
| Dumortier: Fucoiden-Kalk am Fusse des Unteroolits im Rhonebecken. R. | 62 | 496 |
| — — „Etudes paléontologiques sur le bassin du Rhone. R. | 68 | 238 |
| Duncan: fossile Korallen der Westindischen Inseln. R. | 61 249 | 754 |
| — — fossile Korallen von Sinde. R. | 64 | 756 |
| — — fossile Korallen und Echinodermen aus der südaustralischen Tertiärformation. R. | 65 | 761 |
| — — die Korallen des Malteser Miocän. R. | 66 | 118 |
| — — fossile Echinodermen aus cretacischen Schichten an der s.ö Küste von Arabien. R. | 66 | 491 |
| — — fossile Korallen aus den Tertiär-Schichten vom s. Australien. R. | 66 | 500 |
| Duncan und Thomson: über Cyclophyllum, eine neue Gattung der Cyathophyllidae. R. | 68 | 375 |
| Duncan: über fossile Korallen der westindischen Inseln. R. | 69 | 120 |
| Dupont: carte géologique des environs de Dinant. R. | 68 | 228 |
| Durocher: Hebungs-Systeme in Central-Amerika. R. | 61 | 209 |


## E.


| | | |
|---|---|---|
| Ebray: die Minette im Morvan. R. | 63 | 474 |
| — — die Trigonia Heva. R. | 64 | 636 |
| — — die jurassischen Schichten im Dep. der Ardèche. R. | 65 | 744 |
| — — Stratigraphie der Etage Albien bei St. Florentin. R. | 65 | 744 |
| — — über die Minette der Rhone. R. | 65 | 745 |
| Eck, H.: der Opatowitzer Kalkstein. R. | 63 | 857 |
| — — Formation des Buntsandsteins und Muschelkalkes in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. R. | 66 | 249 |
| — — Conchylien im mittleren Muschelkalk bei Rüdersdorf. R. | 67 | 632 |
| Eddy: Anatas bei Smiethfield, Rhode-Island. R. | 67 | 100 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Edwards: neue ecäne Arten von Cyprella und Marginella. R. | 1866 | 378 |
| Egerton, Gray: Chondrosteus aus Lias von Lyme Regis. R. | 60 | 865 |
| — — fossile Fische von Karoo Desert. R. | 61 | 638 |
| — — zur Synonymie der devonischen Fische. R. | 61 | 758 |
| — — Ichthyolithen von Neusüdwales. R. | 64 | 753 |
| — — über eine neue Art Acanthodes aus dem Kohlenschiefer von Langton. R. | 67 | 382 |
| — — einige neue Fische aus dem Lias von Lyme Regis. R. | 69 | 620 |
| Ehlers: über eine fossile Eunicee aus Solenhofen Eunicites avitus. R. | 69 | 627 |
| Ehrenberg: Mengungs-Verhältnisse des Bodens im stillen Ocean und bei den Sandwichs. R. | 61 | 714 |
| — — über die massenhaft jetzt lebenden u. über die ältesten Pteropoden. R. | 62 | 509 |
| — — obersilurische und devonische mikroskopische Pteropoden, Polythalamien und Krinoiden bei Petersburg. R. | 63 | 229 |
| — — die Ferdinands- oder Grahams-Insel. R. | 64 | 738 |
| — — zur weiteren Kenntniss der Wachsthums-Bedingungen der organischen kieselerdehaltigen Gebilde. R. | 67 | 510 |
| Eichwald, v.: Lethaea rossica. I R. | 61 | 749 |
| — — Übersicht der paläolithischen Flora Russlands. R. | 62 | 112 |
| — — Asteroblastus stellatus von Pulkowa. R. | 62 | 629 |
| — — der Grünsand in der Umgebung von Moskau. R. | 63 | 123 |
| — — Flora und Fauna des Grünsandes bei Moskau. R. | 63 | 124 |
| — — Neocom-Schichten Russlands. R. | 66 | 866 |
| — — „Lethaea rossica". IX. liv. R. | 66 | 874 |
| — — „Lethaea Rossica ou Palaeontologie de la Russie". R. | 68 | 763 |
| — — dasselbe R. | 69 | 505 |
| — — über die alte Bevölkerung während der Steinzeit und Bronzezeit. R. | 69 | 382 |
| — — die Lethaea rossica und ihre Gegner. R. | 69 | 383 |
| Elsner: über das Verhalten einiger Mineralien und Gebirgsarten bei sehr hoher Temperatur. R. | 68 | 356 |
| Emmerling, A.: über den Pseudonephrit. A. | 66 | 558 |
| Emmrich: das bayerische Tertiärgebirge. R. | 61 | 709 |
| Eras: die Felsittuffe von Chemnitz. A. | 64 | 673 |
| Erdmann: Vorkommen von Rubidium und Cäsium im Carnallit. R. | 63 | 199 |
| — — Kaligehalt der Karlsbader Mineral-Quellen. R. | 63 | 600 |
| — — geologische Aufnahme Schwedens. A. | 64 | 641 |
| — — „Exposé des formations quaternaires de la Suède. R. | 69 | 500 |
| Etallon: fossile Kruster im Haute-Saone- und Haut-Jura-Depart. R. | 60 | 864 |
| Etheridge: neue Labyrinthodonten in der Steinkohlen-Formation von Irland. R. | 66 | 379 |
| — — physikalische Structur von Nord-Devonshire. R. | 69 | 109 |
| — — physikalische Structur von Westsomerset und Norddevon. R. | 69 | 760 |
| Ettingshausen, v.: die fossilen Algen des Wiener und Karpathensandsteins. R. 64 | 252 | 759 |
| — — die fossile Flora des schlesisch-mährischen Dachschiefers. R. | 66 | 765 |
| — — die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R. | 67 | 502 |
| — — die Kreideflora von Niederschöna in Sachsen. R. | 68 | 243 |
| — — die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R. | 68 | 878 |
| — — die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R. | 69 | 121 |
| Ewald: Fauna des unteren Gault bei Ahaus. R. | 61 | 722 |
| — — Lagerung der oberen Kreidebildungen am Nordrande des Harzes. R. | 63 | 373 |
| Ewald, J., J. Roth und H. Eck: „Leopold v. Buch's gesammelte Schriften". I. Bd. R. | 68 | 97 |


## F.


| | | |
|---|---|---|
| Falconer: Knochenhöhlen auf der Halbinsel Gower. R. | 61 | 19 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Falconer: Säugethier-Gattung Plagiaulax aus den Purbeck-Schichten. R. | 1863 | 239 |
| — — der Menschenkiefer von Abbeville. R. | 63 | 759 |
| — — über die Arten von Mastodon und Elephas in England. R. | 66 | 380 |
| Fallou: über den Löss, besonders im Königreich Sachsen. A. | 67 | 143 |
| — — gegen die Agassiz'sche Ansicht über die Entstehung des Löss. B. | 68 | 64 |
| Favre: Profil des Anthracit-Gebietes in Maurienne. R. | 61 | 709 |
| — — geologische Karte der um den Mont Blanc gelegenen Theile von Savoyen, Piemont und der Schweiz. R. | 63 | 495 |
| — — „recherches géologiques dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Montblanc". R. | 68 | 855 |
| Feistmantel: Mineral-Bildungen durch einen Hüttenbrand. B. | 61 | 312 |
| — — die Porphyre im Silurgebirge von Mittel-Böhmen. R. | 61 | 498 |
| — — Anthracit in den Grünsteinen bei Beraun. R. | 64 | 90 |
| Fellenberg, C. v.: neue Mineral-Vorkommnisse aus Ungarn und Siebenbürgen. A. | 61 | 301 |
| — — Analyse des Studerits. R. | 65 | 477 |
| — — Analyse von Laumontit. R. | 65 | 478 |
| — — Analysen einiger Nephrite aus den Schweizer Pfahlbauten. R. | 65 | 619 |
| — — Serpentin aus dem Malenker Thal, Graubündten. R. | 67 | 197 |
| — — Kalkspath von Merligen. R. | 67 | 198 |
| — — über ein grünes Mineral aus dem Berner Oberland. R. | 67 | 363 |
| — — Analysen verschiedener Walliser Mineralien. R. | 68 | 745 |
| — — Analysen einiger Nephrite aus Turkistan. R. | 69 | 231 |
| — — chemisch-mineralogische Durchsuchung der in der Krystallhöhle am Tiefengletscher aufgefundenen Bleiglanz-Masse. R. | 69 | 374 |
| — — die Krystallhöhle am Tiefengletscher. R. | 69 | 580 |
| Fellner: Untersuchung des Miascits von Ditropatak in Siebenbürgen. R. | 67 | 613 |
| — — chemische Untersuchung einiger böhmischer und ungarischer Diabase. R. | 67 | 481 |
| — — chemische Untersuchung der Gesteine von Ditro. R. | 68 | 82 |
| — — chemische Untersuchung der Teschenite. R. | 68 | 207 |
| Ferber: wasserhaltige Nickeloxydmagnesia. R. | 64 | 238 |
| — — Zusammensetzung des Jarosit. R. | 64 | 362 |
| Fiedler: die Mineralien Schlesiens. R. | 63 | 367 |
| Field: Analyse von Domeykit und Algodonit aus Chile. R. | 60 | 230 |
| — — Alisonit von Coquimbo. R. | 61 | 191 |
| — — über Ornitichniten. R. | 61 | 877 |
| Fikenscher: über den Euphotid vom Genfer See. R. | 64 | 83 |
| — — über den Glagerit. R. | 64 | 234 |
| — — weisses Steinmark aus dem Melaphyr-Mandelstein von Zwickau. R. | 64 | 239 |
| — — neuer Fund von Pterodactylus zu Eichstätt. B. | 65 | 46 |
| — — Untersuchung der metamorphischen Gesteine der Lunzenauer Schiefer-Halbinsel. R. | 67 | 486 |
| Filippi, de: das ö. Persien. R. | 65 | 766 |
| Fischer, H.: die triklinoedrischen Feldspathe in plutonischen Gesteinen des Schwarzwaldes. R. | 60 | 575 |
| — — Mineralien im Schwarzwald. R. | 60 | 795 |
| — — Apatit-Krystalle in Gneiss. B. | 61 | 562 |
| — — über den Kinzigit. A. | 61 | 641 |
| — — die Trachyte und Phonolithe des Högaues und Kaiserstuhles mit ihren Mineral-Einschlüssen. R. | 62 | 356 |
| — — über das Vorkommen von Prehnit, Datolith und Rutil bei Freiburg und über die Bedingungen zur Zeolith-Bildung. A. | 62 | 432 |
| — — neue Mineralien im Schwarzwald. B. | 62 | 465 |
| — — neue Mineralien für Baden. B. | 63 | 559 |
| — — über den sog. Erlan von Wunsiedel. B. | 64 | 48 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Fischer, H.: „Clavis der Silicate". R. | 1865 | 239 |
| — — Mineralogisches vom Kaiserstuhl. B. | 65 | 437 |
| Fischer, H.: die säulenförmigen Sandsteine aus den Basalten verhalten sich vor dem Löthrohr wie Perl- und Pechstein. B. | 65 | 717 |
| Fischer, H.: das mineralogisch-geologische Museum der Universität Freiburg. R. | 67 | 236 |
| Fischer, H.: über in den Pfahlbauten gefundene Nephrite und nephritähnliche Mineralien. R. | 68 | 85 |
| — — eigenthümliche, schon bei 70facher Vergrösserung erkennbare Maschengewebe im Granit. B. | 68 | 722 |
| — — Resultate seiner mikroskopisch-mineralogischen Studien. B. | 69 | 344 |
| Fischer, O.: die Bracklesham-Schichten auf Wight. R. | 63 | 227 |
| — — „sur les hydrozaires fossiles du genre Hydractinia". R. | 68 | 249 |
| — — „sur les déprédations des mollusques zoophages à l'epoque éocène. R. | 68 | 249 |
| Fischer-Benzon, v.: über den Faxekalk und die in ihm vorkommenden Anomuren und Brachyuren. R. | 66 | 864 |
| Fischer-Benzon, R. v.: mikroskopische Untersuchung der Structur von Halysites-Arten und silurischer Gesteine. B. | 69 | 853 |
| Fleck und Hartig: „Geschichte, Statistik und Technik der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder. R. | 66 | 619 |
| Fleck, H.: über die chemischen Vorgänge im Fossilien-Bildungs-Process. A. | 67 | 291 |
| — — über Hinrichs Atomechanik. B | 68 | 333 |
| Flower: Verwandtschaft und Eigenthümlichkeiten des ausgestorbenen australischen Beutelthiers, Thylocoelo carnifex. R. | 69 | 766 |
| Flückiger: die Coprolithen des Bonebeds. R. | 62 | 351 |
| Förster: der Eulengebirgs-Gneiss und dessen Erzführung insbesondere bei Silberberg. A. | 65 | 291 |
| Foetterle: Vorkommen von Naphtha in Galizien. R. | 60 | 110 |
| — — geognostische Bemerkungen über das n.w. Ungarn. R. | 60 | 234 |
| — — das Gebirge in Krakau und in w. Galizien. R | 60 | 457 |
| — — Braunkohlen-Vorkommen bei Valdagno. R. | 62 | 214 |
| — — Chalcedon-Kugeln von Olomutschan in Mähren. R. | 65 | 622 |
| — — die Braunkohlen-Ablagerungen im Eger-Bassin. R. | 67 | 752 |
| Fontan: Knochenhöhlen bei Massat, Arriège R. | 62 | 218 |
| Foote, Br.: Verbreitung der Steingeräthe im südlichen Indien R. | 69 | 638 |
| Forbes, D.: über den Darwinit von Copiapo. R. | 61 | 696 |
| — — Geologie von Bolivia und Südperu. R. | 62 | 622 |
| — — über den Taltalit. R. | 63 | 470 |
| — — neues Arseniat von Nickel- und Kobaltoxydul | 63 | 587 |
| — — Antimon haltiger Bleiglanz. R. | 65 | 481 |
| — — über Evansit. R. | 66 | 87 |
| — — über südamerikanische Mineralien. R. | 66 | 88 |
| — — über den Phosphorit aus Spanien. R | 66 | 364 |
| — — „the Microscope in geology". R. | 68 | 625 |
| — — über Gold von Clogau in Wales. R. | 68 | 748 |
| — — über Gold aus dem Flusse Mawdach. R. | 68 | 748 |
| — — Polytelit von der Insel Man. R. | 69 | 85 |
| Forchhammer, G.: die Ahlbildung in Dänemark und der Campinsand in Belgien. A. | 63 | 769 |
| Fournet: Färbung der Gesteine. R. | 61 | 747 |
| — — die neueren Eruptivgebilde im Lyonnais. R. | 61 | 859 |
| — — Bedeutung der Persolidification in der Geologie. R. | 62 | 102 |
| — — Bildung von Silicaten u. a. Mineralien auf nassem Wege. R. | 62 | 354 |
| — — über die Lagerstätten des Schwefelmolybdän, insbesondere bei Pelvoux. R. | 67 | 626 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Fraas, O.: die nutzbaren Mineralien Württembergs. R. | 1860 | 611 |
| — — Lehm und Diluvium im Allgemeinen. R. | 63 | 219 |
| — — tertiäre Hirsche von Steinheim. R. | 63 | 616 |
| — — der Hohlenstein und der Höhlenbär. R. | 63 | 617 |
| — — die neuesten Erfunde an der Schussenquelle bei Schussenried im Sept. 1866 und Beiträge zur Culturgeschichte des Menschen während der Eiszeit. R. | 67 | 871 |
| — — Dyoplax arenaceus, ein neuer Stuttgarter Keupersaurier. R. | 68 | 121 |
| — — aus dem Orient; geologische Beobachtungen am Nil, auf der Sinai-Halbinsel und in Syrien. R. | 68 | 493 |
| Frankenheim: Zur Krystallkunde. R. | 69 | 240 |
| Frauenfeld, G. v.: über ein neues Höhlen-Carychium. R. | 63 | 502 |
| Frémy: chemische Unterscheidung der fossilen Brennstoffe. R. | 63 | 473 |
| Fresenius: chemische Untersuchung der Mineralquelle zu Geilnau. R. | 60 | 443 |
| — — chemische Untersuchung der wichtigsten nassauischen Mineralwasser. R. | 68 | 629 |
| Friedel, C.: über den Wurtzit. | 63 | 837 |
| — — Adamin, ein neues Mineral. R. | 67 | 102 |
| Frischmann, L.: Neue Entdeckungen im lithogr. Schiefer von Eichstädt. A. | 68 | 25 |
| — — über Zwillinge des Chrysoberyll. R. | 68 | 80 |
| — — die Meteoriten der mineralogischen Sammlung des Staates in München am 1. März 1868. R. | 68 | 500 |
| — — über den Meteoriten von Eichstädt. B. | 68 | 467 |
| — — über Pleurosaurus Goldfussi aus dem lithographischen Schiefer von Eichstädt B. | 69 | 350 |
| Fritsch, A.: Vorkommen von Eozoon in Böhmen. B. | 66 | 354 |
| — — über die Callianassen der böhmischen Kreideformation. R. | 68 | 244 |
| Fritsch, K. v.: Mitwirkung electrischer Ströme bei der Bildung einiger Mineralien. R. | 62 | 730 |
| — — Notizen über geologische Verhältnisse im Hegau. A. | 65 | 651 |
| Fritsch, K. v., W. Reiss und A. Stübel: „Santorin. Die Kaimeni-Inseln.“ R. | 67 | 485 |
| Fritsch, K. v., G. Hartung und W. Reiss: Tenerife, geologisch-topographisch dargestellt. R. | 68 | 367 |
| Fritsch, K. v. und W. Reiss: geologische Beschreibung der Insel Tenerife. R. 68 | 752 | 849 |
| Fritsch, W.: neues bei Kladno gefundenes Mineral; Kakoxen und Wavellit bei Cerhovic. B. | 64 | 701 |
| Fuchs, C.: der körnige Kalk bei Auerbach. R. | 61 | 495 |
| — — über Anhydrit-Krystalle. R. | 62 | 732 |
| — — der Granit des Harzes und seine Nebengesteine (Hornfels, Gneiss, Diorit, Syenit). Mineralogisch-chemische Monographie. A. | 62 | 769 |
| — — Zusammen-Vorkommen von Serpentin und Gabbro in Italien. B. | 63 | 343 |
| — — Schillerfels bei Schriesheim A. | 64 | 326 |
| — — Geologisches aus Neapel. B. | 64 | 821 |
| — — Notizen aus dem vulcanischen Gebiet Neapels. A. | 65 | 31 |
| — — „die vulcanischen Erscheinungen der Erde“. R. | 65 | 487 |
| — — über das specifische Gewicht einiger Silicate. A. | 65 | 576 |
| — — die Natur der Silicate. B. | 66 | 198 |
| — — die vulcanischen Erscheinungen der Erde im J. 1865. A. | 66 | 523 |
| — — die Lava der Ätna-Eruption im J. 1865. A. | 65 | 710 |
| — — die Laven des Vesuv. I. Th. A. | 66 | 667 |
| — — die vulcanischen Erscheinungen im Jahre 1866. A. | 67 | 325 |
| — — die neuesten vulcanischen Ereignisse auf Santorin. B. | 67 | 455 |
| — — Beiträge zur Mineral Chemie. A. | 67 | 822 |
| — — Bericht über die vulcanischen Erscheinungen des Jahres 1867. A. | 68 | 433 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Fuchs, C.: die Laven des Vesuv. II. Theil. A. | 1868 | 553 |
| — — über rothen Olivin. R. | 69 | 577 |
| — — die Laven des Vesuv. III. Theil. A. | 69 | 42 |
| — — die Laven des Vesuv. III. Theil. (Schluss.) | 69 | 169 |
| — — Bericht über die vulcanischen Ereignisse des Jahres 1868. A. | 69 | 686 |
| Fuchs, Edm.: „Mémoire sur le gisement salin de Stassfurt-Anhalt." R. | 67 | 221 |
| Fuchs, Th.: Beitrag zur Kenntniss der Conchylien-Fauna des vicentinischen Tertiärgebirges. R. | 69 | 634 |
| Fuhlrott: der fossile Mensch aus dem Neander-Thal. R. | 66 | 502 |

## G.

| | | |
|---|---|---|
| Gabb: neue Conchylien-Arten aus der oberen Kreide New-Yersey's. R. | 61 | 765 |
| Garrigou: Entdeckung von Paloplotherium. R. | 64 | 759 |
| — — Gleichzeitigkeit des Menschen mit Ursus spelaeus. R. | 64 | 758 |
| Gastaldi: fossile Säugethiere Piemonts. R. | 61 | 126 |
| — — die fossilen Wirbelthiere Piemonts. R. | 62 | 255 |
| — — „sulla escavazione dei lacini lacustri compressi negli anfiteatri morenici". R. | 64 | 742 |
| — — Antracoterio di Agnana. R. | 64 | 761 |
| Gaudin, die Vegetation zur Zeit der Urmenschen. R. | 61 | 124 |
| — — Flora der Travertine in Toscana. R. | 61 | 509 |
| — — Lagerungs-Verhältnisse der fossilen Blätter bei Palermo. R. | 64 | 869 |
| Gaudin und Strozzi: Contributions à la flore fossile italienne. R. | 60 | 116 |
| Gaudry: Kunstproducte mit Knochen ausgestorbener Thiere. R. | 60 | 99 |
| — — fossile Pflanzen von Koumi auf Euböa. R. | 60 | 742 |
| — — Ausgrabungen bei Pikermi. R. | 61 | 372 871 |
| — — zu Pikermi gesammelte Säugethier-Arten. R. | 61 | 766 |
| — — tertiäre Raubthiere von Pikermi in Griechenland. R. | 62 | 120 |
| — — Camelopardalis Attica von da. R. | 62 | 121 |
| — — geologische Ergebnisse der im Auftrage der Academie in Griechenland veranstalteten Nachgrabungen. R. | 62 | 616 |
| — — Ergebnisse der Grabungen bei Pikermi. R. | 62 | 638 |
| — — fossile Affen von Pikermi. R. | 62 | 752 |
| — — Vögel- und Reptilien-Reste von Pikermi. R. | 63 | 245 |
| — — über den fossilen Affen Griechenlands. R. | 63 | 618 |
| — — Verwandtschaft zwischen fossilen und lebenden Hyänen. R. | 64 | 119 |
| — — Überblick über die Untersuchungen der fossilen Thiere von Pikermi. R. | 66 | 876 |
| — — Considérations générales sur les animaux fossiles de Pikermi. R. | 68 | 113 |
| — — über das durch Frossard in Muse bei Autun aufgefundene Reptil. R. | 68 | 121 |
| — — über Actinodon latirostris aus der unteren Dyas von Muse bei Autun. R. | 69 | 250 |
| Gauldree-Boileau: das Petroleum in Canada R. | 64 | 731 |
| Gautier-Lacroze: Analyse des Alaunfels vom Montdore. R. | 64 | 723 |
| Geikie: Chronologie der Trappgesteine Schottlands. R. | 62 | 502 |
| — — Hebung der Küste am Firth-of-Forth in historischer Zeit. R. | 62 | 732 |
| — — permische Vulcane in Schottland. R. | 66 | 615 |
| Geinitz, H. B.: neuere Untersuchungen über die Anthracite. R. | 60 | 356 |
| — — Saurier-Fährten des Rothliegenden im Riesengebirge; Reise in England; Lophoctenium Hallanum; Nemapodia tenuissima; Belinurus der Kohlen-Formation; Gyromices Ammonis; Pygocephalus Cooperi; Calamites transitionis; Sagenaria Veltheimiana; Stigmaria inaequalis; Knorria imbricata. B. | 61 | 65 |
| — — über den Riesenhirsch des Dresdener Museums. A. | 61 | 669 |
| — — Dyas oder Zechstein-Formation und das Rothliegende. I. R. | 62 | 227 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Geinitz, H. B.: Thierfährten und Crustaceen-Reste in der unteren Dyas bei Hohenelbe. R. | 1863 | 118 |
| — — Beiträge zur Kenntniss der organischen Überreste der Dyas. A. | 63 | 385 |
| — — Vorkommen von Trilobiten bei Hohenelbe. B. | 63 | 444 |
| — — über zwei neue dyadische Pflanzen A. | 63 | 525 |
| — — Podocrates Dülmensis und Klytia Leachi. R. | 63 | 757 |
| — — über organische Überreste in dem Dachschiefer von Wurzbach bei Lobenstein. A. | 64 | 1 |
| — — Palaeosiren Beinerti, ein neues Reptil aus der unteren Dyas vom Ölberg bei Braunau. A. | 64 | 513 |
| — — zwei Arten von Spongillopsis. A. | 64 | 517 |
| — — über einige seltenere Versteinerungen aus der unteren Dyas und aus der Steinkohlen-Formation. A. | 65 | 385 |
| — — „Geologie der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder". R. | 66 | 102 |
| — — über Arthropleura armata in der Steinkohlen-Formation von Zwickau. A. | 66 | 144 |
| — — Carbonformation und Dyas in Nebraska. A. | 67 | 1 |
| — — Beiträge zur älteren Flora und Fauna. A. | 67 | 273 |
| — — geologische Mittheilungen über die Pariser Industrie-Ausstellung im J. 1867. A. | 68 | 1 |
| — — die Galérie Archéologique oder Galérie d'histoire du travail der Pariser Ausstellung im J. 1867. A. | 68 | 129 |
| — — über das Meteoreisen von Nöbdenitz und über eine bei Weissenborn unfern Zwickau gefundene Eisenmasse. A. | 68 | 459 |
| — — über fossile Pflanzenreste aus der Dyas von Val Trompia. A. | 69 | 456 |
| — — über fossile Pflanzen aus der Steinkohlenformation am Altai. A. | 69 | 462 |
| Geinitz und Liebe: über ein Äquivalent der takonischen Schiefer Nord-Amerika's in Deutschland. R. | 67 | 244 |
| Geinitz, Gümbel, v. Hochstetter und Schlönbach: neueste Forschungen im Gebiete des Quader-Gebirges oder der Kreide-Formation von Sachsen, Bayern und Böhmen. R. | 69 | 493 |
| Geist: über Aluminit von Halle. R. | 61 | 191 |
| Gemmellaro, G.: die vulcanischen Kegel von Paterno und Motta am Ätna. R. | 63 | 843 |
| — — die Caprinelliden aus der oberen Zone der Ciaca der Umgebungen von Palermo. R. | 68 | 504 |
| — — über eine neue Sphärolithen-Art aus dem Turonien von Sicilien. R. | 68 | 506 |
| — — über die Grotte von Carburanceli. R. | 68 | 506 |
| — — Nerineen aus der Ciaca der Umgebung von Palermo. R. | 68 | 508 |
| — — Naticiden und Neritinen aus dem Jura des n. Sicilien. R. | 68 | 509 |
| — — „studii palaeontologici sulla fauna dell calcario a Terebratula janitor del Nord di Sicilia". R. | 69 | 255 |
| Genth: Albit von Calveras. R. | 61 | 334 |
| — — über Whitneyit, Algodonit und Domeykit. R | 62 | 485 |
| — — Kupferglanz pseudomorph nach Bleiglanz; über Millerit, Automolit, Pyrop und Kalkepidot. R. | 62 | 601 |
| — — über amerikanische Tellur-Mineralien. R. | 68 | 844 |
| — — Cosalit, ein neues Mineral R. | 68 | 847 |
| — — Analyse des Boulangerit von Nevada. R. | 69 | 84 |
| — — Brochantit von Arizona R | 69 | 85 |
| Gentill: Gletscher-Ablagerungen bei Vergiate. R. | 67 | 752 |
| Gergens: tertiäre Schildkröten-Eier zu Oppenheim im Mainzer Becken. B. | 60 | 554 |
| — — Entstehung von Schwefel-Krystallen in Mineralien-Sammlungen. A. | 61 | 551 |
| — — über tertiäre Blutegel-Cocons bei Mainz. A | 61 | 670 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Gervais: Hystrix major in Knochen-Breccie von Ratoneau. R. . . | 1860 | 864 |
| — — Hipparion crassus von Perpignan. R. . . . . | 60 | 877 |
| — — grosse Lophiodon-Art von Braconnac bei Lotrec. R. . . . | 62 | 637 |
| — — fossiler Vogel von Armissan. R. . . . . | 62 | 637 |
| — — Mesoplodon Christoli, neuer Wal aus der Ziphioden-Familie. R. | 62 | 751 |
| Gesner: Steinölquellen in Nord-Amerika R. . . . . | 63 | 224 |
| Giebel: Fauna der Braunkohle von Rippersrode. R. . . . . | 61 | 125 |
| — — ächte Knochenfische im Steinkohlengebirge. R. . . . . | 61 | 623 |
| — — tertiäre Knochen von Latdorf. R. . . . . | 61 | 637 |
| — — Aeschna Wittei von Solenhofen. R. . . . . | 61 | 768 |
| — — Omphalia in der subhercynischen Kreide-Formation R. . . | 63 | 251 |
| — — Wirbelthiere und Insectenreste im Bernstein R. . . . . | 63 | 868 |
| — — Limulus Decheni im Braunkohlen-Sandstein bei Teuchern. R. | 63 | 868 |
| — — Fauna der Braunkohlen-Formation von Latdorf. R. . . . . | 65 | 378 |
| — — Taxodon Burmeisteri von Buenos Aires R. . . . . | 67 | 124 |
| — — die im zoologischen Museum der Universität Halle aufgestellten Säugethiere. R. . . . . | 67 | 124 |
| Giordano: Besteigung des Montblanc. R. . . . . | 65 | 766 |
| Girard, H: „Handbuch der Mineralogie". Leipz. 1862. R. . . . . | 62 | 198 |
| — — Anhydrit-Krystalle von Stassfurt. B. . . . . | 62 | 591 |
| — — Hövelit, ein neues Mineral. B. . . . . | 63 | 568 |
| Gladstone: über Howit. R. . . . . | 63 | 836 |
| Glückselig: Vorkommen des Apatit und Flussspath zu Schlaggenwald. R. | 64 | 713 |
| Göbel: Bittersalz von der Insel Oesel. R. . . . . | 65 | 238 |
| — — chemische Untersuchung der Zinkblüthe von Taft in Persien. R. | 65 | 324 |
| — — über das Erdeessen in Persien und chemische Untersuchung zweier zum Genuss verwendeter Substanzen R. . . . . | 65 | 334 |
| Godwin-Austen: über den Himalaya. R. . . . . | 66 | 114 |
| — — Carbon-Gesteine des Thales von Kaschmir. R. . . . . | 66 | 627 |
| — — über die känozoischen Formationen Belgiens. R. . . . . | 67 | 120 |
| Göppert, H R: Flora der silurischen, der devonischen und der unteren Kohlen-Formation. A. . . . . | 60 | 48 |
| — — Vorkommen versteinerter Hölzer in Schlesien. R. . . . . | 60 | 120 |
| — — über versteinerte Wälder. R. . . . . | 60 | 378 |
| — — Flora der Silur-, Devon- und unteren Kohlenformation. R. . | 61 | 628 |
| — — polare Tertiär-Flora. R. . . . . | 61 | 506 |
| — — fossile Flora Russlands. R. . . . . | 61 | 348 |
| — — die Kohlen von Malewka R. . . . . | 61 | 716 |
| — — Hauptpflanzen der Steinkohlen-Formation R. . . . . | 62 | 633 |
| — — über die in der Geschiebe-Formation vorkommenden versteinerten Hölzer. R. . . . . | 63 | 378 |
| — — über Stigmaria ficoides. R. . . . . | 63 | 762 |
| — — Speerkies als Vererzungsmittel von Stigmaria R. . . . . | 64 | 75 |
| — — lebende und fossile Cycadeen R. . . . . | 64 | 122 |
| — — ächte Monokotyledonen in der Kohlen-Periode. R. . . . . | 64 | 123 |
| — — die Tertiär-Flora von Java. A. . . . . | 64 | 177 |
| — — Einschlüsse im Diamant. A. . . . . | 64 | 198 |
| — — grosser Sigillarien-Stamm auf der Ruben-Grube im Glatzer Kreise. B. . . . . | 64 | 692 |
| — — die Flora der permischen Formation R. . . . . | 64 | 744 |
| — — die Gattung Noeggerathia R. . . . . | 64 | 874 |
| — — über die Darwin'sche Transmutations-Theorie mit Beziehung auf die fossilen Pflanzen. A. . . . . | 65 | 296 |
| — — über die Flora der permischen Formation. A. . . . . | 65 | 301 |
| — — Einschlüsse im Diamant. R. . . . . | 65 | 353 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Göppert: die fossile Flora der permischen Formation. R. | 1865 | 373 |
| — — über das Vorkommen von Baumfarn in der fossilen Flora, besonders in der Kreideformation. A. | 65 | 395 |
| — — Flora der permischen Formation. R. | 65 | 892 |
| — — Beiträge zur Kenntniss fossiler Cycadeen. A. | 66 | 129 |
| — — eigenthümlicher Bernstein-Fund bei Namslau in Schlesien. R. | 66 | 505 |
| — — über Aphyllostachys. R. | 66 | 764 |
| — — über die ältesten fossilen Landpflanzen und andere Pflanzen der paläozoischen Formation. B. | 67 | 462 |
| — — Abstammung des Bernsteins. R. | 68 | 234 |
| Goldenberg: zur Kenntniss der fossilen Insecten in der Steinkohlen-Formation. A. | 69 | 158 |
| Goppelsröder: Analyse des Melopsit. R. | 69 | 232 |
| — — chemische Beschaffenheit von Basels Grund-, Bach-, Fluss- und Quellwasser. R. | 69 | 597 |
| Gosselet: „programme d'une description géologique et minéralogique du Dep. du Nord". R. | 68 | 225 |
| — — über Dumont's systéme ahrien R. | 69 | 588 |
| — — paläontologische Studien über das Dep. du Nord und über die Kreidegesteine bei Douai. R. | 69 | 600 |
| Gosselet und Malaise: über die Silurformation der Ardennen. R. | 69 | 600 |
| Gould: über Mithracites. R. | 61 | 384 |
| Graff: die Kupfergruben von L'Alp R. | 67 | 211 |
| Gras, Sc.: Nothwendigkeit zwei Gletscher-Perioden in den Alpen anzunehmen. R. | 60 | 741 |
| — — Trennung der Ancyloceras-Mergel vom Neocomien der Alpen. R. | 61 | 734 |
| Gredler: die Urgletscher-Moränen aus dem Eggenthale im Gebiete von Botzen. R. | 69 | 597 |
| Greg: neueste Meteorsteinfälle. R. | 62 | 497 |
| Greppin: „les sources du Jura Bernois". R. | 68 | 630 |
| — — „essai géologique sur le Jura Suisse". R. | 68 | 758 |
| Grewingk: paläolithische Schichtenfolge Livlands. B. | 61 | 60 |
| — — Geologie von Liv- und Kurland. R. | 62 | 618 |
| — — über Hoplocrinus dipentas und Baerocrinus Ungeri. R. | 67 | 633 |
| Grewingk und Schmidt: die Meteoritenfälle von Pillistfer, Buschhof und Igast in Liv- und Kurland. R. | 65 | 99 |
| Griepenkerl: neue Ceratiten aus dem Wellenkalk Braunschweigs. R. | 61 | 243 |
| Grindley: gewisse Fährten in den Manx-Schiefern. R. | 66 | 379 |
| Groddeck, v.: über die Erzgänge des n.w. Oberharzes. R. | 68 | 98 |
| — — über Gericke's Schrift: die Gangthonschiefer in den Erzgängen des n.w. Oberharzes. B. | 69 | 357 |
| — — über ein neues Vorkommen von sog. Silbersand zu Andreasberg. A. | 69 | 445 |
| Groth, P.: über den Titanit des Plauen'schen Grundes. A. | 66 | 45 |
| — — grosser Topas-Krystall. B. | 66 | 208 |
| — — über Gesteine vom Kyffhäuser. B. | 67 | 459 |
| Grüner: Geologie des Loire-Departements. R. | 60 | 835 |
| Gruner: über die fossile Flora des Steinkohlen-Bassins von Ahun. R. | 69 | 762 |
| Grünewaldt, v.: sedimentäre Gebirgs-Formationen um Katharinenburg. R. | 63 | 631 |
| Gümbel, C. W.: geognostische Übersichtskarte von Bayern. B. | 60 | 67 |
| — — geognostische Karte von Bayern. R. | 60 | 94 |
| — — zur Flora des Rothliegenden in der Oberpfalz. R. | 60 | 383 |
| — — Alter der Münchberger Gneiss-Partie im Fichtelgebirge. A. | 61 | 257 |
| — — „geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges". I. R. | 61 | 356 |
| — — geognostische Verhältnisse des ostbayerischen Grenzgebirges. R. | 61 | 600 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Gümbel, C. W.: geognostische Beschreibung des Königreichs Bayern; I. das bayerische Alpengebirge und seine Vorländer 1861. R. | 1862 | 200 |
| — — Revision der Goniatiten des Fichtelgebirges. A. | 62 | 285 |
| — — Pseudomorphosen nach Steinsalz von Reichenhall. R. | 62 | 356 |
| — — Zahn von Anthracotherium magnum in der bayerischen oligocänen Molasse; neue Ammoniten der Gosaumergel; Foraminiferen in den Streitberger Kalken. B. | 62 | 464 |
| — — Vorkommen der Blei- und Zinkerze im Wetterstein-Gebirge. R. | 62 | 736 |
| — — über die Megalodus-Arten. R. | 62 | 759 |
| — — die Dachstein-Bivalve, Megalodon triqueter und ihre alpinen Verwandten. R. | 62 | 1007 |
| — — die Streitberger Schwammlager und ihre Foraminiferen-Einschlüsse. R. | 63 | 120 |
| — — über das Alter der Münchberger Gneissgruppe. A. | 63 | 312 |
| — — Antozonhaltiger Wölsendorfer Flussspath. R. | 63 | 718 |
| — — geognostische Verhältnisse des Fichtelgebirges. R. | 63 | 738 |
| — — über ein neues Erdharz, Euosmit, aus einem Braunkohlenlager bei Thumsenreuth. A | 64 | 10 |
| — — Mittheilungen aus den bayerischen Alpen. B. | 64 | 49 |
| — — Analysen ostbayerischer Pechkohlen, von Bohnerz und Molassemergel. B. | 64 | 52 |
| — — über Clymenien in den Übergangs-Gebilden des Fichtelgebirges. R. | 64 | 375 |
| — — die Wurzbacher Schiefer; Orthis-Schale in einem chloritischen Schiefer bei Hirschberg. B. | 64 | 457 |
| — — Vorkommen von Süsswasser-Conchylien am Irmelsberg, Thüringer Wald. A. | 64 | 645 |
| — — Vorkommen der Voltzia heterophylla. B. | 65 | 63 |
| — — die Nummuliten führenden Schichten des Kressenberges in Bezug auf ihre Darstellung in der Lethaea geognostica von Südbayern. A. | 65 | 129 |
| — — neues Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in den jurassischen Ablagerungen Frankens. R. | 65 | 349 |
| — — geognostische Verhältnisse der fränkischen Alb. R. | 65 | 636 |
| — — Eozoon im ostbayerischen Urgebirge. B | 66 | 210 |
| — — Eozoon im Urkalk von Maxen. B. | 66 | 579 |
| — — älteste Cultur-Überreste in Bayern. R. | 66 | 503 |
| — — die geognostischen Verhältnisse des fränkischen Triasgebietes. R. | 66 | 504 |
| — — Eozoon im ostbayerischen Urgebirge. R. | 66 | 481 |
| — — Comatula oder Belemnites in den Nummuliten-Schichten des Kressenberges. A. | 66 | 564 |
| — — untere Triasschichten in Hochasien. R. | 66 | 619 |
| — — geognostische Verhältnisse der Pfalz. R. | 66 | 855 |
| — — neue Fundstellen von Gosauschichten und Vilserkalk bei Reichenhall. R. | 67 | 510 |
| — — über die Gliederung der sächsischen und bayerischen oberen Kreideschichten. A. | 67 | 664 |
| — — Gliederung der oberen Schichten der Kreideformation in Böhmen. A. | 67 | 795 |
| — — über einen Versuch der bildlichen Darstellung krystallinischer Gesteine mittelst Naturselbstdruck. R. | 68 | 101 |
| — — weitere Mittheilungen über das Vorkommen von Phosphorsäure in Schichtgesteinen Bayerns. R. | 68 | 109 |
| — — Pyrophyllit als Versteinerungs-Mittel. R. | 69 | 82 |
| — — Geognostische Beschreibung des ostbayerischen Grenzgebirges oder des bayerischen und Oberpfälzer Waldgebirges. R. | 69 | 94 |
| — — Eozoon im körnigen Kalke Schwedens. A. | 69 | 551 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Guiscardi: über Sphaerulites Tenoreani. R. | 1863 | 512 |
| — — „studia sulla famiglia delle Rudiste". R. | 64 | 512 |
| — — sul livello del mare nel golfo di Pozzuoli. R. | 66 | 633 |
| — — sul genere Aturia. R. | 66 | 634 |
| Gurlt: zerbrochene und wieder verwachsene Geschiebe. R. | 61 | 225 |
| — — Sandstein durch Hitze verändert. R. | 61 | 230 |
| — — Erzvorkommen am Maubacher Bleiberge bei Düren. R. | 61 | 609 |
| — — Vorkommen von Titaneisen bei Egersund. R. | 63 | 594 |
| — — Vorkommen von Zinkerzen auf sog. Contact-Lagern bei Drammen in Norwegen. R. | 63 | 838 |
| — — Umwandelung von Dolomit in Topfstein. R. | 64 | 79 |
| — — Ähnlichkeit gewisser Mineral-Vorkommnisse in den vulcanischen Gesteinen der Rheinlande und den plutonischen Gesteinen Norwegens. R. | 64 | 715 |
| Gutberlet: krystallinische Sandsteine in Hessen. R. | 61 | 860 |
| Gutbier, v.: die Sandformen der Dresdener Haide. R. | 66 | 377 |
| Guthe: über Anhydrit-Zwillinge. B. | 63 | 443 |
| — — Zwillings-Krystalle des Comptonit. R. | 65 | 479 |
| Guyeraet: Fossilien von Gouchouc in Thibet. R. | 64 | 758 |


## H.


| | | |
|---|---|---|
| Haast, J.: Ausgrabungen von Dinornis auf Neuseeland. B. | 67 | 840 |
| Haeckel: über fossile Medusen. R. | 66 | 244 |
| — — zwei neue fossile Medusen aus der Familie der Rhizostomiden. A. | 66 | 257 |
| Hagen: Petalura acutipennis aus Braunkohle von Sieblos. R. | 60 | 378 |
| Hague, A.: chemische Untersuchung einiger Laven von Hawai. B. | 65 | 308 |
| Hahn, H.: Carmenit, ein neues Mineral. R. | 65 | 326 |
| Haidinger, W.: über Breithaupt's 13 Krystallisations-Systeme. R. | 60 | 347 |
| — — über südamerikanische Mineralien. R. | 60 | 440 |
| — — Meteorit von St. Denis-Westrem. R. | 61 | 612 |
| — — das Meteoreisen von Tula. R. | 62 | 110 |
| — — Meteorit von Parnallee bei Madura. R. | 62 | 490 |
| — — Meteoreisen von Melbourne in Australien. R. | 62 | 606 |
| — — Meteoreisen von Rogue River Mountain in Oregon und Taos in Mexico. R. | 62 | 597 |
| — — Meteorit von Yatoor bei Nellore in Hindustan. R. | 62 | 597 |
| — — die Meteoriten des Mineralien-Cabinets in Wien. R. | 62 | 997 |
| — — Pseudomorphosen von Glimmer nach Cordierit. R. | 63 | 197 |
| — — Meteoritenfall in Indien. R. | 64 | 237 |
| — — neuer Fundort des Wölchit. R. | 64 | 478 |
| — — Rutil und Apatit von der Saualpe. R. | 65 | 323 |
| — — Meteoreisen in Troja. R. | 65 | 359 |
| — — Meteorsteinfall am 9. Juni 1866. R. | 66 | 826 |
| — — „Geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie". R. | 66 | 752 |
| — — der Meteorsteinfall bei Knyahinya am 9. Juni 1866. R. | 67 | 371 |
| — — Licht, Wärme und Schall bei Meteoriten-Fällen. R. | 69 | 758 |
| Hall, J.: über einige Brachiopoden, mit Beziehung auf Cryptonella, Centronella, Meristella. R. | 63 | 760 |
| — — Graptolithes of the Quebec Group. R. | 66 | 121 |
| — — Note upon the genus Palaeaster. R. | 68 | 126 |
| — — descriptions of some new species of Crinoidea. R. | 68 | 254 |
| — — relative Vertheilung der Fossilien in den Schichten des n. Devon. R. | 69 | 110 |
| — — Geologie einiger Theile von Minnesota und St. Paul. R. | 69 | 602 |
| Hankel: die thermoelectrischen Eigenschaften des Bergkrystalls. R. | 67 | 205 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Hantken: neues Meerschaum-Vorkommen in Bosnien. R. . . . | 1867 | 860 |
| Hardouin: über die Geologie der Provinz Constantine. R. . . . . | 69 | 587 |
| Harkness: Sandsteine im n.w. England und in Dumfrieshire. R. . . | 63 | 225 |
| — — die Skiddaw-Schiefer. R. . . . . | 63 | 867 |
| — — Reptilien führende Schichten im n.ö. Schottland. R. . . . | 65 | 508 |
| — — metamorphische und fossilhaltige Gesteine in der Gegend von Galway. R. . . . . | 67 | 491 |
| Harley: neue Cephalaspis-Arten. R. . . . . | 60 | 767 |
| — — das Knochenbett von Ludlow und seine Kruster-Reste. R. . | 62 | 746 |
| Harte: neue Echinodermen aus dem gelben Sandsteine von Donegal. R | 65 | 365 |
| — — neuer Echinoderme aus dem Yellow sandstone von Donegal. R. | 66 | 636 |
| Hartung, G.: die Azoren. R. . . . . | 61 | 221 |
| — — die geologischen Verhältnisse der Insel Gran Canaria. R. . . | 63 | 845 |
| — — geologische Beschreibung der Insel Madeira und Porta Santa. R. | 64 | 493 |
| — —, H.: Petrefacten aus den Phycodes-Schiefern im Lobenstein'schen. B. | 68 | 65 |
| Hassenkamp: fossile Insecten der Rhön. R. . . . . | 61 | 255 |
| Hauer, Fr. v.: sogen. Karpathen-Sandstein im n.ö. Ungarn. R. . . | 60 | 90 |
| — — geologische Übersichtskarte vom ö. Siebenbürgen. R. . . . | 60 | 107 |
| — — die Hochalpen bei Kronstadt. R. . . . . | 60 | 362 |
| — — zwei neue Mineral-Vorkommen aus Siebenbürgen. R. . . . | 60 | 439 |
| — — Verbreitung der Congerien- und Inzersdorfer Schichten in Österreich. R. . . . . | 60 | 735 |
| — — Geologie der Gegend von Kronstadt. R. . . . . | 61 | 96 |
| — — zur Cephalopoden-Fauna der Hallstätter Schichten. R. . . . | 61 | 243 |
| — — geologische Übersichtskarte von Siebenbürgen. R. . . . . | 62 | 364 |
| — — Petrefacten der Kreide-Formation des Bakonyer Waldes. R. | 62 | 632 |
| — — die Ammoniten aus dem sog. Medolo der Berge Domaro und Guglielmo im Val Trompia. R. . . . . | 62 | 767 |
| — — Triaskalksteine im Vertesgebirge und im Bakonyer Walde. R. | 62 | 886 |
| — — geologische Übersichtskarte von Dalmatien. R. . . . . | 63 | 474 |
| — — Gliederung der oberen Trias in den lombardischen Alpen. R. . | 66 | 482 |
| — — Choristoceras, neue Cephalopoden-Sippe aus den Kössener Schichten. R. . . . . | 66 | 640 |
| — — die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. R. . . . . | 66 | 767 |
| — — neue Cephalopoden aus den Gosau-Gebilden der Alpen. R. | 66 | 864 |
| — — geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie. R. | 67 | 749 |
| — — dasselbe. Bl. VI. Östliche Alpenländer. R. . . . . | 68 | 617 |
| — — Halianassa Collini aus einer Sandgrube bei Hainburg. R. . . | 68 | 246 |
| — — über die Ergebnisse der Aufnahme der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien im Sommer 1868. A. . . . . | 69 | 27 |
| — — geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie Bl. X. Dalmatien. R. . . . . | 69 | 609 |
| Hauer, Fr. v. und v. Richthofen: die Umgegend von Hermannstadt. R. | 60 | 89 |
| Hauer, Fr. v. und G. Stache: Geologie Siebenbürgens. R. . . . . | 64 | 724 |
| Hauer, K. v.: die Mineralquellen bei Grosswardein und Bikszad. R. | 60 | 79 |
| — — Krystalle in stofflich verschiedenen Medien; Episomorphie. R. | 60 | 231 |
| — — Chromeisenstein von Freudenthal in der Militärgrenze. R. . . | 62 | 1000 |
| — — Verhältniss des Brenn-Werthes der fossilen Kohlen in Österreich zu ihrem Formations-Alter. R. . . . . | 63 | 727 |
| — — Kohlen-Vorkommnisse in den österreichischen Alpen. R. . . | 64 | 365 |
| — — Salinenbetrieb in Österreich in chemischer Beziehung. R. . . | 65 | 750 |
| — — Thonerdehydrat aus der Wochein. R. . . . . | 66 | 457 |
| — — Analysen der Eruptiv-Gesteine von Santorin. R. . . . . | 66 | 459 |
| — — Analysen vulcanischer Gesteine von St. Paul. R. . . . . | 66 | 604 |
| — — Gesteine mit Lithophysen-Bildung von Telki-Banya. R. . . . | 66 | 735 |
| — — die Eruptiv-Gesteine von Santorin. R. . . . . | 66 | 837 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Hauer, K. v.: Pseudomorphosen von Chlorit nach Granat. R. | 1867 | 198 |
| — — die Gesteine von den Mai-Inseln in der Bucht von Santorin. R. | 67 | 206 |
| — — Untersuchungen über die Feldspathe in den ungarisch-siebenbürgischen Eruptivgesteinen. R. | 67 | 360 |
| — — dasselbe. R. | 68 | 205 |
| Haughton: Hislopit, ein neues Mineral aus Ostindien. R. | 60 | 444 |
| — — Analyse des Hunterits aus Central-Indien. R. | 60 | 570 |
| — — die Meteorsteine von Killeter. R. | 62 | 882 |
| — — Ursprung des Granits. R. | 63 | 113 |
| — — irländische Dolomite. R. | 63 | 369 |
| — — die Granite von Donegal. R. | 63 | 474 |
| — — über Cervus elephas. R. | 64 | 510 |
| — — die Granite und Syenite von Donegal. R. | 64 | 852 |
| — — über ein Gestein vom Skavig-See auf Skye. R. | 65 | 488 |
| — — der körnige Kalk von Jona. R. | 66 | 465 |
| — — Analyse einiger Zeolithe von Bombay. R. | 67 | 200 |
| — — Analyse eines Basaltes von Neuseeland. R. | 67 | 371 |
| — — Analyse einer Lava von Neuseeland. R. | 67 | 484 |
| — — Vergleichung der Granite von Cornwall und Devonshire mit denen von Leinster und Mourne. R. | 69 | 756 |
| Haushofer, K.: über die Zusammensetzung des Glaukonit. R. | 66 | 600 |
| — — Gymnit von Passau. R. | 67 | 609 |
| — — ein neues chloritähnliches Mineral von Bamberg. R. | 67 | 609 |
| — — glaukonitischer Kalk von Würzburg. R. | 67 | 735 |
| — — Hülfstabellen zur Bestimmung der Gesteine. R. | 68 | 93 |
| — — Analyse des Glaukonits von Havre. R. | 68 | 360 |
| — — Zersetzung des Granits durch Wasser. R. | 68 | 611 |
| — — über den Malakolith von Gefrees. R. | 68 | 355 |
| — — Thomsonit von der Seisser Alpe | 69 | 84 |
| Hautefeuille: Darstellung von Rutil und Brookit. R. | 65 | 88 |
| Hawkshaw: geologische Beschreibung des ersten Katarakts in Obergegypten. R. | 67 | 748 |
| Hayden: geologische Skizze der Quellen-Gegend des Missouri. R. | 61 | 355 |
| — — Hebungs-Periode des Quellen-Bezirkes des Missouri im Felsenbirge. R. | 62 | 743 |
| — — Fortschritte in der wissenschaftlichen Erforschung Amerika's. R. | 63 | 859 |
| — — über die geologischen Formationen längs des ö. Randes des Felsggebirges. R. | 69 | 760 |
| Hayes: Feldspath im geschmolzenen Zustande. R. | 62 | 349 |
| Hébert: Süss- und Seewasser-Ablagerungen um Provins. R. | 62 | 615 |
| — — das Juragebirge in der Provence. R. | 62 | 748 |
| — — Thon mit Kieselgeröllen, tertiäre Meeressande und Süsswasser-Kalke des n.w. Frankreich. R. | 63 | 127 |
| weisse Kreide und Mergelkreide des Pariser Beckens. | 64 | 121 |
| — — „observations sur les calcaires à Terebratula diphya du Dauphiné". R. | 68 | 118 |
| — — „le terrain crétacé de Pyrénées. R. | 68 | 233 |
| Hector: geologische Aufnahme zwischen dem Oberen See und dem Stillen Ocean. R. | 62 | 219 |
| Heddle: Wulfenit in Kirkcudbrightshire. R. | 66 | 727 |
| Heer, O.: Beweise aus der Tertiär-Flora für Temperatur-Abnahme. R. | 60 | 599 |
| — — Flora tertiaria Helvetiae. III. R. | 60 | 617 |
| — — über fossile Calosoma-Arten. A. | 61 | 52 |
| — — Insecten-Fundgrube zu Öningen. B. | 61 | 173 |
| — — Pflanzen-Reste von St. Jorge auf Madera. B. | 61 | 318 |
| — — fossile Pflanzen aus Nebraska. R. | 61 | 505 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Heer, O.: die fossile Flora von Borey Tracey. R. | 1862 | 625 |
| — — fossile Pflanzen von Hempstead auf Wight. R. | 63 | 228 |
| — — fossile Pflanzen von Vancouver und britisch Columbien. R. | 66 | 115 |
| — — fossile Kakerlaken. R. | 66 | 116 |
| — — die Polarländer. R. | 67 | 501 |
| — — die Geinitzia cretacea, eine wirkliche Species; die Kreideflora des hohen Nordens. B. | 68 | 64 |
| — — fossile Hymenopteren aus Öningen und Radoboj. R. | 68 | 635 |
| — — „om de af Nordenskiöld ooch Blomstrand pa Spetzbergen upptäkta fossile växter". R. | 68 | 870 |
| — — Beiträge zur Kreideflora. I. Flora von Moletein in Böhmen | 69 | 114 |
| — — „flora fossilis arctica". R. | 69 | 612 |
| — — über die neuesten Entdeckungen im hohen Norden. R. | 69 | 765 |
| Heine: geognostische Untersuchung der Gegend von Ibbenbühren. | 63 | 855 |
| Heiningen: Vorkommen von Trachytconglomerat als Gang auf der Bleierzgrube Altglück bei Bennerscheid. R. | 65 | 486 |
| Heintz: künstliche Erzeugung von Boracit. R. | 61 | 81 |
| — — Analyse des Kryolith von Grönland. R. | 62 | 186 |
| Helmann: die Petrefacten Thüringens. R. | 63 | 242 |
| Helmersen, G. v.: Diluvial-Erscheinungen in Russland. A. | 60 | 36 |
| — — Kupfer aus Uralischer Grube. R. | 60 | 573 |
| — — Kupfer-Massen aus russischen Bergwerken. R. | 60 | 574 |
| — — das Olonezer Bergrevier. R. | 61 | 711 |
| — — geologische Karte von Russland. R. | 66 | 477 |
| — — die Bohrversuche zur Entdeckung von Steinkohlen auf der Samara-Halbinsel. R. | 69 | 247 |
| — — zur Frage über das behauptete Seichterwerden des asowschen Meeres. R. | 69 | 249 |
| — — die Steinkohlen-Formation des Urals und deren practische Bedeutung. R. | 69 | 379 |
| Helmhacker: über den Valait. R. | 68 | 84 |
| Henessy: Kräfte, welche zu verschiedenen Zeiten den Seespiegel zu ändern vermocht R. | 60 | 827 |
| — — Klima der Erde von der Vertheilung von Land und Wasser in verschiedenen Perioden bedingt. R. | 60 | 828 |
| Henrich, F: Argumente für einen feuerflüssigen Erdkern. B. | 67 | 458 |
| Hensel: fossiler Muntjac aus Schlesien. R. | 60 | 871 |
| — — Hipparion mediterraneum. R. | 61 | 367 |
| — — über Säugethier-Reste von Pikermi. R. | 63 | 240 |
| Herget: der Spiriferen-Sandstein und seine Metamorphosen. R. | 64 | 487 |
| — — die Thermalquellen zu Bad Ems. R. | 68 | 629 |
| Hermann, R.: klinorhombisches Magnesiahydrat oder Texalit. R. | 61 | 698 |
| — — über den Planerit. R | 63 | 470 |
| — — über den Kokscharowit. R. | 63 | 585 |
| — — über den Kupfferit. R. | 63 | 586 |
| — — über einen neuen Bagrationit R. | 63 | 723 |
| — — über die Zusammensetzung des Monazit. R | 65 | 237 |
| — — Zusammensetzung der Mineralien mit Tantal-ähnlichen Säuren R. | 65 | 855 |
| — — über die Zusammensetzung des Wöhlerit, Aeschynit und Euxenit. R | 66 | 89 |
| — — über den Ilmensäure-Gehalt des Columbits von Grönland. R. | 66 | 833 |
| — — über den Asperolith, ein neues Mineral. R. | 66 | 834 |
| — — über die Zusammensetzung des Tschewkinit. R. | 66 | 834 |
| — — Rewdanskit, ein neues Mineral. R. | 69 | 83 |
| — — über den Achtaragdit. R. | 69 | 86 |
| — — über Granatin, ein eigenthümliches Gestein. R. | 69 | 93 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Hermann, R.: über Tschewkinit von der Küste von Coromandel. R. | 1869 | 480 |
| — — Cyanochalcit, ein neues Mineral. R. | 69 | 579 |
| — — Hydrargillit und Wavellit von Chester County. R. | 69 | 579 |
| — — über den Hydrargillit von Villa rica in Brasilien. R. | 69 | 749 |
| — — über den Phosphorsäure-Gehalt des Diaspors vom Ural. R. | 69 | 749 |
| Herter: eigenthümliche Gesteine bei Ochozk. R. | 64 | 91 |
| Hertle: Vorkommen der Alpenkohle in den n.ö. Alpen. R. | 65 | 345 |
| Hessenberg: „mineralogische Notizen". R. | 61 | 183 692 |
| — — über Perowskit in Tyrol. R. | 62 | 196 |
| — — über Zwillinge des Chrysoberyll. R. | 62 | 196 |
| — — über Alexandrit-Krystalle. B. | 62 | 871 |
| — — „mineralogische Notizen". IV. R. | 63 | 367 |
| — — über Flussspath von Kongsberg. R. | 63 | 464 |
| — — über Bournonit. R. | 63 | 585 |
| — — Rutil von Magnet-Cove. R. | 63 | 593 |
| — — „mineralogische Notizen". No. 6. R. | 64 | 715 |
| — — über den Eisenglanz von St. Gotthard. R. | 64 | 842 |
| — — über den Linarit aus Cumberland. R. | 64 | 843 |
| — — über den Sphen aus dem Zillerthal. R. | 64 | 850 |
| — — über Zinnerz-Krystalle. R. | 65 | 237 |
| — — über den Hessenbergit. R. | 66 | 363 |
| — — Topas aus Mexico. R. | 66 | 364 |
| — — Klinochlor aus dem Zillerthal. R. | 66 | 365 |
| — — Kalkspath aus Island. R. | 66 | 452 |
| — — über Sphen vom Schwarzenstein. R. | 66 | 595 |
| — — „mineralogische Notizen". No. 8. R. | 68 | 349 |
| — — über den Greenovit von St. Marcel. R. | 68 | 479 |
| — — Eisenglanz von Keswick in Cumberland. R. | 68 | 483 |
| — — über den Sphen aus dem Zillerthal. R. | 68 | 605 |
| — — Pleonast mit Hexaeder-Flächen. R. | 68 | 605 |
| — — Hauyn von Marino am Albaner Gebirge. R. | 68 | 606 |
| Heusser: das Küstengebirge Brasiliens. R. | 60 | 835 |
| — — Diamanten in Brasilien. R. | 61 | 232 |
| Heusser und Claraz: „Ensayos conocimiento geognostico-fisico de la provincia de Buenos Aires". R. | 68 | 231 |
| Heyden, C. v.: Insecten aus rheinischer Braunkohle. R. | 60 | 377 |
| — — Insecten aus Braunkohle von Sieblos. R. | 60 | 377 |
| — — fossile Gallen zu Salzhausen. R. | 62 | 765 |
| Heymann: Jugend-Form von Eucalyptocrinus. R. | 62 | 633 |
| — — Pseudomorphosen von Glimmer nach Andalusit. R. | 63 | 467 |
| — — eigenthümliche Gruppirung von Bleiglanz. R. | 63 | 594 |
| — — geschlossene Hohlräume in den Felsen. R. | 64 | 88 |
| — — die drei Berge zu Siegburg. R. | 64 | 720 |
| — — Pyromorphit mit Umhüllungs-Pseudomorphosen von Brauneisenstein nach Weissbleierz. R. | 69 | 747 |
| Hind: Geologie von Neubraunschweig. R. | 66 | 111 |
| Hilgard: über die Geologie von Unter-Louisiana; Steinsalzablagerung von Petit-Anse. R. | 69 | 247 |
| Hilgendorf: Planorbis multiformis im Steinheimer Süsswasserkalk. R. | 67 | 250 |
| Hingenau, v.: Berge von Kiraly-Helmecs im Zempliner Comitate. R. | 60 | 357 |
| — — Veränderung der Sandsteine Mährens durch Mineralquellen. R. | 60 | 370 |
| — — Skizze des Bergamtes Nagyag. R. | 60 | 722 |
| Hinrichs: „Resumé de l'Atoméchanique ou la Chimie une Méchanique de Panatome". R. | 68 | 223 |
| Hinterhuber: Eisenspath-Vorkommen bei Swatoslau in Mähren. R. | 65 | 622 |
| Hirschwald: über die auf den Flächen und Schlifflächen der Quarz- | | |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Krystalle künstlich hervorgebrachten und natürlichen regelmässigen Vertiefungen. R. | 1869 | 865 |
| Hislop: Trapp mit Tertiär-Ablagerungen in Ostindien R. | 61 | 103 |
| Hitchcock: Umwandelung von Conglomeraten in Talk- und Glimmerschiefer und Gneiss durch Abplattung der Geschiebe und ihres Cäments. R. | 62 | 220 |
| — — „general report upon the geology of Maine". R. | 64 | 729 |
| — — Albertit von Neubraunschweig. R. | 66 | 237 |
| — — über Petroleum in Amerika. R. | 67 | 623 |
| — — über Dinichtys Herzeri, eine neue Art amerikanischer Fische aus der Devonformation. R. | 68 | 874 |
| Hochstetter, v.: Geologie der Provinz Auckland in Neuseelund. R. | 60 | 476 |
| — — Geologie der Provinz Nelson. R. | 60 | 479 |
| — — Thierreste und deren Lagerstätte in Neuholland. R. | 60 | 596 |
| — — Meteoreisen von Melbourne. B. | 61 | 316 |
| — — über die Flora von Neuseeland. A. | 63 | 160 |
| — — „Neuseeland". R. | 64 | 367 |
| — — geologische und paläontologische Werke über Neuseeland; tabellarische Übersicht der gemengten Massengesteine. B. | 64 | 695 |
| — — Vorkommen und Abarten von neuseeländischem Nephrit. R. | 65 | 79 |
| — — Dunit, körniger Olivinfels vom Dun-Berge, Neuseeland. R. | 65 | 94 |
| — — Erdöl und Erdwachs im Sandecer Kreis in Galizien. R. | 65 | 348 |
| — — Geologie von Neuseeland. R. | 65 | 874 |
| — — über Olivinfels. B. | 66 | 76 |
| — — Eozoon im krystallinischen Kalke von Krumnau. R. | 66 | 368 |
| — — geologische Skizze von Gibraltar. R. | 66 | 473 |
| — — Geologie des Caplandes. R. | 66 | 474 |
| — — Geologie der Insel St. Paul. R. | 66 | 479 |
| — — Gneiss der Gegend von Rio Janeiro. R. | 66 | 740 |
| — — geologische Ausflüge auf Java. R. | 67 | 115 |
| — — Beiträge zur Geologie und physikalischen Geographie der Nikobar-Inseln. R. | 67 | 234 |
| — — neue Funde von Moa-Resten und eines riesigen Walfisch-Skelets auf Neuseeland. R. | 67 | 500 |
| Hochstetter, v. und A. Bisching: „Leitfaden der beschreibenden Krystallographie". R. | 69 | 239 |
| Hocke: Petrefacten aus dem Kalk von Daubitz. B. | 65 | 214 |
| Höchst: plastischer Thon bei Diez. R. | 66 | 737 |
| Höfer, H.: Trachyte und Erzniederlage von Nagyag. R. | 66 | 464 |
| — — Analyse einiger Magnesia Gesteine aus Obersteiermark. R. | 67 | 366 |
| Hörnes: fossile Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. II. R. | 60 | 118 |
| — — krystallisirtes Gold von Vöröspatak R. | 63 | 463 |
| — — „fossile Mollusken des Tertiärbeckens von Wien". R. | 65 | 364 |
| — — geognostische Karte der Gegend von Krakau. R. | 66 | 469 |
| Hofmann, R.: Zusammensetzung der Polirschiefer und Kieselguhr aus Böhmen. R. | 64 | 629 |
| — — Analysen von Koprolithen aus Böhmen. R. | 64 | 630 |
| Hofmeister: Beryll-Analysen. R. | 61 | 334 |
| Hohenegger: geognostische Verhältnisse der Nordkarpathen in Schlesien. R. | 60 | 106 |
| — — Gesteins-Sammlung als Ergänzung zur geognostischen Karte der n. Karpathen in Schlesien. R. | 65 | 246 |
| — — geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem s. angrenzenden Gebiete von Galizien. R. | 68 | 105 |
| Holl: die älteren Gesteine von Süd-Devon und Ost-Cornwall. R. | 69 | 600 |
| Holland: über die Geologie von Sinai. R. | 67 | 622 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Holmberg: Metaxoit und Pikrofluit. R. | 1863 | 200 |
| — — Analyse des Bonsdorfit. R. | 63 | 365 |
| — — Tantalit von Sukhula. R. | 63 | 595 |
| Hon, le: Tertiär-Gebilde von Brüssel. R. | 63 | 861 |
| Hooker: fossile Pflanzen von Karoo Desert. R. | 61 | 638 |
| Hornberg: Desmin bei Schlaggenwald. R. | 62 | 601 |
| Hornstein: über den Nigrescit R. | 68 | 202 |
| — — über den Sphärosiderit von Steinheim. R. | 68 | 205 |
| — — über die Basaltgebilde des unteren Mainthales. R. | 68 | 210 |
| Hosaeus: Zusammensetzung der trockenen und fossilen Sepia. R. | 64 | 715 |
| How: Ölkohle von Pictou in Neuschottland; Vergleichung der Zusammensetzung verschiedener Kohlen. R. | 60 | 717 |
| — — über Boronatrocalcit in Neuschottland. R. | 62 | 191 |
| — — Gyrolit in Apophyllit des Trapps der Fundy-Bay R. | 62 | 191 |
| — — über den Pickeringit. R. | 64 | 477 |
| — — Beiträge zur Mineralogie von Neuschottland. R. | 66 | 724 |
| — — Siliborocalcit, ein neues Mineral. R. | 68 | 848 |
| Howse und Kirkby: über Geologie von Durham. R. | 65 | 358 |
| Hull: neuer Krebs aus dem Potsdam-Sandstein von Wisconsin. R. | 63 | 232 |
| Humphreys und Abbot: physikalische Verhältnisse des Mississippi-Stromes. R. | 63 | 490 |
| Hundt: Vorkommen von Magneteisen auf der Grube alte Birke bei Eisern. R. | 63 | 601 |
| Hunt, St.: Reactionen von Kalk- und Talksalzen auf Bildung von Gyps- und Talk-haltigen Gesteinen. R. | 60 | 585 |
| — — Vorkommen von Titaneisen am Lorenz-Flusse. R. | 61 | 853 |
| — — die triklinoedrischen Feldspathe in Canada. R. | 62 | 83 |
| — — Chromgranat in Canada R. | 62 | 188 |
| — — Eruptiv-Gesteine in Canada. R. | 62 | 193 |
| — — über das grüne Mineral in manchen Sandsteinen. R | 62 | 729 |
| — — über Epidosit in Canada. R. | 62 | 492 |
| — — Glaukonit in der unteren Silur-Formation. R. | 63 | 373 |
| — — chemische und geologische Geschichte des Bitumens und der Brandschiefer. R. | 63 | 851 |
| — — Vorkommen des Apatit in Canada. R. | 64 | 845 |
| — — chemische und mineralogische Beziehungen der metamorphischen Gesteine. R. | 64 | 864 |
| — — Zirkon und Spinell in Canada. R. | 65 | 325 |
| Husson: fossile Menschen bei Toul. R. | 64 | 758 |
| Hutton: geologische Skizze von Malta. R. | 66 | 752 |
| Huxley: Rhamphorhynchus Bucklandi und Crocodilus Hastingsiae. R. | 60 | 379 |
| — — Reptilien-Reste im Grünsand von Elgin. R. | 60 | 384 |
| — — Archeoteuthis Dunensis ist ein Fisch. R. | 62 | 227 |
| — — neue Labyrinthodonten aus dem Edinburger Steinkohlen-Felde. R. | 63 | 238 |
| — — stieläugiger Krebs aus der Steinkohlen-Formation von Paisley. R. | 63 | 238 |
| — — über Glyptodon. R. | 63 | 382 |
| — — über Diprotodon. R. | 63 | 384 |
| — — über Anthracosaurus Russeli. R. | 63 | 626 |
| — — über Ziphius und Belemnoziphius compressus. R. | 65 | 763 |
| — — über Acanthopolis horridus, ein neues Reptil aus dem Kreidemergel. R. | 67 | 504 |
| — — über Macrauchenia Boliviensis. R. | 62 | 632 |
| — — neues Exemplar des Telerpeton Elginense. R. | 67 | 761 |
| — — über Saurosternon Bainii und Pristerodon M'Kayi. R. | 68 | 876 |
| Huxley und Egerton: devonische Fische. R. | 62 | 374 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Huyssen: über einen im preussischen Steinsalzwerk neuerdings zu Stassfurt gemachten Fund. R. | 1868 | 483 |
| — — Auffindung eines Steinsalzlagers zu Sperenberg. R. | 68 | 615 |

## I.

| | | |
|---|---|---|
| Jackson: bauwürdiges Lager von Smirgel bei Chester in Massachussets. R. | 65 | 620 |
| — — Analyse einiger Mineralien aus den Smirgel-Gruben von Chester. R. | 67 | 104 |
| Jäger, G.: Schädel von Palapteryx. R. | 66 | 114 |
| Janisch: zur Charakteristik des Guano von verschiedenen Fundorten. R. | 63 | 221 |
| — — zur Charakteristik des Guanos. R. | 64 | 866 |
| Jansen, C.: physikalische Erklärung des Absatzes schwimmender Baumstämme zur Zeit der Steinkohlenbildung. A. | 68 | 162 |
| Jasche: die Gebirgsformationen der Grafschaft Wernigerode am Harz. R. | 63 | 609 |
| Jeis, E.: über kranke Knochen eines vorweltlichen Thieres. R. | 63 | 128 |
| Jenkins: tertiäre Mollusken von Mount Sela auf Java. R. | 64 | 755 |
| — — recente Art von Trigonia in tertiären Schichten Australiens. R. | 66 | 639 |
| Jenzsch: Structur der Turmalin-Krystalle. R. | 62 | 188 |
| — — Structur der Mellit-Krystalle. R. | 62 | 194 |
| — — über den Granat als wesentlichen Gemengtheil des Gneisses und der Gneissite des sächsischen Erzgebirges. A. | 67 | 165 |
| — — über die am Quarze vorkommenden sechs Gesetze regelmässiger Verwachsungen mit gekreuzten Hauptaxen R. | 68 | 86 |
| — — über seine mikroskopische Flora und Fauna krystallinischer Massengesteine. B. | 69 | 219 |
| Jeremjew: über russische Andalusite. R. | 66 | 724 |
| Igelström: zerlegt Pektolith und Stilpnomelan. R. | 61 | 489 |
| — — Pyrochroit, ein neues Mineral. R. | 65 | 84 |
| — — gediegenes Blei auf den Eisen- und Manganerz-Lagerstätten von Pajsberg. R. | 66 | 225 |
| — — über den Chondroarsenit. R. | 66 | 597 |
| — — die Mineralien von Horrsjöberg in Wermeland. R. | 67 | 105 |
| — — über Ekmanit, ein neues Mineral. R. | 67 | 361 |
| — — über den Richterit. R. | 67 | 478 |
| — — über den Hydrotephrit. R. | 67 | 607 |
| — — über den Pyroaurit. R. | 67 | 607 |
| — — bituminöse Schichten von Gneiss und Glimmerschiefer in Wermland. R. | 67 | 867 |
| — — über den Lamprophan. R. | 67 | 612 |
| — — über den Kataspilit. R. | 68 | 203 |
| — — Manganepidot aus Wermland. R. | 68 | 203 |
| — — Hyalophan aus Wermland. R. | 68 | 204 |
| Johnstrup: „om Faxekalken ved Annetorp Skaane". R. | 68 | 229 |
| Iljenkof: Analyse des Honigstetns von Malowka. R. | 61 | 84 |
| Jokely: Lagerungs-Verhältnisse des Kreidegebirges um Melnik. R. | 60 | 88 |
| — — Granitit von Haindorf bei Friedland. R. | 60 | 355 |
| — — das Velenczeer Gebirge bei Stuhlweissenburg. R. | 60 | 448 |
| — — Kreide-, Tertiär- und Diluvial-Ablagerungen im Leitmeritzer und Bunzlauer Kreise Böhmes. R. | 60 | 606 |
| — — über das Riesengebirge. R. | 61 | 858 |
| — — das Riesengebirge in Böhmen. R. | 63 | 213 |
| — — Pflanzen-Reste aus dem Basalttuff von Altwarnsdorf in Böhmen. R. | 63 | 127 |
| — — Quader- und Pläner-Ablagerungen des Bunzlauer Kreises in Böhmen. R. | 63 | 209 |
| — — Gliederung und Lagerungs-Verhältnisse des Rothliegenden im w. Theile des Jiciner Kreises in Böhmen. R. | 63 | 211 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Jones, R.: Rhizopoden-Fauna des Mittelmeeres und des s. Europäischen Neogengebirges. R. | 1861 | 236 |
| — — die fossilen Estheriae. B. | 61 | 834 |
| — — die Estheria-Arten. B. | 62 | 74 |
| Jones, R.: Nomenclatur der Foraminiferen. R. | 63 | 384 |
| Jones, R.: über Entomostraca. B. | 64 | 54 |
| — — „a Mönograph of the fossile Estheriae. R. | 64 | 125 |
| — — über Eozoon. B. | 65 | 63 |
| — — zweischalige Entomostraceen in der Steinkohlen-Formation von Britannien. R. | 65 | 505 |
| — — paläozoische Entomostraceen. R. | 66 | 119 |
| — — Nomenclatur der Foraminiferen. R. | 66 | 119 |
| — — Foraminiferen aus dem nordatlantischen und arktischen Ocean. R. | 66 | 487 |
| — — über paläozoische Entomostraceen. R. | 66 | 870 |
| — — über lebende und fossile zweischalige Entomostraceen. R. | 69 | 625 |
| — — über paläozoische Entomostraceen. R. | 69 | 625 |
| Jones & Holl: über paläozoische Entomostraceen; silurische Species R. | 67 | 244 |
| Jones & Kirkby: „on the Entomostraca of the carboniferous rocks of Scotland". R. | 69 | 124 |
| Jourdan: Rhizoprion, tertiäre Delphinen-Sippe. R. | 62 | 119 |
| — — Dinocyon Thenardi, tertiäre Hunde-Sippe. R. | 62 | 120 |
| — — das Siderolith-Gebirge. R. | 62 | 891 |
| Issel, A.: Knochenhöhle von Finale. R. | 65 | 767 |
| Juckes: Auszackungen im Knochen von Cervus megaceros. R. | 65 | 249 |
| — — Vergleich der Gesteine von Devonshire mit denen der Rheinprovinz. R. | 66 | 238 |
| — — Kohlenschiefer und alter rother Sandstein des s. Irland und n. Devonshire. R. | 67 | 236 |
| — — Beziehungen des alten rothen Sandsteins zur Devonformation. R. | 69 | 593 |
| Jung: chemische Untersuchung des Olivin aus dem Basalt von Unkel. R. | 60 | 831 |
| Junghuhn: Karte von Java. R. | 60 | 723 |


## K.


| | | |
|---|---|---|
| Karrer, F.: Foraminiferen im marinen Tegel des Wiener Beckens. R. | 62 | 621 |
| — — Auftreten der Foraminiferen in den brackischen Schichten des Wiener Beckens. R. | 64 | 871 |
| — — Foraminiferen-Fauna des tertiären Grünsandes der Orakei-Bay bei Auckland. R. | 65 | 109 |
| — — zur Foraminiferen-Fauna in Österreich. R. | 68 | 126 |
| Karsten, H.: geologisches Alter der Cordilleren Südamerika's. R. | 62 | 743 |
| Haufmann: über Dopplerit. R. | 66 | 602 |
| Kayser: Braunstein-Vorkommen in der Lahn-Gegend. R. | 65 | 485 |
| Keene: Steinkohlen-Lager von Neusüdwales mit Spirifer, Glossopteris und Lepidodendron. R. | 66 | 110 |
| — — australische Kännelkohle und Clarke: die ölführenden Ablagerungen in Neusüdwales. R. | 67 | 492 |
| Keferstein, W.: zur Anatomie des Nautilus Pompilius. R. | 66 | 120 |
| — — die Korallen der norddeutschen Kreide-Gebilde. R. | 60 | 635 |
| Kelly: zur Lehre von den Leitfossilien. R. | 66 | 638 |
| Kenngott, A.: Zwillinge des Scheelit von Framont. R. | 61 | 184 |
| — — über Zwieselit. R. | 61 | 186 |
| — — Hörnesit, neues Mineral aus dem Banat. R. | 61 | 331 |
| — — über Pennin aus Wallis. R. | 61 | 332 |
| — — über Epidot und Rutil. R. | 61 | 490 |
| — — die rothe Farbe des Stilbit im Fassathale. R. | 61 | 581 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Kenngott: über Pennin von Zermatt. R. | 1862 | 350 |
| — — neuer Fundort schöner Kalkspath-Krystalle. R. | 62 | 350 |
| — — über die Zusammensetzung der Pennin, Chlorit und Klinochlor genannten Minerale. R. | 63 | 92 |
| — — über die Zusammensetzung des Kämmererit. R. | 63 | 93 |
| — — über den Pregrattit. R. | 63 | 197 |
| — — Hessenbergit, ein neues Mineral. R. | 64 | 232 |
| — — über die Zusammensetzung des Apophyllit. R. | 64 | 359 |
| — — Wiserin, ein neues Schweizer Mineral; Zirkon bei Andermatt. B. | 64 | 454 |
| — — über die Zusammensetzung des Lithionit. R. | 64 | 476 |
| — — über Erlan. B. | 66 | 436 |
| — — der Wiserit ist Xenotim. B. | 66 | 439 |
| — — „Minerale der Schweiz". R. | 66 | 592 |
| — — über die mit den Namen Haughit, Hydrotalkit und Völknerit belegten Mineralien. R. | 66 | 720 |
| — — über die Analysen des Metaxit. R. | 66 | 721 |
| — — über Richmondit. R. | 66 | 829 |
| — — über den Staurolith aus der Schweiz. R. | 66 | 835 |
| — — über den Apatit aus der Schweiz. R. | 66 | 836 |
| — — über einige Erscheinungen, beobachtet am Natrolith. A. | 67 | 77 |
| — — über das Vorkommen des Flussspath in der Schweiz. R. | 67 | 107 |
| — — über den Turmalin der Schweiz. R. | 67 | 108 |
| — — über den Rutil der Schweiz. R. | 67 | 201 |
| — — über die alkalische Reaction einiger Minerale. A. | 67 | 302 |
| — — über den Anatas der Schweiz. R. | 67 | 364 |
| — — dasselbe. A. | 67 | 429 769 |
| — — Notiz über die Krystallgestalten des Susannit und Leadhillit. A. | 68 | 319 |
| — — über Gyps und Anhydrit als Einschluss in Kalkstein. A. | 68 | 577 |
| — — Elemente der Petrographie, zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium. R. | 68 | 757 |
| — — Entwendung werthvoller Mineralien aus der Sammlung des Polytechnikums in Zürich. B. | 69 | 67 |
| — — über die Zusammensetzung des Tabergit. B. | 69 | 202 |
| — — Berechnung der Analyse des Leuchtenbergit. B. | 69 | 203 |
| — — über die Zusammensetzung des Hauyn. A. | 69 | 329 |
| — — über den Pseudophit. B. | 69 | 343 |
| — — über den Corundophylit. B. | 69 | 466 |
| — — über die Zusammensetzung des Sylvanit. B. | 69 | 722 |
| — — über Orthoklas an der Fibia am St. Gotthard. R. | 69 | 753 |
| — — Einfach-Arsenik-Kobalt ? von Bieber. R. | 69 | 754 |
| — — Dünnschliff einer Meteorstein-Probe von Knyahinya. R. | 69 | 866 |
| Kerl, Br.: Grundriss der Salinenkunde. R. | 68 | 854 |
| Kerner: Neubildung von Schwefelkupfer in vergilbtem Papier alter Bücher. R. | 66 | 227 |
| Key: die Bovey-Ablagerungen. R. | 63 | 227 |
| Kjerulf: Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse der geologischen Untersuchung Norwegens. A. | 62 | 129 |
| — — „geologisk Kart over Christiania omegn". R. | 67 | 373 |
| — — Olivinfels in Norwegen. R. | 67 | 480 |
| — — Bemerkungen über den Bericht: seine geologische Karte von Christiania. B. | 67 | 589 |
| Kjerulf und T. Dahll: der Erzdistrict Kongsbergs. R. | 62 | 365 |
| — — über das Vorkommen der Eisenerze bei Arendal, Näs und Krageroe. A. | 62 | 557 |
| — — „geologische Karte des s. Norwegen. R. | 67 | 374 |
| Kimball: Sodalith und Eläolith bei Salem in Massachusetts. R. | 62 | 186 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| King, W.: Hystologie der Rhynchopora Geinitziana. R. . . . . | 1866 | 380 |
| — — über Spirifer cuspidatus. R. . . . . | 69 | 633 |
| King und Rowney: das sog. Eozoon-Gestein. R. . . . . | 67 | 122 |
| Kingsmill: Geologie der Ostküste von China. R. . . . . | 65 | 499 |
| Kiprjanoff: Fischreste im Kurskischen Eisensandstein. R. . . . . | 61 | 125 |
| Kirchhoff: chemische Analyse der Sonnen-Atmosphäre. R. . . . | 61 | 600 |
| Kirkby: permische Chitoniden aus Durham. R. . . . . | 60 | 378 |
| — — permische Gebilde ein eigenes System. R. . . . . | 61 | 104 |
| — — permische Gesteine und Organismen im s. Yorkshire. R. . . | 61 | 751 |
| — — Fisch- und Pflanzenreste aus den oberpermischen Kalksteinen von Durham. R. . . . . | 62 | 631 |
| — — neue Chiton-Art im Bergkalk von Yorkshire R. . . . . | 63 | 236 |
| — — Fische aus dem Zechstein. B. . . . . | 64 | 52 |
| — — Fossilien aus dem unteren Zechstein von Sunderland. R. . . | 65 | 378 |
| — — Fische und Pflanzen aus dem Zechstein von Durham. R. . . | 65 | 504 |
| — — Fische aus der Steinkohlenformation von Durham. R. . . . | 65 | 505 |
| — — Reste von Chiton und Chitonellus aus den carbonischen Schichten von Yorkshire. R. . . . . | 67 | 874 |
| — — Insecten-Reste aus der Steinkohlen-Formation von Durham. R. | 67 | 875 |
| Klein, C.: über den Atakamit aus Australien. B. . . . . | 69 | 347 |
| — — über russische Chrysoberyll-Zwillinge. A. . . . . | 69 | 548 |
| — — über Zwillings-Verbindungen und Verzerrungen und ihre Beziehungen zu den Symmetrie-Verhältnissen der Krystall-Systeme. R. | 69 | 750 |
| Kleinschmidt: die Braunkohlen-Formation des Westerwaldes. R. . . | 67 | 218 |
| Klemm, G.: Vorkommen von Zinnober in Spanien. R. . . . . | 67 | 717 |
| Kletzinsky: Boraxkalk oder Tincalcit aus Afrika. R. . . . . | 61 | 190 |
| Klipstein, A. v.: Veräusserung seiner paläontologisch-geologischen Sammlungen. B. . . . . | 62 | 459 |
| Klocke, Fr.: über das Vorkommen von Pseudomorphosen von Buntsandstein nach Kalkspath in den Umgebungen von Heidelberg. A. . | 69 | 714 |
| Kluge: Handbuch der Edelsteinkunde. R. . . . . | 60 | 816 |
| — — über Bewegung in Gewässern bei Erdbeben und eine mögliche Ursache gewisser Erderschütterungen. A. . . . . | 61 | 777 |
| — — über die Periodizität vulcanischer Ausbrüche. A. . . . . | 62 | 582 |
| Kner, R.: über fossile Fische in Österreich. R. . . . . | 63 | 240 |
| — — die Fische der bituminösen Schiefer von Raibl. R. . . . . | 67 | 124 |
| — — die Fische der Asphaltschiefer von Seefeld. R. . . . . | 67 | 125 |
| — — über Xenacanthus Decheni. R. . . . . | 67 | 505 |
| — — über Orthacanthus Decheni oder Xenacanthus Decheni. R. . . | 68 | 122 |
| — — neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische von Comen bei Görz. R. . . . . | 69 | 125 |
| Knop, A.: über Pseudomorphosen einer pinitoidischen Substanz nach Cordierit aus dem Granit von Heidelberg A. . . . . | 61 | 142 |
| — — die Kupfererz-Lagerstätten von Namaqualand und Damaraland, ein Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte der Kupfererze. A. | 61 | 513 |
| — — Nachträge hiezu. B. . . . . | 61 | 679 |
| — — Veränderungen von Kupferkies in Säuren. R. . . . . | 61 | 562 |
| — — Umwandelung von Oligoklas in Epidot. B. . . . . | 63 | 808 |
| — — Pachnolith ein neues Mineral. R. . . . . | 63 | 829 |
| — — Albin, eine Pseudomorphose von Kalkspath nach Apophyllit. R. | 63 | 835 |
| — — über den Nephelin-Dolerit von Meiches im Vogelsgebirge. A. | 65 | 674 |
| — — über Klipsteinit. B. . . . . | 66 | 354 |
| — — „Molecular-Constitution und Wachsthum der Krystalle“. R. . | 67 | 861 |
| — — über den körnigen Kalk von Schelingen im Kaiserstuhl. B. . | 69 | 732 |
| Kobell, Fr. v.: Diansäure. R. . . . . | 60 | 446 |
| — — über Linarit vom Ural. R. . . . . | 62 | 87 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Kobell, Fr. v.: merkwürdige Steinsalz-Krystalle. R. | 1862 | 599 |
| — — über Asterismus. R. | 63 | 714 |
| — — über den Adelforsit und Sphenoklas. R. | 64 | 626 |
| — — Analyse des Triplit von Schlaggenwald. R. | 65 | 327 |
| — — über den Stylotyp. R. | 65 | 741 |
| — — über den Jollyt. R. | 65 | 742 |
| — — über den Enargit von Coquimbo. R. | 65 | 856 |
| — — über den Brochantit aus Chile. R. | 66 | 225 |
| — — über den Klipsteinit. R. | 66 | 452 |
| — — dasselbe. B. | 66 | 569 |
| — — über Pektolith und Osmelith. R. | 66 | 832 |
| — — über einen neuen Thomsonit aus Island. R. | 67 | 100 |
| — — Verhalten des Disthens im Stauroscop und die dabei zu beobachtenden, nicht drehbaren Kreuze. R. | 67 | 606 |
| — — „zur Berechnung der Krystall-Formen". R. | 67 | 860 |
| — — über einen Chatamit von Andreasberg. R. | 69 | 88 |
| — — über Almandin aus Nordcolumbien R. | 69 | 234 |
| — — über Spessartin von Aschaffenburg. R. | 69 | 235 |
| — — über Aspidolith, ein Glied aus der Biotit- und Phlogopit-Gruppe. R. | 69 | 745 |
| — — über einen Paragonit vom Virgenthal in Tyrol. R. | 69 | 748 |
| Koch, C.: die Culm-Formation in Nassau. R. | 61 | 859 |
| Koch & Wiechmann: die oberoligocäne Fauna des Sternberger Gesteins in Mecklenburg. R. | 69 | 635 |
| Kokscharow, v.: russischer Epidot und Orthit. R. | 61 | 850 |
| — — russischer Topas von ungewöhnlicher Grösse. R | 62 | 88 |
| — — Beschreibung des Alexandrit. R. | 63 | 93 |
| — — über Kotschubeit. R. | 63 | 836 |
| — — Mineralogische Notizen. R. | 64 | 71 |
| — — Entfärben der Topase. R. | 64 | 238 |
| — — über Rutil. R. | 65 | 324 |
| — — über Klinochlor und Glimmer vom Vesuv. B. | 66 | 351 |
| — — über das Krystallsystem des Sylvanit. R. | 66 | 224 |
| — — über den Chiolit. R. | 66 | 224 |
| — — über Bleihornerz. R. | 66 | 226 |
| — — „Vorlesungen über Mineralogie". R. | 66 | 228 |
| — — Monographie des russischen Pyroxens. R. | 66 | 451 |
| — — über den Kupfferit. R. | 67 | 191 |
| — — über den Lawrowit. R. | 67 | 193 |
| — — Platin mit polarem Magnetismus. R. | 67 | 194 |
| — — Chalkophyllit im Ural. R. | 67 | 361 |
| — — über den Leuchtenbergit. R. | 67 | 859 |
| — — über den Kämmererit. R. | 68 | 77 |
| — — über den Cölestin in Russland. R. | 68 | 78 |
| — — über den Chalkolith in Russland. R. | 68 | 78 |
| — — über Linarit-Krystalle. R. | 69 | 478 |
| — — Vorkommen des Helvin in Russland. R. | 69 | 744 |
| — — über Flussspath-Vorkommen in Russland. R. | 69 | 745 |
| — — Fahlerz aus Russland. R. | 69 | 748 |
| Köchlin-Schlumberger: Quartär-Gebirge im Elsass und Dauphiné. R. | 60 | 367 |
| Köhler, F.: das Manebacher Gesetz am Feldspath. B. | 63 | 555 |
| Köhler, G. R.: empfiehlt Vorkommnisse von Turmalin, Binnit, Dufrenoysit, Jordanit, Annivit, Lazulith in seinem Lager schweizerischer Mineralien. B | 69 | 204 |
| — — Bergkrystall mit Antimonglanz-Einschluss von Ruäras im Tavetscher Thale. B. | 69 | 852 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Koenen, A. v.: die Fauna der unteroligocänen Tertiärschichten von Helmstädt bei Braunschweig. R. | 1866 | 631 |
| — — Aufschlüsse im Diluvium bei Berlin. R. | 66 | 754 |
| — — das marine Mitteloligocän Norddeutschlands und seine Mollusken-Fauna. R. | 68 | 125 |
| — — über eine Parallelisirung des norddeutschen, englischen und französischen Oligocäns. R. | 68 | 125 |
| — — das marine Mittel-Oligocän Norddeutschlands und seine Mollusken-Fauna. R. | 69 | 636 |
| — — die unter-oligocäne Fauna vom Aralsee. R. | 69 | 637 |
| König: über einige Diorite. R. | 69 | 92 |
| Koninck, de: Fossilien aus Indien. R. | 63 | 626 |
| Kornhuber: neogene Petrefacten vom s. Abhange des Bakonyer Waldes. R. | 60 | 92 |
| — — Pisolith im Neutraer Comitate. R. | 60 | 230 |
| — — Nickel- und Kobalt-Erze von Dobschau. R. | 60 | 351 |
| — — Rhodonit aus dem Rosenauer Bergrevier. R. | 60 | 442 |
| — — geognostische Beschaffenheit des Bakonyer Gebirges. R. | 60 | 838 |
| — — geognostische Verhältnisse des Trentschiner Comitates. R. | 60 | 854 |
| Korovaeff: über den Kischtim-Parisit. R. | 63 | 100 |
| Kosmann: über Laven in dem vulcanischen Gebiet der Auvergne. R. | 65 | 485 |
| — — Zusammensetzung einiger Laven des Domits der Auvergne und Trachyts von Voissières. R. | 65 | 622 |
| — — Schillern und der Dichroismus des Hypersthens. R. | 69 | 368 |
| — — geognostische Beschreibung des Spiemont bei St. Wendel. R. | 69 | 374 |
| — — über das Schillern und den Dichroismus des Hypersthens. A. | 69 | 532 |
| Krantz, A.: Catalog einer Sammlung von 675 Modellen in Ahornholz. R. | 62 | 885 |
| — — Verzeichniss verkäuflicher Mineralien, Gebirgsarten u. s. w.: VIII. Aufl. R. | 66 | 365 |
| — — verschiedene neue Mineral-Vorkommnisse. R. | 66 | 458 |
| Krauss, Gr.: mikroskopische Untersuchung über den Bau der Nadelhölzer. R. | 65 | 757 |
| — — zur Kenntniss der Araucarien des Rothliegenden und der Steinkohlen-Formation. R. | 66 | 636 |
| — — verkieselte Stämme des fränkischen Keupers. R. | 66 | 637 |
| — — der Schädel des Halitherium Schinzi Kaup und H. G. Bronn: Bemerkungen über das zu dem älteren Halitherium-Schädel gehörige Skelet. A. | 62 | 416 |
| Kreischer: über die Mikrostructur des Pegmatoliths von Arendal. B. | 69 | 208 |
| Krenner: pisolithische Structur des diluvialen Kalktuffes von Ofen. R. | 64 | 491 |
| — — Krystallographische Studien über den Antimonit. R. | 66 | 94 |
| Krug von Nidda: octaedrische Steinsalz-Krystalle. R. | 64 | 80 |
| Kuhlberg, A.: die Insel Pargas (Ahlön), chemisch-geognostisch untersucht. R. | 67 | 731 |
| Kunth: die Kreidemulde bei Lähn, Schlesien R. | 64 | 733 |
| — — die losen Versteinerungen im Diluvium bei Tempelhof. R. | 66 | 120 |
| Kuszen: Gegenden der Hochmoore in Deutschland. R. | 66 | 107 |


## L.


| | | |
|---|---|---|
| Laibach: die Seen der Vorzeit in Oberkrain, Felsenschliffe der Save. R. | 64 | 501 |
| Landerer: die Bergwerke der Alten in Griechenland. B. | 64 | 45 |
| Lang, v.: Krystallform des Lanthanit. R. | 63 | 592 |
| Lang, J.: Pyrosmalith in Wermeland. R. | 61 | 848 |
| Lang und Rütimeyer: die Schildkröten von Solothurn. R. | 67 | 766 |
| Lankester: Hyäne aus dem rothen Crag von Suffolk. R. | 64 | 752 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Lankester, Ray: neue Säugethiere aus dem rothen Crag. R. | 65 | 761 |
| — — über den Crag von Suffolk und Antwerpen. R. | 65 | 762 |
| — — Säugethier-Reste des rothen Crag. R. | 66 | 127 |
| — — über Didymaspis. R. | 67 | 874 |
| Lapparent: „note sur la géologie du pay de Bray. R. | 68 | 241 |
| Lartet: Alter des Menschen-Geschlechtes. R. | 60 | 638 |
| — — Zahnbildung und Verbreitung der Proboscidia in Europa. R. | 60 | 866 |
| — — Alter des Menschengeschlechtes. R. | 61 | 106 |
| — — Bildung des Beckens vom rothen Meer. R. | 66 | 476 |
| — — Veränderlichkeit des Salzgehaltes des todten Meeres. R. | 67 | 233 |
| — — zwei neue fossile Sirenen aus dem Tertiärbecken der Garonne. R. | 67 | 249 |
| — — über die bituminösen Schichten von Judäa und Coelesyrien und über das Auftreten des Asphaltes inmitten der Gewässer des todten Meeres. R. | 67 | 626 |
| Lartet und Christy: „Reliquiae Aquitanicae". R. | 68 | 765 |
| — — dasselbe. R. | 69 | 381 |
| Lasard: Eisenspath von Oldendorf. R. | 65 | 479 |
| — — ein Vorkommen von braunem Jura am Dörrel in Hannover. R. | 68 | 848 |
| Lasaulx, A. v.: Vorkommen des Tridymit bei Alleret, Dep. Haute-Loire. B. | 69 | 66 |
| — — über einen Kohlen-Einschluss in der Lava des Roderberges. R. | 69 | 491 |
| — — Petrographische Studien an den vulcanischen Gesteinen der Auvergne. A. | 69 | 641 |
| — — Vorkommen von weissem oder Kaliglimmer in jüngeren Eruptiv-Gesteinen. B. | 69 | 842 |
| Laspeyres, H.: Beitrag zur Kenntniss der Porphyre und petrographische Beschreibung der quarzführenden Porphyre in der Gegend von Halle. R. | 65 | 331 |
| — — hohle Kalksteingeschiebe im Rothliegenden bei Kreuznach. R. | 67 | 113 |
| — — die „Übersichtskarte der Kohle führenden Saar-Rheingebietes. B. | 68 | 326 |
| — — Analyse des Prehnit von Norheim. R. | 68 | 355 |
| — — Kreuznach und Dürkheim a. d. Hardt. R. | 68 | 625 |
| — — über den Ottrelith. B. | 69 | 339 |
| — — über das Zusammen-Vorkommen von Magneteisen und Titaneisen in Eruptiv-Gesteinen und über die sogenannten petrographischen Gesetze. A. | 69 | 513 |
| Laszynski: Analyse der Lava von Pico de Teyde. B. | 64 | 456 |
| Laube, G.: Erzlagerstätten von Graupen in Böhmen. R. | 64 | 361 |
| — — Pseudomorphosen von Chlorit nach Strahlstein. R. | 64 | 477 |
| — — über den Paterait. R. | 64 | 712 |
| — — die Münster'schen Arten von St. Cassian in der Münchener Sammlung. R. | 65 | 506 |
| — — die Fauna der Schichten von St. Cassian. R. | 65 | 893 |
| — — brauner Jura von Balin. R. | 66 | 472 |
| — — die Fauna der Schichten von Cassian II. Brachiopoden und Bivalven. R. | 66 | 508 |
| — — die Gasteropoden des braunen Jura von Balin R. | 67 | 242 |
| — — die Fauna der Schichten von St. Cassian. R. | 67 | 242 |
| — — der Torf. R. | 67 | 744 |
| — — die Gasteropoden des braunen Jura von Balin R. | 68 | 120 |
| — — ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebietes. R. | 68 | 120 |
| — — die Fauna der Schichten von St. Cassian. III. Gastropoden. R. | 68 | 637 |
| — — über Oolaster, ein neues Echinoiden-Geschlecht aus den eocänen Ablagerungen von Mattsee in Oberösterreich. A. | 69 | 451 |
| Laube, G. und A. Reuss: Versteinerungen des braunen Jura von Balin. R. | 66 | 862 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Laugel: pliocäne Fauna von Prest bei Chartres. R. | 1863 | 243 |
| Lechmere Guppy: über die tertiären Mollusken von Jamaica. R. | 67 | 253 |
| Leckenby: jurassische Sandsteine und Schiefer von Scarborough. R. | 64 | 753 |
| Lecoq, H.: „les eaux minérales considerées dans leur rapports avec la chimie et la géologie. R. | 65 | 752 |
| Lefort: Bildung von schwefelsaurem Eisenoxydoxydul durch Zersetzung von Markasit. R. | 63 | 588 |
| Leidy: ursus Americanus mit ausgestorbenen Arten beisammen. R. | 60 | 244 |
| — — extinct Vertebrata from the Judith-river and lignite-formation of Nebraska. R. | 60 | 461 |
| — — Knorpelfisch aus der Steinkohlen-Formation in Kansas. R. | 60 | 489 |
| — — über Hadrosaurus Foulkei. R. | 61 | 753 |
| Leisner: Wollastonit in Schlesien. B. | 63 | 557 |
| — — neue Mineral-Vorkommnisse aus Schlesien. B. | 65 | 457 |
| Leith Adams: Geologie der Malteser Inseln. R. | 65 | 636 |
| Lemberg, J.: die Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch-geologisch untersucht. R. | 67 | 729 |
| — — dasselbe. R. | 68 | 756 |
| Leonhard, G.: Grundzüge der Mineralogie. 2. Aufl. R. | 60 | 578 |
| — — Minette oder Glimmerporphyrit an der Bergstrasse. R. | 61 | 495 |
| — — geognostische Skizze des Grossherzogthums Baden. 2. Aufl. R. | 61 | 862 |
| — — „Grundzüge der Geognosie und Geologie". 2. Aufl. R. | 63 | 733 |
| — — über das Vorkommen des Scheelit bei Schriesheim. A. | 64 | 819 |
| Lesley: die Steinkohlen-Formation am Cap Breton. R. | 64 | 98 |
| Lesquereux: geographische Verbreitung der Steinkohlen-Flora. R. | 62 | 117 |
| — — Pflauzen-Sippen und Arten aus der nordamerikanischen Steinkohlen-Formation. R. | 62 | 760 |
| — — Pflanzen der nordamerikanischen Steinkohlen-Formation. R. 63 | 248 | 623 |
| — — Ursprung der Prairien. R. | 66 | 107 |
| — — über cretacische fossile Pflanzen von Nebraska. R. | 68 | 877 |
| Leymerie: Entstehung der Kalke und Dolomite. R. | 62 | 884 |
| — — das systeme garumnien. R. | 64 | 108 |
| — — geognostische Skizze der kleinen Pyrenäen. R. | 64 | 727 |
| Levallois: Grenzschichten zwischen Trias und Lias in der Lorraine und in Schwaben. R. | 65 | 745 |
| — — „les relations du parallelisme que présentent dans la Lorraine et dans la Souabe les couches du terrain dit Marnes irisées ou Keuper. R. | 68 | 622 |
| Levi: Nickelgrube von La Balma im Val Sesia. R. | 67 | 718 |
| Liebe, K.: ein neuer Wolframit. A. | 63 | 641 |
| — — Alter der Wurzbacher Schiefer. B. | 64 | 692 |
| — — neue Ausgrabungen in Köstritz. R. | 65 | 638 |
| — — über das Jodblei aus Atakama. A. | 67 | 159 |
| — — der Phyllodocites-Schiefer im Reussischen Oberland ist jungsilurisch. B. | 68 | 729 |
| Lieber: eigenthümliche eisenhaltige Gesteine Süd-Carolina's. R. | 60 | 853 |
| Lindenborn und Schuchart: die Mineralquelle im Schützenhof zu Wiesbaden. R. | 60 | 569 |
| Lindsay: Geologie der Goldfelder Neuseelands. R. | 66 | 603 |
| Lindström: über die Zoantharia rugosa. R. | 66 | 870 |
| — — über die Gattung Trimerella. R. | 69 | 634 |
| Lioy: erste Versammlung italienischer Naturforscher zu Biella 3. Sept. 1864. R. | 65 | 247 |
| — — Pfahlbauten am See von Fimon. R. | 65 | 247 |
| — — Höhlen im Vicentinischen. R. | 65 | 384 |
| — — L'età della pietra del bronzo et del ferro in Italia. R. | 66 | 105 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Lioy: L'età antistoriche nel Vicentino. R. | 1866 | 105 |
| — — il museo di storia naturale a Vicenza. R. | 66 | 106 |
| — — über eine Seestation am Lago di Fimon. R. | 66 | 256 |
| — — fossile Wirbelthiere des Vicentinischen. R. | 68 | 255 |
| — — Seestation von Fiume. R. | 68 | 255 |
| Lipold: Steinkohlen-Gebirge im NW. des Prager Kreises. R. | 60 | 239 |
| — — geologische Karte von Neustadt in Mähren. R. | 60 | 359 |
| — — Rothliegendes und Kreide-Formation im Prager Kreise. R. | 60 | 593 |
| — — geologische Verhältnisse von Krain. R. | 60 | 608 |
| — — Gailthaler Schichten und alpine Trias im SO. Kärnthens. R. | 60 | 610 |
| — — krystallinische Gebirge im S. des Prager Kreises. R. | 60 | 736 |
| — — über Barrande's Colonien in Böhmens Silurformation. R. | 62 | 100 |
| — — Galmei- und Braunkohlen Bergbaue bei Ivanec im Warasdiner Comitate Croatiens. R. | 62 | 1003 |
| — — das Steinkohlen-Gebiet im n.w. Theile des Prager Kreises. R. | 63 | 370 |
| — — krystallinische Gesteine bei Policzka in Böhmen. R. | 63 | 481 |
| — — geologische Karte von Böhmen. R. | 63 | 610 |
| — — Graphit-Lager bei Swojanow in Böhmen. R. | 63 | 726 |
| — — Blei- und Zinkerz Lager Kärnthens. R. | 63 | 729 |
| — — Eisenstein-Vorkommen bei Prassberg in Steyermark. R. | 64 | 84 |
| — — Vorkommen von Smaragden im Habachthal. R. | 64 | 233 |
| — — die Eisenstein-Lager der silurischen Grauwacke in Böhmen. R. | 64 | 737 |
| — — das Kohlengebiet in den n.ö. Alpen. R. | 65 | 489 |
| — — die Ersteigung der Löffelspitze im Zillerthal. R. | 65 | 751 |
| — — geologische Aufnahme der Gegend von Kirchberg, Unteröster-reich. R. | 66 | 751 |
| — — Goldbergbau von Königsberg in Ungarn. R. | 67 | 719 |
| — — der Bergbau von Schemnitz in Ungarn. R. | 68 | 363 |
| List, K.: Braunstein von Olpe. R. | 61 | 186 |
| Löbe: die Porphyre der Umgegend von Altenburg. R. | 67 | 868 |
| Logan: im Potsdam-Sandstein gefundene Thierfährten. R. | 62 | 630 |
| — — die Gesteine der Quebeck-Gruppe bei Point-Levis R. | 64 | 501 |
| — — Kupfererze führende Gesteine am Oberen See. R. | 64 | 741 |
| — — die Laurentian-Gruppe. R. | 65 | 496 |
| Lom, B. de: neue Mineral-Vorkommnisse in den vulcanischen Gebieten Frankreichs. R. | 61 | 696 |
| Lommel, J.: „erläuternder Catalog der Mineralien-Sammlung von 300 Exemplaren". R. | 65 | 482 |
| — — „geologisch-paläontologische Sammlung von 1000 Stücken, herausgegeben von dem Heidelberger Mineralien-Comptoir". 5. Aufl. R. | 67 | 735 |
| — — „geologisch-paläontologische Sammlungen von 300 Exemplaren, die besonders geeignet für Schulen, sowie zur Selbstbelehrung". R. | 69 | 757 |
| Loretz, H.: über die in den fossilen Brennstoffen vorkommenden Mineralien. A. | 63 | 654 |
| Lory: über die Anthracit-Sandsteine des Brianconnais. R. | 60 | 736 |
| — — über eine Nummuliten Lagerstätte bei Maurienne in den Alpen. R. | 60 | 749 |
| Lossen, C.: geognostische Beschreibung der linksrheinischen Fortsetzung des Taunus in der ö. Hälfte des Kreises Kreuznach. R. | 68 | 90 |
| — — sphärolithische, Pinit führende Quarzporphyre aus dem Harz. R. | 68 | 109 |
| Lottner: Vorkommen von Haarkies. R. | 64 | 80 |
| — — über krystallisirten Sandstein. R. | 64 | 91 |
| Luca, de: über Mossottit. R. | 61 | 331 |
| — — über Brod und Getreide, welche in Pompeji gefunden wurden R. | 65 | 92 |
| Ludwig: Najaden der Rhein-Westphälischen Steinkohlen-Formation. R. | 60 | 124 |
| — — productive Steinkohlen-Formation in Perm. R. | 61 | 105 |
| — — Bleiglanz in Posidonomyenschiefer. R. | 61 | 701 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Ludwig, R.: geologische Beobachtungen in Russland. R. | 1862 | 218 |
| — — über paläolithische Korallen. B. | 63 | 84 |
| — — über die bei Lithwinsk in den Kalksteinen der Kohlenformation vorkommenden Korallen und Bryozoen. R. | 63 | 746 |
| — — Meeres-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr. R. | 63 | 870 |
| — — das Mainzer Becken und Perna-Arten. B. | 64 | 460 |
| — — Geologisches aus dem Mainzer Becken; Unio pachyodon; Modell vom Dorheimer Braunkohlenflötz. B. | 64 | 212 |
| — — neue Versteinerungen des Mainzer Beckens. B. | 65 | 51 |
| — — Meeres-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr. B. | 65 | 728 |
| — — die Mainzer Tertiär-Formation. A. | 66 | 59 |
| — — fossile Conchylien aus den Tertiär-Ablagerungen der beiden Hessen und der bayerischen Rhön. R. | 66 | 118 |
| — — Meeres-Strömungen in ihrer geologischen Bedeutung. R. | 66 | 241 |
| — — Pinna rugosa und Acerotherium incisivum in den tertiären Kalklagern von Weissenau. R. | 66 | 499 |
| — — Korallen aus paläolithischen Formationen. R. | 66 | 510 |
| — — über die Gliederung der devonischen Formation im Dillenburgischen und Biedenkopfischen Theile des Westerwaldes. A. | 69 | 658 |
| Lütke: neue vulcanische Insel im caspischen Meere. R. | 62 | 607 |
| Luna, Ramon de: Phosphorit-Vorkommen in Estremadura. R. | 66 | 363 |
| Lundgren: Paläontologische Betrachtungen über den Faxekalk auf Limnhamn. R. | 68 | 762 |
| Lyell: Erdbeben in Neuseeland 1855. R. | 60 | 723 |
| Lyon: devonische Krinoideen von Indiana. R. | 60 | 498 |


## M.


| | | |
|---|---|---|
| Maak: über noch unbekannte Lophiodon-Fossilien von Heidenheim. R. | 66 | 245 |
| Macalister: über Ulodendron. R. | 64 | 750 |
| Mack: die Höhle Tmava-Skala bei Nickolsdorf. R. | 60 | 451 |
| Madelung: Augitporphyre in Siebenbürgen. R. | 64 | 87 |
| — — Pseudomorphosen nach Eisenkies. R. | 64 | 479 |
| — — Metamorphosen von Basalt und Chrysolith von Holzendorf. R. | 64 | 627 |
| — — Melaphyre des Riesengebirgos und der Karpathen. R. | 65 | 344 |
| — — über das Alter der Teschenite. R. | 65 | 345 |
| Maggi: das erratische Terrain von Valcuvia. R. | 68 | 869 |
| Malaguti: neue Guano-Arten aus Patagonien. R. | 62 | 184 |
| Mallet: Brewsterit von Strontian. R. | 61 | 184 |
| Malowsky: geologische Skizze der Beskiden. R. | 67 | 628 |
| Maly: über den Forcherit. R. | 63 | 200 |
| Manganotti: sul terreno alluviale antico della provincia di Verona. R. | 66 | 106 |
| Marck, v. d.: fossile Fische, Krebse und Pflanzen aus dem Plattenkalk der jüngsten Kreide in Westphalen. R. | 63 | 628 |
| — — thoniger Sphärosiderit von Ochtrup. R. | 65 | 480 |
| — — Krebse und Fische in der Kreide von Sendenhorst. R. | 65 | 764 |
| Marcou, J.: die ältesten Organismen führenden Gesteine Nordamerika's. R. | 62 | 361 |
| — — Dyas-Formation in Nebraska. B. | 64 | 51 |
| — — wissenschaftliche Expedition nach Südamerika. B. | 65 | 458 |
| — — „une reconaissance géologique au Nebraska". R. | 65 | 498 |
| — — der Niagara nach 15 Jahren. R. | 66 | 470 |
| — — Waffen, Werkzeuge und Spuren des amerikanischen Menschen. R. | 66 | 872 |
| — — die Kreideformation in den Umgebungen von Sioux-City, der Mission von Omahas und Tekama. R. | 67 | 634 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Marcou: Einstellung der geologischen Landesuntersuchung in Californien; Beginn solcher in der Colonie Queensland. B. . | 1868 | 590 |
| Marigny, de: künstliche Darstellung des Bleiglanzes und Buntkupfererzes. R. . . . . | 64 | 730 |
| Marschall: Auszug aus der Denkschrift von Milne Edwards über die geologische Vertheilung der fossilen Vögel. A. . . . . | 64 | 412 |
| Marsh: Eosaurus Acadianus. R. . . . . | 63 | 247 |
| — — Vorkommen des Goldes in Neuschottland. R. . . . . | 63 | 472 |
| — — neuer Annelide, Helminthodes antiquus von Solenhofen. B. . | 65 | 57 |
| — — alter Grabhügel bei Newark, Ohio. R. . . . . | 66 | 871 |
| — — über Palaeotrochis von Nordcarolina. R. . . . . | 68 | 875 |
| — — Ledererit identisch mit Gmelinit. R. . . . . | 68 | 350 |
| — — über Equus parvulus, ein neues fossiles Pferd aus der jüngeren Tertiärformation von Nebraska. R. . . . . | 69 | 767 |
| Marsili: die Ursache des Erdmagnetismus. R. . . . . | 68 | 869 |
| Martin, J.: neue Arten aus dem Bathonien des Dep. Cote d'Or. R. . | 64 | 115 |
| Martinati: della Palaeontologia in generale e delle sue primizie nel Veneto. R. . . . . | 66 | 634 |
| Martius, C.: Analysen amerikanischer Meteoreisen. R. . . . . | 61 | 699 |
| Maskelyne: Columbit-Krystalle von Monte Video. R. . . . . | 63 | 594 |
| — — über Waringtonit R. . . . . | 66 | 364 |
| — — Krystallform des Kupferoxydes R. . . . . | 67 | 716 |
| Matheron: Note sur les dépots tertiaires du Médoc. R. . . . . | 68 | 228 |
| Matter: Analyse der Boghead-Kohle. R. . . . . | 60 | 81 |
| Matthew: azoische und paläozoische Gesteine in Neubraunschweig R. | 66 | 370 |
| Mathewson: Tellurerze in Californien. R. . . . . | 66 | 93 |
| Maw: Anordnung des Eisens in bunten Gesteins-Schichten. R. . . | 69 | 586 |
| — — Durchschnitt der cambrischen Schichten an der Llanberis- und Carnarvon-Eisenbahn. R. . . . . | 69 | 594 |
| Mayer, K.: Übersicht der von ihm neu aufgestellten Arten von Tertiär-Conchylien. B. . . . . | 60 | 207 |
| — — Faunula des marinen Sandsteins von Kleinkuhren. R. . . . | 61 | 253 |
| — — zwei Arten blauer Subapenninen-Mergel. R. . . . . | 61 | 712 |
| Mayer, K.: „Liste par ordre systématique des Belemnites des terrains jurassiques". R. . . . . | 63 | 763 |
| Mayer, K.: Paläontologie der Insel Madeira und Porto Santo. R. . . | 64 | 869 |
| Mayr: über die Radoboj Formiciden. R. . . . . | 67 | 763 |
| — — die Ameisen des Baltischen Bernsteins. R. . . . . | 69 | 620 |
| Meek: die Familie der Acteoniden R . . . . . | 63 | 503 |
| — — über die Familie der Pteriidae R . . . . . | 64 | 867 |
| — — Beiträge zur Paläontologie von Illinois. R. . . . . | 67 | 760 |
| — — die Verwandtschaften der Bellerophontidae. R . . . . . | 67 | 761 |
| — — neue Typen organischer Reste aus den Kohlengebilden von Illinois. R. . . . . | 67 | 763 |
| — — Bemerkungen zu den Ansichten von Geinitz über die oberen paläozoischen Gesteine und Fossilien des s. Nebraska. R. . | 68 | 218 |
| — — über Ethmophyllum und Archaeocyathus. R. . . . . | 68 | 875 |
| — — über einen Scorpion aus den Steinkohlenlagern von Illinois R. | 68 | 877 |
| — — „Sketch on the geology and the palaeontology of the valley of Mackenzie river". R. . . . . | 69 | 589 |
| Meek und Hayden: die unteren Kreideschichten von Kansas. R. . . | 60 | 103 |
| — — Anisomyon aus Nebraska. R. . . . . | 60 | 499 |
| — — sogenannte Triasgesteine von Kansas und Nebraska. R. . . . | 60 | 850 |
| Meneghini: „saggio sulla costituzione geologica della provincia di Grossetto. R . . . . . | 66 | 632 |
| — — „studii palaeontologici sulle Ostriche cretacee di Sicilia". R. . | 65 | 254 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Menke, K. Th.: Verbreitung des Odontosaurus; Prioritäts-Rechte und richtigere Bildung von Ordnungs-Namen der Mollusken. B. | 1860 | 66 |
| Merian, P.: über die Stellung des Terrain à chailles in den Schichten der Jura-Formation. A. | 64 | 520 |
| — — über die Grenze zwischen Jura- und Kreide-Formation. R. | 69 | 593 |
| Merz: Analysen schweizerischer Mineralien. R. | 62 | 353 |
| Meyer, C.: Brachiopoden im Grünsand von Surrey. R. | 65 | 253 |
| — — über cretacische Brachiopoden und über die Entwicklung der Schleife und das Septum bei Terebratella. R. | 68 | 871 |
| Meyer, H. v.: Ramphorhynchus Gemmingi und Chimaera (Ischyodon) Quenstedti von Solenhofen; Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Panzersauriern; tertiäre Eingeweide-Würmer. B. | 60 | 210 |
| — — Micropsalis papyraceus aus rheinischer Braunkohle. R. | 60 | 377 |
| — — Belodon im Stubensandstein von Stuttgart; Acteosaurus Tommasiuii aus Neocomien des Karstes; Rhinoceros Mercki bei Triest und im Mainzer Becken; Knochen-Höhlen an der Lahn von zweierlei Alter; Palaeomeryx pygmaeus und Sus Belsiacus von Günzburg; Trionyx-Eier im Mainzer Becken; Emys im diluvialen Kalke von Cannstadt; Unterabtheilung Salamandra und Polysemia, Heliarchon; Lamprosaurus Goepperti aus dem Muschelkalk Schlesiens; Phanerosaurus Naumanni im Rothliegenden von Zwickau. B. | 60 | 556 |
| — — Reptilien der lithographischen Schiefer in Deutschland und Frankreich. R. | 60 | 763 |
| — — Anguisaurus und Pleurosaurus als Glieder der Acrosaurier-Familie; Teratosaurus Suevicus im Stubensandstein Stuttgarts; Trematosaurus Bronni; Capitosaurus nasutus; Archegosaurus; fossile Eier von Offenbach; Glyphaea ventrosa. B. | 61 | 68 |
| — — Acteosaurus, ein zu Comen gefundener Saurier. R. | 61 | 251 |
| — — diluviale Rhinoceros-Arten des Rheinthales; Ichthyosaurus Strombecki in Eisenoolith bei Goslar; J. leptospondylus im lithographischen Schiefer Solenhofens; Pterodactylus spectabilis; Placodus Andriani im Muschelkalk Braunschweigs; Palaeotherium magnum aus dem Breisgau; Palaeomedusa testa und Acichelys Redenbacheri der lithographischen Schiefer. B. | 61 | 464 |
| — — Vogelfedern und Palpipes priscus von Solenhofen. B. | 61 | 561 |
| — — Archaeopterix lithographica. B. | 61 | 678 |
| — — Belodon Kapffi im Stubensandstein von Stuttgart. B. | 62 | 332 |
| — — über Stylolithen de Muschelkalkes von Friedrichshall. B. | 62 | 590 |
| — — über Gobius Nassoviensis, Perca veterana, Rana Sieblosensis, Oxygompius frequens; Fische aus dem Tertiärmergel von Häring; Prosopon Augusti. B. | 63 | 187 |
| — — Pterodactylus spectabilis. R. | 63 | 247 |
| — — Chelitherium obscurum, Myliobates pressidens; Prosoponiden aus dem weissen Jura von Aufhausen; Rhinoceros und Schildkrötenreste aus der Molasse von Heggbach; Coluber in der Braunkohle von Rott; Fisch-Reste von Hammerstein in Baden. B. | 63 | 444 |
| — — Monographie von Placodus aus dem Muschelkalk von Baireuth. B. | 63 | 699 |
| — — die tertiären Wiederkäuer von Steinheim bei Ulm. A. | 64 | 187 |
| — — Parachelys Eichstättensis; Archaeotylus ignotus; Prosopon Neuhausense aus dem weissen Jura von Amstetten; Prosopon Mitella aus dem weissen Jura; über Belodon Plieningeri. B. | 64 | 206 |
| — — Glyptodon clavipes; Psephoderma alpinum; Chelydra Decheni in Braunkohle des Siebengebirges; in Sphärosiderit umgewandeltes Gehirn eines Säugethieres; Vogel Reste aus dem Molasse-Mergel von Öningen; zu der Schrift von Milne Edwards über fossile | | |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Vögel; Säugethier-Zahn aus tertiärem Letten von Tauenzinow in Schlesien. B | 1864 | 698 |
| Meyer, H. v.: fossile Wirbelthiere aus dem alpinen Keuper und aus dem Molassesand von Biberach; Propator astacorum ist ein Bruchstück von Archegosaurus; über Protorosaurus, Carpus und Tarsus. B. | 65 | 57 |
| — — tertiärer Thon bei Nierstein mit Resten von Meletta und Amphisyle Heinrichi; ähnliche Schichten an anderen Orten; die in den Tertiär-Gebilden von Eggingen bei Ulm vorkommenden Wirbelthiere; über Prosoponiden aus dem weissen Jura Schwabens; über Belodon. B. | 65 | 215 |
| — — Gobius Nassoviensis bei Nierstein; über die von Schlagintweit aus Indien und Hochasien mitgebrachten fossilen Knochen und Zähne und über den Charakter von Asiens fossiler Wirbelthier-Fauna. B. | 65 | 603 |
| — — Säugethier-Reste von Steinheim bei Ulm; im lithographischen Schiefer sind bis jetzt keine Säugethiere nachgewiesen; Pterodactylus im Kimmeridge von Hannover. B. | 65 | 843 |
| — — fossiles Gehirn von einem Säugethiere aus der niederrheinischen Braunkohle. R. | 66 | 117 |
| — — über Belodon; über Rhinoceros- und Mastodon-Zähne; Cervus diluvianus im Sande von Mosbach; Riesensalamander von Reisenberg; Palaeomeryx von Weinheim; Pachydermen von Eggingen; Cratylus truncatus. B. | 66 | 576 |
| — — Mastodon angustidens von Heggbach; neue Vorkommnisse aus der Molasse von Biberach, Säugethier-Reste aus der Bohnerz-Formation der Grafenmühle bei Pappenheim; Anthracotherium Alsaticum aus der Braunkohle von Schlüchtern; Mustlea Gamlitzensis aus der Braunkohle von Gamlitz. B. | 67 | 460 |
| — — über Mastodon. A. | 67 | 785 |
| — — vollständiger Schädel von Placodus gigas aus dem Muschelkalk von Bayreuth. A. | 68 | 48 |
| Meyer, P.: Analyse des Hydromagnesits von Sasbach am Kaiserstuhl. R. | 61 | 695 |
| Meyn, L.: Saurier-Sippe von Helgoland. R. | 64 | 725 |
| Michaelson: Schefferit von Langbanshytta. R. | 64 | 235 |
| — — Analyse des Bragit von Hella bei Arendal. R. | 64 | 236 |
| — — Analyse des Radiolith von Brevig. R. | 64 | 364 |
| — — über die Zusammensetzung des Amphibols. R. | 64 | 712 |
| Michelotti: Abnahme tropischer Korallen-Formen in der Tertiärzeit. R | 60 | 599 |
| Milne Edwards: über Generatio spontanea. R. | 60 | 243 |
| — — fossile Kruster im Sande von Beauchamp. R. | 60 | 640 |
| Mitscherlich, A.: Zerlegung des Löwigit R. | 61 | 849 |
| — — Baryterde in Feldspath. R. | 61 | 853 |
| — — die vulcanischen Gesteine des Roderberges. R. | 64 | 82 |
| Mixter: Willemit aus New-Jersey. R. | 69 | 233 |
| — — über Tephroit. R. | 69 | 233 |
| Möller: Lettenkohlen-Gruppe Thüringens. R. | 63 | 494 |
| — — die Trilobiten der Steinkohlenformation. R. | 68 | 510 |
| Mörch: der Jélin Adansons und das Pleurodictyum Goldfuss. R. | 62 | 384 |
| Morsta: geologische Schilderung der Gegend zwischen dem Meissner und dem Hirschberge in Hessen. R. | 69 | 241 |
| Mohr: die vulcanischen Erscheinungen in der Eifel und die Metamorphie der Gesteine durch erhöhte Temperatur von E. Mitscherlich. A. | 66 | 418 |
| — — über die Natur der Silicate. A. | 66 | 181 |
| Moissenet: Vorkommen des Zinnerzes in Cornwall. R. | 60 | 360 |
| Mojsisovics: Gliederung der oberen Triasbildungen der ö. Alpen. B | 69 | 562 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Mojsisovics, E. v. und P. Grohmann: Mittheilungen des österreichischen Alpenvereins. R. | 1864 | 108 |
| Molin: Pachyodon aus eocänem Sande von Libano. R. | 62 | 378 |
| Moore: über Brushit. R. | 66 | 88 |
| — — über den mittlen und oberen Lias des s w. England. R. | 68 | 621 |
| Morlot: geologische Studien in Dänemark und in der Schweiz. R. | 60 | 461 |
| — — das Quartär-Gebirge am Genfer See. R. | 60 | 830 |
| Morris: geographische Verbreitung der Fische des Kohlenkalkes. R. | 63 | 233 |
| Mortillet, de: alte Gletscher am s. Abhange der Alpen. R. | 61 | 723 |
| — — „Note sur le Crétacé et le Nummulitique des environs de Pistoia". R. | 63 | 759 |
| — — die Gesteine am italienischen Abhang der Alpen. R. | 64 | 102 |
| — — Land- und Süsswasser-Conchylien bei Abbeville. R. | 64 | 118 |
| — — sur l'affouillement des anciens glaciers. R. | 64 | 742 |
| — — Profil durch den Hügel von Siena. R. | 64 | 864 |
| — — „Materiaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme". R. | 65 | 252 |
| — — geologie des environs de Rome. R. | 65 | 255 |
| — — Inoceramus et Ammonites dans les argiles scalieuses. R. | 65 | 380 |
| Müller, A.: anormale Lagerungs-Verhältnisse im Baseler Jura. R. | 60 | 836 |
| — — Vorkommen von Saurier-Resten im Buntsandstein bei Basel. A. | 64 | 333 |
| — — Analysen schwedischer Thone. R. | 64 | 478 |
| — — „das Alpenpanorama von Höhenschwand. R. | 66 | 233 |
| — — die krystallinischen Gesteine in den Umgebungen des Maderaner Thales. R. | 66 | 736 |
| — — weitere Beobachtungen über die krystallinischen Gesteine des Maderaner-, Etzli- und Fellithales. R. | 67 | 368 |
| — — über das Grundwasser und die Boden-Verhältnisse der Stadt Basel. R. | 68 | 94 |
| — — die Umgebungen des Crispalt. R. | 69 | 581 |
| Müller, C.: Arsen-Gehalt in Schwefel-Antimon-Erzen. R. | 61 | 83 |
| Müller, H.: Untersuchung der sächsischen Erzreviere. B | 63 | 565 |
| — — geognostische Verhältnisse des erzgebirgischen Gneiss-Gebietes. R. | 63 | 612 |
| — — die Gneisse des Erzgebirges. B. | 64 | 829 |
| — — der Glimmertrapp in der jüngeren Gneiss-Formation des Erzgebirges. A. | 65 | 1 |
| — — die Bildung der Zinnstockwerke im Erzgebirge. R. | 65 | 866 |
| — — die Nickelerz-Lagerstätte von Redwinsk. R. | 66 | 457 |
| — — die Kupfergruben von Bogoslowsk. R. | 66 | 736 |
| — — die Kupfererz-Lagerstätten von Gumeschewsk und Soimonowsk. R. | 67 | 208 |
| — — geognostische Verhältnisse und Geschichte des Bergbaues der Gegend von Schmiedeberg, Niederpobel, Naundorf und Sadisdorf im Altenberger Bergamtsrevier. R. | 67 | 616 |
| — —, J.: über Imatra-Steine. B. | 61 | 304 |
| Muff: über einen bei Mannheim aufgefundenen Backenzahn von Elephas primigenius. B | 66 | 438 |
| Murchison: Fisch- und Reptilien-führender Sandstein von Elgin. R. | 60 | 104 |
| — — Classification der ältesten Gebirge in N. Schottland. R. | 60 | 586 |
| — — geologische Karte von Schottland. R. | 63 | 111 |
| — — Oberes Permian in England. B. | 63 | 701 |
| — — permische Formation in England; neue Ausgabe seiner geologischen Karte von England. B. | 64 | 50 |
| — — Steinkohlen Formation am Sinai. R. | 65 | 500 |
| Murchison und Geikie: die umgewandelten Gesteine in den Hochlanden Schottlands. R. | 62 | 104 |
| — — Schichtung und Blätterung der krystallinischen Gesteine der Schottischen Hochlande. R. | 62 | 358 |

## N.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Naschold: Analyse eines Steinmarks von Rochlitz R. | 1867 | 479 |
| Naumann, C. F.: die geotektonischen Verhältnisse des Melaphyr-Gebietes von Ilfeld. A. | 60 | 1 |
| — — Leucit-Pseudomorphosen von Böhmisch-Wiesenthal. B. | 60 | 61 |
| — — die Pseudomorphosen von Oberwiesenthal; geognostische Aufnahme des erzgebirgischen Bassins. B. | 61 | 59 |
| — — Gliederung des Rothliegenden im Erzgebirgischen Becken. B. | 62 | 869 |
| — — über die Münchberger Gneiss-Bildung. A. | 63 | 1 |
| — — noch einige Bemerkungen über die Münchberger Gneiss-Bildung. A. | 63 | 531 |
| — — über das Rothliegende bei Gera; Erbohrung von Pechkohle bei Bernsdorf; die Krantz'schen Krystall-Modelle; die Spirale der Conchylien. B. | 64 | 219 |
| — — „Elemente der Mineralogie". 6. Aufl. R. | 64 | 708 |
| — — geognostische Beschreibung des Kohlenbassins von Flöha. R. | 64 | 861 |
| — — die innere Spirale von Ammonites Ramsaueri. R. | 65 | 754 |
| — — über den Granit des Kreuzberges bei Carlsbad. A. | 66 | 145 |
| — — die polare Thermo-Electricität des Quarzes. B. | 66 | 201 |
| — — „Lehrbuch der Geognosie". III. Bd. 1. Lief (2. Aufl.) R. | 67 | 212 |
| — — geognostische Karte des Erzgebirgischen Bassins im Königreiche Sachsen. R. | 67 | 225 |
| — — Lehrbuch der Geognosie. 3. Bd. 2 Lief. R. | 68 | 624 |
| — — die auf der geognostischen Karte von Sachsen, das Hainicher Culmbecken begrenzenden, als Hornblendeschiefer bezeichneten, Gesteine sind, da sie chloritische Schiefer, besser als grüne Schiefer aufzuführen; die im dortigen Rothliegenden auftretenden Schichten mit Blöcken von Granit gehören derselben Bildung an. B. | 68 | 831 |
| — — Bericht über seine Reise in der Auvergne; der Mont Denise bei le Puy. B. | 69 | 194 |
| — — über Maare oder Explosions-Kratere in der Auvergne. B. | 69 | 843 |
| Nessler: chemische Untersuchung der badenschen Torfarten. R. | 61 | 81 |
| Neubert, E.: die Kupfererz-Lager der Kargalinskischen Steppe im Gouv. Orenburg. R. | 63 | 872 |
| Neumayr: petrographische Studien im mittleren und oberen Lias. R. | 69 | 378 |
| Newberry: geologische Untersuchungen in Neumexico. R. | 60 | 240 |
| — — amerikanische fossile Fische. R. | 63 | 381 |
| Newton, Alf.: Emys lutraria in Norfolk. R. | 63 | 245 |
| — — neu entdeckte Knochen der grössten Art des Dodo, Didus nazarenus R. | 66 | 247 |
| Nicholson: einige Fossilien aus den Graptolithen-Schiefern von Dumfriesshire. R. | 67 | 251 |
| — — einige Fossilien der unteren Silurformation des s. Schottlands. R. | 67 | 873 |
| — — neue Gattungen der Graptolithen. R. | 67 | 874 |
| — — die Graptolithen der Skiddaw-Gruppe. R. | 68 | 874 |
| Nicol: geologische Karte von Schottland. R. | 60 | 358 |
| — — geologische Structur des s. Grampians. R. | 63 | 741 |
| Nies, F.: „geognostische Skizze des Kaiserstuhlgebirges. R. | 63 | 732 |
| — — über die von Sandberger aufgestellte academische Mineralien-Sammlung zu Würzburg. B. | 65 | 716 |
| — — über eine Hornblende-Combination von Härtlingen in Nassau. A. | 68 | 53 |
| — — Ankündigung seiner Schrift „Beiträge zur Kenntniss des Keupers im Steigerwald". B. | 68 | 61 |
| — — Beiträge zur Kenntniss des Keupers im Steigerwald. R. | 68 | 217 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Nilsson: Versetzung von Pflanzen und Thieren in weite Fernen. R. | 1862 | 235 |
| Noblemaire: der Landstrich um Seo de Urgel in Catalonien. R. . . | 60 | 87 |
| Nöggerrath, Alb.: über die Quecksilber-Bergwerke zu Almaden in Spanien. R. | 63 | 479 |
| Noeggerath, J.: in Mainz im Torf entdeckte römische Antiquitäten. R. | 60 | 91 |
| — — Glimmertafeln, Krystalle von Turmalin und Granat enthaltend R. | 60 | 442 |
| — — Pseudomorphose von Eisenglanz nach Kalkspath von Iserlohn. R. | 60 | 572 |
| — — Holzkohlenstücke aus alter Halde einer Galmei-Grube. R. . . | 60 | 572 |
| — — Missbildung von Bleiglanz-Octaedern von Stolberg. R. . . . | 60 | 573 |
| — — ausgezeichneter Topas-Krystall aus dem Ural. R. . . . . | 60 | 809 |
| Noeggerath: Riesenmandel aus Melaphyr. R. . . . . | 61 | 83 |
| — — Amalgam vom Landsberg bei Moschel. R. . . . . | 61 | 83 |
| — — Thon im Vorgebirge bei Cöln. R. . . . . | 61 | 47 |
| — — das Gediegen-Blei von Madera. A. . . . . | 61 | 129 |
| — — Kalkspath Krystalle aus den Melaphyr-Mandeln von Kronweiler. R. | 61 | 328 |
| — — Dimorphismus der Blende. R. . . . . | 61 | 579 |
| — — Titanhaltiger Magneteisen-Sand in Neuseeland. R. . . . . | 61 | 582 |
| — — Hornstein-Geschiebe in der Steinkohlen-Formation. R. . . . | 62 | 192 |
| — — die intermittirende heisse Quelle zu Neuenahr in der Rheinprovinz. R . . . . . | 62 | 498 |
| — — über verglasten Porphyr vom Donnersberg R. . . . . | 62 | 737 |
| — — Pseudomorphosen von Cerussit nach Baryt R. . . . . | 62 | 1000 |
| — — Vorkommen von Rothgültigerz bei Fischelbach unfern Laasphe. R. | 63 | 588 |
| — — die Sprudelschale in Karlsbad. R. . . . . | 63 | 599 |
| — — der Erdschlüpf bei Godesberg. R. . . . . | 63 | 601 |
| — — Pseudomorphosen nach Kalkspath. R. . . . . | 64 | 79 |
| — — Salze von Stassfurt. R. . . . . | 64 | 713 |
| — — Tacitus und die rheinischen erloschenen Vulcane. R. . . . | 69 | 875 |
| Nöggerath, Max: Diorit und Mandelstein im Waldhambacher Thal bei Klingenmünster. B. . . . . | 66 | 801 |
| Noguès: Geologie und Mineralogie der Alberès. R. . . . . | 62 | 606 |
| — — Sediment- und Eruptiv-Gebilde im O. der Pyrenäen R. . . | 63 | 479 |
| — — Jura-Formation in den Corbieren. R. . . . . | 63 | 744 |
| Nordenskjöld: Tantalit von Björdboda in Finnland. R. . . . . | 60 | 80 |
| — — schwedische Yttrotantal-Mineralien R. . . . . | 61 | 329 |
| — — Tantalit-artige Mineralien aus der Gegend von Torro. R. . . | 65 | 86 |
| — — über den Crookesit. R. . . . . | 69 | 235 |
| — — über Berzelin. R. . . . . | 69 | 235 |
| — — Laxmannit, ein neues Mineral. R. . . . . | 69 | 370 |
| — — „Sketch of the geology of Spitzbergen". R. . . . . | 69 | 376 |
| Noulet: alluviale Kunst- und Thierreste bei Toulouse. R. . . . . | 61 | 108 |
| Nouel: über ein neues fossiles Rhinoceros. R. . . . . | 68 | 121 |


## O.


| | | |
|---|---|---|
| Oborny: Korund von Mährisch-Schönberg. R. . . . . | 65 | 479 |
| — — Gyps-Vorkommnisse Mährens. R. . . . . | 67 | 206 |
| — — die geognostischen Verhältnisse der Umgebung von Namiest. R. | 67 | 866 |
| Odernheimer: das Festland Australien. R. . . . . | 61 | 730 |
| — — Vorkommen des Goldes in Australien R. . . . . | 62 | 352 |
| — — das Berg- und Hüttenwesen in Nassau. R. . . . . | 63 | 849 |
| Oellacher: Margarit oder Perlglimmer von Sterzing. R. . . . . | 63 | 351 |
| Oersten, F.: Triphylin von Bodenmais in Bayern. R. . . . . | 60 | 76 |
| Oldham: Ausbeute an Steinkohle in Indien. R. . . . . | 63 | 858 |
| — — alte Steingeräthe in Indien. R . . . . . | 65 | 103 |
| — — „the coal researches and production of India. R. . . . . | 68 | 106 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Oldham: Catalogue of the Meteorites in the museum of the geological survey of India. R. | 1869 | 758 |
| Omboni: erratisches Gebirge der Lombardei. R. | 61 | 211 |
| — — die alten Gletscher und das erratische Gebirge der Lombardei. R. | 62 | 743 |
| — — „delle principali opere finora publicata sulla geologia del Veneta.“ R. | 64 | 244 |
| — — sull' azione riescavatrice exercitata dagli antichi ghiacciai sull fondo delle valle alpine“. R | 64 | 247 |
| — — über eine projectirte Übersichtskarte von Italien. B | 68 | 588 |
| — — die geologischen Verhältnisse der projectirten Eisenbahnen über den Splügen, den Septimer und den Lukmanier. R | 68 | 865 |
| Ooster: Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes Suisses R. | 60 | 122 |
| — — Pétrifications remarquables des Alpes Suisses. R. | 64 | 255 |
| — — dasselbe. R. | 66 | 628 |
| Oppel: weisse und rothe Kalke von Vils in Tyrol R. | 61 | 353 |
| — — über Glyphaea und Pseudoglyphaea. R. | 61 | 369 |
| — — Entdeckung von Kreidegestein in der Schichtenfolge bei Vils. B. | 61 | 675 |
| — — über das Alter der Hierlatz-Schichten. A. | 62 | 59 |
| — — die jurassischen Arten der Sippen Eryma, Pseudastacus, Magila und Etalionia. R. | 62 | 231 |
| — — Brachiopoden des unteren Lias. R. | 62 | 894 |
| — — jurassische Posidonomyen-Gesteine in den Alpen. R | 63 | 625 |
| — — paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des bayerischen Staates. R. | 64 | 503 |
| — — Paläontologische Mittheilungen. IV. Über indische Fossilreste. R. | 65 | 888 |
| — — neue Erfunde aus dem schwarzen Kalk von Sintwag in Tyrol. B. | 66 | 75 |
| — — die tithonische Etage. R. | 66 | 239 |
| — — Seesterne im Lias und Keuper. R. | 66 | 504 |
| Oppel, A. und K. Zittel: Paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des bayer. Staates II. 1. Die Cephalopoden der Stramberger Schichten R. | 69 | 251 |
| d'Orville und Kalle: Analyse der Faulbrunnen-Quelle in Wiesbaden R. | 60 | 444 |
| Owen: fossile Reptilien aus S.-Afrika. R. | 60 380 | 482 |
| — — Polyptychodon aus unterer Kreide von Dorking. R. | 60 | 494 |
| — — systematische Eintheilung und Verbreitung der lebenden und fossilen Reptilien. R. | 60 | 752 |
| — — über Thylacolex carnifex, Megalania prisca. R. | 60 | 864 |
| — — über Dinornis. R. | 61 | 128 |
| — — Megatherium Americanum. R. | 61 | 362 |
| — — fossile Reptilien Südafrika's. R. | 61 | 873 |
| — — fossile Reptilien in der Steinkohlen-Formation von South-Joggins, Nova Scotia R. | 63 | 237 |
| — — Miolophus neue Säugethier-Gattung aus dem Londonthon. R. | 66 | 128 |
| — — neue Fischgattungen und Saurier-Reste aus dem Kimmeridge-Thon. R. | 66 | 621 |
| — — ein jurassisches Säugethier Stylodus pusillus. R. | 66 | 621 |
| — — über den oberen Schneidezahn von Nototherium Mitchelli. R. | 67 | 503 |
| — — über Kiefer und Zähne von Cochliodonten. R. | 67 | 503 |
| — — über den Unterschied zwischen Castor und Trogontherium R. | 69 | 640 |


## P.


| | | |
|---|---|---|
| Packard: Glacial-Phänomene von Labrador und Maine und über die lebenden Invertebraten von Maine. R. | 68 | 223 |
| Pagilla: Backsteine im Alluvium des Po. R. | 68 | 250 |
| Palmieri: Thätigkeit des Vesuv. R. | 68 | 500 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Pander: die Steinkohlen an beiden Abhängen des Ural. R. . . | 1863 | 853 |
| Pareto: Profil durch die Apenninen. R. . . . . | 63 | 101 |
| — — Unterabtheilungen in der Tertiär-Formation der n. Apenninen. R. | 66 | 858 |
| Parker und Jones: die Nomenclatur der Foraminiferen. R. . . . . | 65 | 110 |
| Parker, Jones und Brady: dasselbe. R. . . . . | 65 | 763 |
| Paskell: Ausbruch der Mauna Loa, Sandwichinseln. R. . . . . | 62 | 738 |
| Passy: Geologie des Oise-Dept. R. . . . . | 61 | 96 |
| Paul: Verrucano und Werfener Schiefer des Bakonyer Waldes. R. . | 62 | 888 |
| Paulinyi: über Pettkoit. B. . . . . | 67 | 456 |
| Pauly, H.: über Minette und Glimmer-Porphyrite, vorzüglich im Odenwald. A. . . . . | 63 | 257 |
| Paykull: Staurolith von Nordmarkens Eisengrube in Wermeland; Prehnit von Upsala; Vivianit-Bildung; Epichlorit pseudomorph nach Granat und Eisenoxyd nach Quarz von Langban. B. . . . . | 67 | 590 |
| — — Analyse eines talkartigen Minerals von Langbans-Eisengrube. B. | 67 | 838 |
| — — über seine geologische Karte von Island. B. . . . . | 68 | 58 |
| — — „Istiden i Norden“. R. . . . . | 69 | 110 |
| Pearse: Analyse des Kämmererit. R. . . . . | 65 | 620 |
| Pecchioli: Descrizione di alcuni nuovi fossili delle argile subapennine toscane. R. . . . . | 65 | 383 |
| Peck: Gruptolithenschiefer bei Lauban. B. . . . . | 65 | 459 |
| Pereira da Costa: „Notice sur les squelles humains découverts au Cabeco d'Arruda“, R. . . . . | 67 | 243 |
| — — „commissao geologica de Portugal“. R. . . . . | 68 | 242 |
| — — „Gasteropodes dos depositos tertiarios de Portugal. R. . . . | 69 | 122 |
| Péron: Geologie der Umgebungen von Aumale in Algerien. R. . . | 67 | 232 |
| — — „sur la constitution géologique des montagnes de la grande Kabylie“. R. . . . . | 68 | 229 |
| Perron: Gault und chloritische Kreide bei Gray, Haute-Saone. R. . | 60 | 362 |
| Perry: der rothe Sandstein von Vermont. R. . . . . | 69 | 603 |
| Peters: geologische Zusammensetzung des Bihar. R. . . . . | 60 | 89 |
| — — tertiäre Schildkröten aus Österreich. R. . . . . | 60 | 379 |
| — — Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte des Azurits und Malachits von Moldawa im Banate. A. . . . . | 61 | 278 |
| — — das Pesther mineralogische Museum. B. . . . . | 61 | 310 |
| — — Mineralogische Miscellaneen. A. . . . . | 61 | 655 |
| — — über Calcit und die rhomboedrischen Carbonspathe im Allgemeinen. A. . . . . | 61 | 434 |
| — — über Biharit und Szaibelyit. R. . . . . | 62 | 86 |
| — — geologische und mineralogische Studien aus dem s.ö. Ungarn. R. | 62 | 90 |
| — — Lias von Fünfkirchen. R. . . . . | 63 | 863 |
| — — kleine Nager und Insectenfresser im Löss von Nussdorf bei Wien. R. . . . . | 64 | 509 |
| — — Foraminiferen im Dachsteinkalk. R. . . . . | 64 | 748 |
| — — geologische Verhältnisse der Dobrudscha. R. . . . . | 65 | 356 |
| — — das Halitherium-Skelet von Hainburg. R. . . . . | 68 | 247 |
| — — Phoca pontica bei Wien. R. . . . . | 68 | 247 |
| — — Vorkommen des Staurolith in Steyermark. R. . . . . | 68 | 352 |
| — — Staurolith im Gneiss von St. Radegund. R. . . . . | 68 | 846 |
| Peters und Maly: über den Staurolith von St. Radegund. R . . . | 68 | 846 |
| Peters, K.: zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald. I. Die Schildkröten. R. . . . . 69 | 114 | 879 |
| Petersen, Th.: über den Phosphorit von Diez. R. . . . . | 67 | 101 |
| — — Analyse des Hyalophan. R. . . . . | 67 | 102 |
| — — die Grauerze des Binnenthals. R. . . . . | 67 | 201 |
| — — Analyse des Dolomits aus dem Binnenthal. R. . . . . | 67 | 371 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Petersen, Th.: Nickelhaltiges Magneteisen von Pregratten in Tyrol. B. | 1867 | 836 |
| — — über Phosphorit. R. | 68 | 482 |
| — — über die Mineralien der barytischen Erzgänge von Wittichen. R. | 68 | 749 |
| — — über den Basalt und Hydrotachylyt von Rossdorf bei Darmstadt. A. | 69 | 32 |
| — — Analyse des Wittichenit. B. | 69 | 337 |
| — — Magnetkies von Auerbach in Hessen. R. | 69 | 368 |
| — — Chrompicotit vom Dun Mountain, Neuseeland. R. | 69 | 370 |
| — — zur Kenntniss des Rothgültigerzes. R. | 69 | 480 |
| — — Kupferwismuthglanz von Christophsau bei Freudenstadt. B. | 69 | 847 |
| — — über die Mineralien der barytischen Erzgänge von Wittichen in Baden. R. | 69 | 862 |
| Petzholdt, Al: zur Naturgeschichte der Torfmoore. R. | 63 | 228 |
| Philippi: Reise durch die Wüste Atakama. R. | 60 | 858 |
| Phillips, J.: Frucht in den Wealden auf Purbeck. R. | 60 | 864 |
| — — fossiles Holz im Feuerstein aus der Kreide von Winchester. R. | 66 | 126 |
| — — über Arsenik enthaltenden Schwefel von der Solfatara. R. | 63 | 366 |
| — — über den Sombrerit. R. | 63 | 471 |
| Phipson: Vorkommen von Diamant im metallführenden Sande bei Freemantle im w. Australien. R. | 67 | 608 |
| Pichler, A.: geologische Notizen aus Tyrol. A. | 62 | 178 |
| — — Geologisches aus Tyrol. B. | 62 | 868 |
| — — Beiträge zur Geognosie Tyrols. R. | 64 | 372 |
| — — der Oetzthaler Stock in Tyrol. R. | 65 | 243 |
| — — Beiträge zur Geologie Tyrols; 4. zur Oetzthaler Masse. R. | 65 | 345 |
| — — zur Geologie der nordtyrolischen Kalkalpen. R | 65 | 346 |
| — — Cardita-Schichten und Hauptdolomit. R. | 66 | 751 |
| — — zur Geognosie der Alpen. R. | 67 | 750 |
| — — Geologisches aus Tyrol; die Zone des Ammonites planorbis auch in Tyrol vorhanden. B. | 68 | 830 |
| — — zur Gliederung der Lias in den Nordalpen. B. | 69 | 724 |
| Piette: Exelissa, neue Gastropoden-Sippe. R. | 62 | 383 |
| Pisani, F.: Kupferoxyd- und Eisenoxyd-Sulphat enthaltendes Mineral der Türkei. R. | 60 | 445 |
| — — Analyse des Glauberits von Varengeville. R. | 61 | 90 |
| — — die Zusammensetzung des Gedrits und sein Spinell-Gehalt. R. | 62 | 82 |
| — — Analyse des Chalkolith aus Cornwall und des Uranit von Autun. R. | 62 | 601 |
| — — über den Spinell von Migiandone. R. | 63 | 365 |
| — — über den Rastolyt. R. | 63 | 366 |
| — — über eine Pseudomorphose des Augit vom Oberen See R. | 63 | 366 |
| — — über den Esmarkit von Bräkke. R. | 63 | 471 |
| — — Cancrinit von Barkevig. R. | 63 | 593 |
| — — Analyse des Meteoriten von Tourinnes-la-Grosse bei Louvain. R. | 64 | 476 |
| — — chemische Untersuchung des Pollux. R | 64 | 625 |
| — — über den Karphosiderit von Grönland. R. | 64 | 625 |
| — — Analyse des Langit. R. | 65 | 321 |
| — — Analyse des Fibroferrit von Pallières. R. | 65 | 328 |
| — — Brochantit aus Cornwall. R. | 65 | 328 |
| — — Devillin, ein neues Mineral aus Cornwall. R. | 65 | 477 |
| — — über den Luxullian. R. | 65 | 477 |
| — — über den Bustamit. R. | 66 | 365 |
| — — Granaten führender Sand bei Pesaro. R. | 66 | 458 |
| — — Thulit von Traversella. R. | 66 | 596 |
| — — über den Chenevixit. R. | 66 | 726 |
| — — Analyse des Meteoriten von St. Mesmin. R. | 66 | 831 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Pisani: über den schwarzen Spinell aus dem Dep. Haute-Loire. R. | 1867 | 99 |
| — — Analyse des am 11. Juli 1868 bei Ornans gefallenen Meteoriten. R. | 69 | 371 |
| Pissis: Vulcanismus in verschiedenen geologischen Perioden. R. | 62 | 735 |
| — — geologische Beschaffenheit der Cordilleren zwischen den Flüssen Copiapo und Choapa. R. | 62 | 744 |
| Pictet: Diluvialzeit und Jetztzeit. R. | 61 | 706 |
| — — Aufeinanderfolge der Gasteropoden in der Kreideformation der Schweizer Alpen und des Jura. R. | 65 | 754 |
| — — nouveaux documents sur les limites de le période crétacée. R. | 68 | 119 |
| Pictet, Campiche und Tribolet: fossiles du terrain crétacé de St. Croix. R. | 60 | 125 |
| Pictet et Humbert: „nouvelles recherches sur les poissons fossiles du Mont Libanon". R. | 67 | 238 |
| Pictet et Jaccard: „description des reptiles et poissons fossiles de l'étage virgulien du Jura". R. | 61 | 873 |
| Platz, P.: Wollastonit und Prehnit im Schwarzwald; geologische Aufnahmen in Baden. B. | 67 | 340 |
| — — geologische Beschreibung der Umgebungen von Lahr und Offenburg. R. | 68 | 357 |
| — — die Triasbildungen des Tauberthales. R. | 69 | 583 |
| Plücker: Untersuchungen über den Neptunismus des Glimmers. R. | 60 | 568 |
| Poggendorff: Meteorstein-Fall zu New Concord. R. | 61 | 748 |
| Pokorny: Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns. R. | 62 | 745 |
| Pomel: Alter des Hebungs-Systemes des Vercors. R. | 60 | 829 |
| Ponzi: fossile Menschenknochen bei Rom. R. | 61 | 108 |
| — — „sopra i diversi periodi eruttivi determinate nell' Italia centrale". R. | 65 | 105 |
| — — „dell' Aniene e dei suoi relitti". R. | 65 | 106 |
| Popp: der Sandstein bei Jägersburg und die in ihm vorkommenden fossilen Pflanzen. A. | 63 | 399 |
| Poppe, E.: fossile Früchte aus den Braunkohlenlagern der Oberlausitz. A. | 66 | 52 |
| Posepny: die Quarzite von Tritoma in Ungarn. R. | 64 | 854 |
| — — Erdöl-Vorkommen in Galizien. R. | 65 | 349 |
| — — Eruptiv-Gesteine von Rodna. R. | 66 | 101 |
| Potyka, L.: Boracit von Lüneburg und Stassfurtit von Stassfurt. R. | 60 | 80 |
| — — Anorthit vom Gestein des Konchekowskoi Kamen im Ural. R. | 60 | 229 |
| — — grüner Feldspath von Bodenmais in Bayern. R. | 60 | 351 |
| Powrie: die alten rothen Sandsteine von Fifeshire. R. | 63 | 221 |
| — — Fossilien des alten rothen Sandsteins von Forfarshire. R. | 65 | 508 |
| Puech: Knochenhöhle von Herm, Dep. Arriège. R. | 63 | 244 |
| Prado, C. de: Primordial-Fauna in der Cantabrischen Kette. R. | 60 | 747 |
| Prestwich: geschnittene Feuersteine mit Knochen ausgestorbener Thiere. B. | 60 | 99 |
| — — Knochenhöhle von Brixham in Devonshire. R. | 60 | 629 |
| — — Durchschnitte von Moulin Quignon, Abbeville und St. Acheul. R. | 64 | 117 |
| Prölss, O.: chemische Untersuchung einiger Gesteine von Java. A | 64 | 426 |
| — — über den Anamesit von Steinheim. A. | 65 | 279 |
| — — Untersuchung einer vulcanischen Asche von Java. A. | 65 | 287 |
| — — Beiträge zur Kenntniss der Trachyte. A. | 66 | 647 |
| — — Umwandelungen nach Orthoklas von Rechenberg im Erzgebirge. R. | 67 | 363 |
| — — das Granit-Gebiet von Eibenstock im Erzgebirge. A. | 69 | 259 |
| Prout: paläolithische Bryozoen aus den w. Vereinigten Staaten. R. | 60 | 638 |
| Pumpelly: geologische Beobachtungen in China. R. | 66 | 470 |
| — — „geological researches in China, Mongolia and Japan". R. | 68 | 105 |
| Pusyrewsky: über einige russische Apatite. R. | 63 | 98 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| **Q.** | | |
| Quenstedt: Pentacrinus subangularis im Lias von Reutlingen. B. . | 1861 | 173 |
| — — Bemerkungen zum Archegosaurus. A. . . . . | 61 | 294 |
| — — Fortsetzung seiner Petrefactenkunde Deutschlands, zunächst mit den Brachiopoden; über Horizonte in der Jura-Formation. B. . | 68 | 834 |
| **R.** | | |
| Rammelsberg: Analyse von Yttrotitanit. R. . . . . | 60 | 78 |
| — — Zusammensetzung des Cerits. R. . . . . | 60 | 232 |
| — — Bianchetto der Solfatara von Pozzuoli. R. . . . . | 60 | 570 |
| — — zerlegt Olivin vom Vesuv; Monticellit und Sarkolith. R. . . | 61 | 90 |
| — — Zusammensetzung des Stilbit; des Hauyns von der Somma. R. | 61 | 188 |
| — — Sodalith vom Vesuv und Grönland. R. . . . . | 61 | 326 |
| — — zerlegt Harmotom von Andreasberg und Strontian. R. . . . | 61 | 332 |
| — — Epidot-Analysen. R. . . . . | 61 | 491 |
| — — Zusammensetzung des Staurolith. R. . . . . | 61 | 579 |
| — — Analyse des Skolopsit. R. . . . . | 63 | 198 |
| — — über Glimmer von Gouverneur. R. . . . . | 63 | 466 |
| — — Analyse des Eusynchit. R. . . . . | 64 | 844 |
| — — über den Ferberit. R. . . . . | 65 | 327 |
| — — über Antimonsilber. R. . . . . | 65 | 476 |
| — — Zusammensetzung des Topas. R. . . . . | 66 | 226 |
| — — über den Castillit. R. . . . . | 66 | 718 |
| — — über Xonaltit. R. . . . . | 66 | 718 |
| — — Analyse der Karlsbader Feldspath-Zwillinge. R. . . . . | 67 | 712 |
| — — Analyse der Glimmer von Utö und Easton. R. . . . . | 67 | 859 |
| Ramsay: die Lücken in der Reihenfolge mesozoischer Schichten Englands. R. . . . . | 65 | 103 |
| — — geologische Karte von England und Wales. R. . . . . | 66 | 848 |
| Rand: Ivigtit, ein neues Mineral im Kryolith. R. . . . . | 69 | 234 |
| Rath, G. vom: Krystallform des Akmits. R. . . . . | 60 | 447 |
| — — Pseudomorphose von Feldspath nach Aragonit. R. . . . . | 60 | 573 |
| — — über den Julier-Granit. R. . . . . | 60 | 726 |
| — — Nauckit, ein neues krystallisirtes Harz. R. . . . . | 60 | 809 |
| — — Dolerit von der Löwenburg. R. . . . . | 61 | 88 |
| — — der Berg Olbrück. R. . . . . | 61 | 219 |
| — — das Maderaner Thal und Tavetsch. R. . . . . | 61 | 235 |
| — — Trachyte des Siebengebirges. R. . . . . | 61 | 358 |
| — — Brookit vom Maderaner Thale. R. . . . . | 61 | 849 |
| — — Bucklandit vom Laacher See. R. . . . . | 61 | 852 |
| — — Titanit-Krystalle in den Auswürflingen des Laacher See's und über Eisenglanz. R. . . . . | 62 | 89 |
| — — Zirkon am St. Gotthard. R. . . . . | 62 | 187 |
| — — Titanit vom Laacher See. R. . . . . | 62 | 484 |
| — — neue Flächen am Tesseralkies und eine ungewöhnliche des Anatas. R. . . . . | 62 | 726 |
| — — Granat und Epidot im Thale Maigels am St Gotthard. R. . | 63 | 96 |
| — — Turnerit bei Surrheim im Tavetsch. R. . . . . | 63 | 98 |
| — — die Granitmasse der Cima d'Asta. R. . . . . | 63 | 206 |
| — — Tafelstructur des Gneisses. R. . . . . | 63 | 482 |
| — — über den Meionit vom Laacher See. R. . . . . | 63 | 583 |
| — — über Mizzonit. R. . . . . | 63 | 721 |
| — — chemische Zusammensetzung des Orthits vom Laacher See. R. | 63 | 722 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Rath, G. vom: über den Pachnolith. R. | 1863 | 830 |
| — — Gesteine des Perlerkopfs. R. | 63 | 842 |
| — — Skizzen aus dem vulcanischen Gebiet des Niederrheins. R. | 64 | 473 |
| — — Chabasit in Drusen des Granits im Ockerthale. R. | 64 | 477 |
| — — über Wiserin. B. | 64 | 690 |
| — — über die Mineral-Fundstätte des Binnenthals. R. | 64 | 708 |
| — — über Dufrénoysit, Skleroklas und Jordanit. R. | 64 | 711 |
| — — das Gestein des Adamello-Gebirges. R. | 64 | 718 |
| — — Quecksilber-Grube von Vallalta. R. | 64 | 722 |
| — — über den Diaspor von Campo longo bei Faido. R. | 64 | 852 |
| — — einige Beobachtungen auf Elba. R. | 65 | 95 |
| — — die Euganäischen Berge bei Padua. R. | 65 | 337 |
| — — die Kupfergrube Monte Catini in Toscana. R. | 65 | 861 |
| — — Augit als Fumarolen-Bildung. R. | 66 | 824 |
| — — Besuch Radicofanis. R. | 66 | 98 |
| — — über Kalkspath vom Oberen See. R. | 68 | 347 |
| — — Kalkspath von Alston Moor in Cumberland. R. | 68 | 351 |
| — — Kalkspath von Hausach in Baden. R. | 68 | 351 |
| — — über den Meneghinit von der Grube Bottino in Toscana. R. | 68 | 352 |
| — — über Kalkspath-Krystalle von Andreasberg. R. | 68 | 481 |
| — — Kalkspath von Beresowsk. R. | 68 | 481 |
| — — vorläufige Mittheilung über eine neue Krystallform der Kieselsäure. R. | 68 | 485 |
| — — über einige Kalkspath-Krystalle. R. | 68 | 603 |
| — — Kalkspath von Arendal. R. | 68 | 606 |
| — — über die Metoriten von Pultusk in Polen, gefallen am 30. Jan. 1868. R. | 69 | 80 |
| — — neue Kalkspath-Formen aus dem Melaphyr der Nahe. R. | 69 | 367 |
| — — Olivin in den Laacher Sanidin-Auswürflingen. R. | 69 | 368 |
| — — über den Laacher Sanidin. R. | 69 | 372 |
| — — „Aus Norwegen“. A. | 69 | 385 |
| — — Berichtigung der Winkel des Vivianit-Systemes. R. | 69 | 575 |
| — — Berichtigung der chemischen Formel des Kieselwismuths. R. | 69 | 576 |
| — — Bestimmung der Krystallform des Atelestit. R. | 69 | 577 |
| — — über den Boulangerit von der Grube Silbersand bei Mayen. R. | 69 | 746 |
| Redtenbacher: Untersuchung von Mineralwassern vermittelst der Spectralanalyse. R. | 62 | 486 |
| Reich: magnetische Beschaffenheit des Heidberges bei Zell. R. | 64 | 91 |
| Reichardt, E.: Vorkommen von Schwefelantimon bei Schleitz. R. | 63 | 836 |
| — — über den Kainit. B. | 65 | 602 |
| — — das Steinsalzbergwerk Stassfurt und dessen Vorkommnisse. A. | 66 | 321 |
| — — einige neue Vorkommnisse Stassfurts. B. | 68 | 468 |
| — — über den Polyhalit von Stassfurt. A. | 69 | 325 |
| Reichenbach; v.: Meteorit von Clarac und Ausson. R. | 60 | 82 |
| — — inneres Gefüge der näheren Bestandtheile des Meteoreisens. R. | 62 | 598 |
| Reiss, W.: Diabas- und Laven-Formation der Insel Palma. R. | 61 | 708 |
| — — über die tertiären Schichten von Santa Maria, der südlichsten der Azoren und ihre organischen Einschlüsse. A. | 62 | 1 |
| — — über das Vogelsgebirge. B. | 63 | 696 |
| Reiss, W. und A. Stübel: Ausflug nach den vulcanischen Gebirgen von Ägina und Methana im J. 1866, nebst mineralogischen Beiträgen von K. v. Fritsch. R. | 68 | 212 |
| — — Geschichte und Beschreibung der vulcanischen Ausbrüche bei Santorin von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart. R. | 68 | 89 |
| Renaier: geologisches Alter des Marmors von Saltrio. R. | 69 | 862 |
| Renevier: über die waadtländischen Alpen. R. | 65 | 745 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Renevier: geologische und paläontologische Notizen über die Waadtländischen Alpen. R. | 1869 | 596 |
| Reusch: über den Schiller des Adulars und Labradorits. R. | 63 | 715 |
| Reuss, A.: seine Abhandlung über fossile Krabben; Monographie über Foraminiferen und deren Schalenstructur. B. | 60 | 65 |
| — — zur Kenntniss fossiler Krabben. R. | 60 | 125 |
| — — marine Tertiärschichten Böhmens. R. | 60 | 364 |
| — — Anthozoen aus dem Mainzer Becken. R. | 60 | 375 |
| — — Freieslebenit, Gummierz, Silber, Amethyst in Böhmen. R. | 60 | 578 |
| — — Foraminiferen der westphälischen Kreide. R. | 60 | 630 |
| — — über Lingulinopsis. R. | 60 | 636 |
| — — neue Mineral-Vorkommnisse auf den Pribramer Erzgängen. R. | 60 | 712 |
| — — Umbildungs-Erzeugnisse aus Celtischen Bronzen. R. | 60 | 812 |
| — — Chemische Zusammensetzung der Foraminiferen-Schalen. R. | 60 | 872 |
| — — Böhmische Mineralien. R. | 61 | 78 180 |
| — — Mollusken der tertiären Süsswasserkalke Böhmens. R. | 61 | 242 |
| — — Mineralogische Notizen über Pribram. R. | 61 | 324 |
| — — zur tertiären Foraminiferen-Fauna. R. | 61 | 505 |
| — — systematische Zusammenstellung der Foraminiferen. R. | 62 | 253 |
| — — neue oligocäne Scalpellum-Art. R. | 62 | 768 |
| — — Alters-Verhältnisse der Diorite bei Rakonitz. B. | 63 | 346 |
| — — Foraminiferen des norddeutschen Hils und Gault. R. | 63 | 498 |
| — — die Foraminiferen-Familie der Lageniden. R. | 63 | 500 |
| — — geognostische Skizzen der Umgebungen von Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. R. | 63 | 734 |
| — — Flora der Salzstellen, besonders Böhmens. R. | 63 | 747 |
| — — mineralogische Notizen aus Böhmen. R. | 64 | 74 |
| — — interessantes Vorkommen von Vivianit. R. | 64 | 81 |
| — — die Foraminiferen des Septarienthons von Offenbach. R. | 64 | 749 |
| — — Korallen in der alpinen Trias. R. | 64 | 759 |
| — — Paragenese der auf den Erzgängen von Pribram einbrechenden Mineralien. R. | 65 | 91 |
| — — Foraminiferen des Crag von Anvers. R. | 65 | 110 |
| — — Anthozoen und Bryozoen von Oberburg in Steiermark. R. | 65 | 250 |
| — — fossile Lepadiden. R. | 65 | 251 |
| — — Ankündigung seiner Arbeit über Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des Septarienthons; Monographie der fossilen Thiere des Steinsalzes von Wieliczka. B. | 66 | 77 |
| — — Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Septarienthones. R. | 66 | 485 |
| — — Foraminiferen und Ostracoden der Kreide am Kanara-See. R. | 66 | 489 |
| — — zur Fauna des deutschen Oligocäns. R. | 66 | 502 |
| — — zwei neue Anthozoen aus den Hallstätter Schichten. R. | 66 | 502 |
| — — fossile Korallen von der Insel Java. R. | 67 | 634 |
| — — Markasit pseudomorph nach Eisenglanz. R. | 67 | 716 |
| — — die Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Teschen in ihren geologischen Verhältnissen geschildert. R. | 67 | 744 |
| — — Crustaceen-Reste aus der alpinen Trias Österreichs. R. | 67 | 762 |
| — — fossile Fauna der Steinsalz-Ablagerung von Wielicka. R. | 67 | 764 |
| — — über einige Bryozoen aus dem deutschen Unteroligocän. R. | 67 | 765 |
| — — Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. I. Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castel Gomberto. R. | 69 | 117 |
| — — Paläontologische Beiträge. R. | 69 | 634 |
| Reuss und Laube: die Versteinerungen des braunen Jura von Balin. R. | 67 | 507 |
| Ribeiro: die Steinkohlen-Grube von S. Pedro da Cova im Concelso de | | |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Gondomar, District von Porto: aus dem Portugiesischen übersetzt und bevorwortet von W. Reiss. A. | 1862 | 257 |
| Ribeiro: „Commissão geologica de Portugal". R. | 68 | 221 |
| Richter, M.: zur Darwin'schen Lehre. R. | 65 | 764 |
| Richter, R.: Clymenien und Goniatiten des Fichtelgebirges. B. | 64 | 612 |
| — — aus dem Thüringichen Schiefergebirge. R. | 64 | 734 |
| — — der Culm in Thüringen. R. | 64 | 734 |
| — — über Graptolithen. B. | 66 | 211 |
| — — aus dem Thüringischen Schiefergebirge. R. | 66 | 471 |
| — — obersilurische Petrefacten in Thüringen. B. | 66 | 807 |
| — — aus dem Thüringischen Schiefergebirge. R. | 67 | 506 |
| — — aus dem Thüringischen Zechstein. R. | 67 | 757 |
| — — „aus alten Grüften". R. | 68 | 371 |
| — — über Petrefacten des Thüringer Muschelkalkes. B. | 69 | 61 |
| — — Terebratula vulgaris gehört zu Spirigerina. B. | 69 | 219 |
| — — „Noch älter". R. | 69 | 382 |
| Richthofen, v.: der Bau der Rodnaër Alpen. R. | 60 | 600 |
| — — geologische Verhältnisse um Telkibanya. R. | 60 | 614 |
| — — die Gegend von Bereghszasz. R. | 60 | 832 |
| — — die Kalkalpen von Vorarlberg und N.-Tyrol. R. | 60 | 843 |
| — — Tertiäre Eruptivgesteine in Ungarn und Siebenbürgen. R. | 61 | 98 |
| — — Studien im Ungarisch-Siebenbürgischen Trachytgebirge. R. | 62 | 205 |
| — — über den Gebirgsbau an der Nordküste von Formosa. R. | 62 | 613 |
| — — Bemerkungen über Ceylon. R. | 62 | 738 |
| — — Nummuliten-Formation auf Japan und den Philippinen. R. | 63 | 219 |
| — — „principles of the natural system of volcanic rocks". R. | 68 | 852 |
| Riotte: Stetefeldtit, ein neues Mineral. R. | 68 | 85 |
| Risse: über den Moresnetit. R. | 66 | 596 |
| — — über die Messingblüthe. R. | 66 | 599 |
| Ritthausen: Lithion haltiger Mergel von Weitzdorf in Ostpreussen. R. | 68 | 360 |
| Rittler: Serpentin mit Chrom- und Magneteisen in Vermont. R. | 61 | 94 |
| Rivot: silberhaltige Bleiglanz-Gänge von Vialas. R. | 64 | 731 |
| Rochebrunne, de: zwei neue Arten, Pileolus giganteus und Vulsella Deshayesi, in der Kreide der Charente. R. | 64 | 120 |
| Rochees, de: Bildung der Koralleninseln in der Südsee. R. | 63 | 373 |
| Rodoszkovsky: Wagit, ein neues Mineral aus dem Ural. R. | 62 | 882 |
| Röder: über den Föhnwind. R. | 65 | 629 |
| Roehl, v.: Nickelkies auf Kohlensandstein. B. | 61 | 673 |
| — — Cyclopteris trichomanoides und Neuropteris Loshii. B. | 63 | 814 |
| — — fossile Flora der Steinkohlen-Formation Westphalens, einschliesslich Piesberg bei Osnabrück. R. | 69 | 507 |
| Roemer, E.: Monographie der Mollusken-Gattung Dosinia. R. | 65 | 365 |
| — — Monographie der Mollusken-Gattung Venus. R. | 66 | 117 |
| — — dasselbe. R. | 68 | 250 |
| — — dasselbe. R. | 69 | 122 633 |
| Römer, F.: Reise in Norwegen; Silur-Fauna von Tennessee; Nachrichten von Daurien und dem Amur. B. | 60 | 327 |
| — — die silurische Fauna von W.-Tennessee. R. | 60 | 759 |
| — — Reise zur französ. Naturforscher-Versammlung zu Besançon; Hoplophorus-Skelet zu Dijon; Reise durch Burgund nach Paris. B. | 61 | 160 |
| — — Kulm-Schichten mit Posidonomya Becheri in Deutschland und in den Sudeten. B. | 61 | 313 |
| — — Vorkommen des Apatit bei Krageroe. R. | 61 | 491 |
| — — Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe zu Sadewitz bei Oels. B. | 61 | 559 |
| — — fossile Flora der silurischen Geschiebe von Sadewitz. R. | 61 | 875 |
| — — Bericht über seine Reise nach Russland. B. | 62 | 66 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Roemer, F.: Notiz über die silurischen Schichten der Gegend von Saleszcyky in Galizien. A. | 1862 | 327 |
| — — Posidonomya Becheri bei Johannesfeld unfern Troppau. R. | 63 | 118 |
| — — über Vorarbeiten zur Herstellung einer geologischen Karte von Oberschlesien. A. | 63 | 334 |
| — — Reise nach Constantinopel. B. | 63 | 347 |
| — — Nachweis des Keupers in Oberschlesien und Polen. B. | 63 | 372 |
| — — neue Asteriden und Crinoiden aus devonischem Schiefer von Bundenbach bei Birkenfeld. R. | 63 | 382 |
| — — geognostische Bemerkungen auf einer Reise nach Constantinopel. A. | 63 | 513 |
| — — senone Kreide-Bildung bei Bladen in Oberschlesien. R. | 63 | 619 |
| — — über eine geologische Reise nach Russland im Sommer 1861. R | 63 | 745 |
| — — Diluvial-Geschiebe von nordischen Sedimentär-Gesteinen in der norddeutschen Ebene. R. | 63 | 752 |
| — — Scheelit im Riesengebirge. R. | 64 | 234 |
| — — Goniatiten im productiven Steinkohlengebirge von Eschweiler. R. | 64 | 751 |
| — — geologische Reisenotizen aus Spanien. A. | 64 | 769 |
| — — Gneiss- und Granulit-Geschiebe in einem Steinkohlen-Flötz Oberschlesiens. R. | 65 | 482 |
| — — Rothliegendes bei Krzeszowice. R. | 65 | 750 |
| — — Protolycosa anthracophila, eine fossile Spinne aus dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens. A. | 66 | 136 |
| — — über seine Reise nach England und über seine geognostische Karte von Oberschlesien. B. | 66 | 202 |
| — — Vorkommen von Rhizodus Hibberti. R. | 66 | 244 |
| — — grosse Chabasit-Krystalle von Dembio. R. | 66 | 364 |
| — — von Zinkspath umhüllte Reste einer Fledermaus. R. | 67 | 201 |
| — — geognostische Beobachtungen im polnischen Mittelgebirge. R. | 67 | 632 |
| — — über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlen-Gebirge. R. | 67 | 633 |
| — — Gliederung des Keupers und der ihn überlagernden Abtheilung der Jura-Formation in Oberschlesien und im angrenzenden Polen. R. | 68 | 232 |
| — — geognostische Karte von Oberschlesien. R. | 68 | 760 |
| — — das mineralogische Museum der Universität Breslau. R. | 68 | 880 |
| — — die Versammlung deutscher Geologen in Hildesheim, Schweizer Naturforscher in Einsiedeln und über einige mineralogische und paläontologische Sammlungen in der Schweiz und in Norddeutschland. A. | 69 | 15 |
| Römer, A.: eocäne Schichten bei Helmstädt. B. | 63 | 451 |
| — — über ein zum Thenardit gehöriges Mineral. B. | 63 | 566 |
| — — System der Spongitarien. B. | 64 | 463 |
| Römer, F. A.: die Quadraten-Kreide des Sudmerberges bei Goslar. R. | 66 | 242 |
| Röthe, K.: über einige krystallinische Gesteine im Ries. A. | 63 | 169 |
| — — Analysen einiger Trasse aus den Umgebungen des Rieses. A. | 63 | 177 |
| Romanowsky: fossile Fische aus dem Kohlenkalk des Gouv. Tula. R. | 66 | 247 |
| Romer: Wanderungen im Bakonyer Walde. R. | 60 | 583 |
| Rominger, C.: über Pleurodictyum problematicum. R. | 63 | 497 |
| — — über Calamoporen aus den Alluvial-Gebilden von Michigan. R | 63 | 504 |
| Root, W.: Enargit von der Morgenstern-Grube in Californien. R. | 69 | 85 |
| Rose, G.: Glinkit, dessen Beschaffenheit und Vorkommen. R. | 60 | 230 |
| — — Messing-Krystallisation von der Messinghütte zu Goslar. R. | 60 | 572 |
| — — Nickel-Regulus in gestrickten Formen. R. | 60 | 574 |
| — — heteromorphe Zustände der kohlensauren Kalkerde. R. | 60 | 705 |
| — — dasselbe. R. | 61 | 179 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Rose, G.: neuer Fundort von Brucit in Pennsylvanien. R. . . . | 1861 | 488 |
| — — Dolomit-Krystalle in Gyps bei Eisenach R. . . . . | 61 | 488 |
| — — Mineral-Vorkommen bei Bergen-Hill, New-Jersey. R. . . . | 62 | 491 |
| — — kreisförmige Verwachsung des Rutil. R. . . . . | 62 | 727 |
| — — krystallisirter Quarz im Meteoreisen von Xiquipilco in Mexico. R. | 65 | 82 |
| — — über den Asterismus der Krystalle, insbesondere des Glimmers. R. | 63 | 91 |
| — — Meteorit von der Sierra de Chaco in Chile. R. . . . . | 63 | 361 |
| — — Schmelzung des kohlensauren Kalkes und Darstellung künstlichen Marmors. R. . . . . | 63 | 464 |
| — — zwei neue Meteoriten-Fälle. R. . . . . | 64 | 236 |
| — — chemische Zusammensetzung des Braunits und des Hausmannits; Isomorphie des Mangansuperoxyds mit der Kieselsäure. R. | 64 | 358 |
| — — Schmelzung von kohlensaurem Kalk und Darstellung künstlichen Marmors. R. . . . . | 64 | 364 |
| — — über die in den Thonschiefern vorkommenden, mit Faserquarz besetzten Eisenkies-Hexaeder. R. . . . . | 65 | 235 |
| — — Pseudomorphosen von Eisenoxyd nach Magneteisen. R. . . . | 65 | 238 |
| — — Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten auf Grund der Sammlung des mineralogischen Museums in Berlin. R. . . . | 65 | 321 |
| — — über die Krystallform des Albits von dem Roc-tourné und von Bonhomme in Savoyen. R. . . . . | 65 | 740 |
| — — regelmässige Verwachsungen von Periklin. R. . . . . | 66 | 822 |
| — — die Gabbro-Formation von Neurode in Schlesien. R. . . . | 67 | 862 |
| — — Ursache der schwarzen Färbung des Serpentins von Reichenstein. R. | 68 | 78 |
| — — legt eine Mittheilung von G. vom Rath vor über eine neue krystallisirte Modification der Kieselsäure. R. . . . . | 68 | 744 |
| — — Glanzkobalt von Daschkessan im Kaukasus. R. . . . . | 68 | 848 |
| — — über die im Kalkspath vorkommenden hohlen Canäle. R. . . | 69 | 477 |
| Rose, H.: über blaues Steinsalz R. . . . . | 62 | 881 |
| — — Zusammensetzung eines fossilen Eies. R. . . . . | 63 | 465 |
| Rosen, v.: die chemisch-geognostischen Verhältnisse der devonischen Formation des Dünathales. R. . . . . | 64 | 489 |
| Rosenbusch: der Nephelinit vom Katzenbuckel. R. . . . . | 69 | 485 |
| Roth: Verwitterung unveränderter und veränderter Dolomite. R. . . | 60 | 369 |
| Roth, J.: „die Gesteins-Analysen in tabellarischer Übersicht". Berlin, 1861. R. . . . . | 62 | 87 |
| — — über die Abhandlung „die vulcanischen Erscheinungen in der Eifel. B. . . . . | 66 | 708 |
| Rube: Rubidium im Gneiss bei Freiberg. R. . . . . | 62 | 600 |
| Ruckner: das Zinnerz-Vorkommen von Schlaggenwald. R. . . . . | 64 | 362 |
| Rütimeyer: die Thierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz. R. . . | 60 | 362 |
| — — die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. R. . . . . | 62 | 628 |
| — — Beiträge zur miocänen Fauna der Schweiz. R. . . . . | 62 | 635 |
| — — eocäne Säugethiere aus dem Gebiet des Schweizer Jura. R. | 63 | 252 |
| — — Beiträge zur Kenntnies der fossilen Pferde. R. . . . . | 64 | 255 |
| — — Beiträge zu einer paläontologischen Geschichte der Wiederkäuer zunächst an Linné's genus Bos. R. . . . . | 67 | 377 |
| — — über Art und Race des zahmen europäischen Rindes. R. . . | 67 | 380 |
| — — Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes in seinen Beziehungen zu den Wiederkäuern im Allgemeinen R. . . . | 67 | 765 |
| — — die Herkunft unserer Thierwelt. R. . . . . | 68 | 113 |
| — — die Grenzen der Thierwelt. R. . . . . | 68 | 633 |
| Rummel: Beiträge zur Kenntniss der Trias Unterfrankens. A. . . . | 63 | 785 |
| Runge: Vorkommen und Gewinnung des Bernsteins. R. . . . . | 68 | 234 |
| — — das Tertiärgebirge des Samlandes (nach Untersuchungen des Professor Zaddach). A. . . . . | 68 | 769 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Ruprecht: Protopteris confluens aus der Kirgisen-Steppe. R. . . | 1860 | 878 |
| Ruscou: atmosphärischer Ursprung der Tuffe in der Campagna. R . | 66 | 252 |


## S.


| | | |
|---|---|---|
| Sadebeck: die Vorberge des Eulengebirges. R. . . . . | 61 | 497 |
| — — ein Beitrag zur Kenntniss des baltischen Jura. R. . . . . | 67 | 242 |
| — — über einen Magneteisen-Krystall von Achmatowsk. R. . . . | 69 | 749 |
| Saemann: Einheit der geologischen Erscheinungen im Sonnensysteme. R. | 62 | 94 |
| — — über Anomia biplicata und A. vespertilio. R. . . . . | 62 | 742 |
| — — über Belemnites quadratus Defr. R. . . . . | 63 | 502 |
| Salter: neue Kruster aus silurischen Gesteinen. R. . . . . | 60 | 639 |
| — — der älteste Fisch ein Pteraspis. R. . . . . | 60 | 758 |
| — — neue Eurypterus-Arten. R. . . . . | 61 | 252 |
| — — paläolithische Kruster vom Sunday-River. R. . . . . | 61 | 638 |
| — — über Peltocaris. R. . . . . | 63 | 622 |
| — — fossile Crustaceen und Muscheln in der Steinkohlen- und Devon-Formation des britischen Nordamerika. R. . . . . | 63 | 627 |
| — — über Eurypterus. R. . . . . | 63 | 628 |
| — — über Curtonotus. R. . . . . | 64 | 128 |
| — — über einen neuen Krebs aus der Steinkohlen-Formation von Glasgow. R. . . . . | 64 | 128 |
| — — neue Lingulella aus den unteren cambrischen Geseinen von St. Davids R. . . . . | 68 | 374 |
| Sandberger, Fr: die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens. III R. | 60 | 121 |
| — — dasselbe. IV. Lief. R. . . . . | 60 | 870 |
| — — geologische Beschreibung der Gegend von Baden. R. . . . | 61 | 595 |
| — — über die Verbreitung der Posidonomyen-Schiefer; grosses Pterophyllum in der Schwarzwälder Kohlenformation; die Versteinerungen des Mainzer Beckens. B. . . . . | 61 | 676 |
| — — Conchylien des Mainzer Beckens. R. . . . . | 61 | 869 |
| — — dasselbe. VII. R. . . . . | 62 | 764 |
| — — die zwischen Jura und Neocomien an den Ufern des Doubs auftretenden Bänke sind Äquivalente der Purbeck-Schichten: Ankündigung seiner Arbeit über die Renchbäder. B. . . . . | 63 | 814 |
| — — über Wismuth-Silbererz; kohlensaures Silberoxyd; gelben Pyromorphit von Badenweiler; Kobaltfahlerz B. . . . . | 64 | 221 |
| — — geologische Beschreibung der Renchbäder. R . . . . . | 64 | 484 |
| — — über das Sombrero-Phosphat R. . . . . | 64 | 631 |
| — — die Conchylien des Mainzer Tertiär-Beckens. R. . . . . | 64 | 636 |
| — — zur Erläuterung der geologischen Karte der Umgebung von Karlsruhe. R. . . . . | 64 | 738 |
| — — der Kalk von Beauce ist ein Äquivalent des Mainzer Landschneckenkalkes; die Trias bei Würzburg; ächte Unionen-Arten kommen nicht vor dem Wealden vor. B. . . . . | 65 | 56 |
| — — Beobachtungen im mittleren Jura des badischen Oberlandes. R. | 65 | 244 |
| — — über das Wismuthkupfererz. A. . . . . | 65 | 274 |
| — — Auftreten des Bonebeds bei Adelhausen unfern Lörrach B. . | 65 | 307 |
| — — Flora der oberen Steinkohlen-Formation im Schwarzwald. R. | 65 | 370 |
| — — Olivinfels bei Tringenstein in Nassau. B. . . . . | 65 | 449 |
| — — über Kobalt und Wismuth enthaltende Fahlerze und deren Oxydations-Producte. A. . . . . | 65 | 582 |
| — — Beobachtungen in der Würzburger Trias. R. . . . . | 65 | 746 |
| — — die Stellung der Raibler Schichten in dem fränkischen und schwäbischen Keuper. A. . . . . | 66 | 34 |
| — — Orthit im Spessart. R. . . . . | 66 | 89 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Sandberger, F.: Nachträge zu seinen beiden Abhandlungen über Kobaltfahlerz und Wismuthkupfererz. B. | 1866 | 200 |
| — — Nachtrag zu dem von Geinitz gegebenen Verzeichniss der Kohlenpflanzen der Berghaupten-Diersburger Mulde; über die durch Platz im Rothliegenden bei Durlach aufgefundenen Pflanzen. B. | 66 | 212 |
| — — fossile Pflanzen aus dem Rothliegenden des badischen Schwarzwaldes. R. | 66 | 869 |
| — — Anhydrit aus dem Mont-Cenis-Tunnel; krystallisirter Nephelin in Drusen von Pfaffenreuth; Nakrit pseudomorph nach Scheelit von Ehrenfriedersdorf; Talk nach Enstatit; über Bohrungen bei Wyhlen am Rhein im Herbst 1866. B. | 67 | 79 |
| — — nachträgliche Bemerkungen zu seiner Abhandlung über Olivinfels. A. | 67 | 171 |
| — — Umwandlung von Kalkspath in Aragonit. R. | 67 | 359 |
| — — Analyse des grünen Pyromorphits von Badenweiler; rhomboedrische Krystalle von Staffelit. B. | 67 | 449 |
| — — Zirkon im Fichtelgebirge. R. | 67 | 476 |
| — — Staffelit und Osteolith; Kacholong nach Quarz; Chromzoisit; über den Serpentin von Todtmoos; die Naturforscher-Versammlung in Rheinfelden. B. | 67 | 833 |
| — — die Gliederung der Würzburger Trias und ihrer Äquivalente R. | 68 | 234 |
| — — dasselbe. R. 68 | 362 | 623 |
| — — Untersuchungen über die Erzgänge von Wittichen im badischen Schwarzwald. A. | 68 | 385 |
| — — Tridymit neben Bergkrystall von Mont d'or les Bains. B. | 68 | 466 |
| — — Pyrop in einem Olivinfels Einschluss des Basaltes des Habichtswaldes; Tridymit neben Quarz in Höhlungen des Trachyts vom Drachenfels bei Bonn. B. | 68 | 723 |
| — — Nachtrag zu den Untersuchungen über die Erzgänge von Wittichen. B. | 69 | 205 |
| — — über das Äquivalent des oberen Muschelkalkes in den Südalpen. B. | 69 | 211 |
| — — Untersuchungen über den Wenzelgang bei Wolfach im badischen Schwarzwalde. A. | 69 | 290 |
| — — mikroskopische Structur des Nephelinits vom Katzenbuckel; Nachweis von Pleonast in demselben. B. | 69 | 337 |
| — — Skleroklas von Hall in Tyrol. R. | 69 | 369 |
| Sandberger, G.: Wiesbaden und seine Thermen. R. | 61 | 601 |
| Sanders: Vorkommen von Gold in der Grafschaft Wicklow in Irland. R. | 65 | 245 |
| Saporta: Cycadeen in der mittlen Tertiär-Formation der Provence. R. | 65 | 373 |
| — — fossile Pflanzen von Haldem in Westphalen. R. | 67 | 635 |
| — — Temperatur der geologischen Perioden. R. | 67 | 744 |
| Sars: Organismen in postpliocänen Schichten Norwegens. R. | 61 | 731 |
| Sartorius von Waltershausen: über eine Krystallform des Diamant. R | 63 | 715 |
| — — über den Silberkies. R. | 66 | 725 |
| Scacchi: Polyedrie der Krystallflächen. R. | 63 | 469 |
| Scarabelli: „sui gessi di una parte del versante n. e. dell' Apennino". R. | 65 | 106 |
| — — „sulla probabilita che il sollevamento delle Alpi siasi effetuato sopra una linea curva". R. | 67 | 238 |
| — — Ursachen der Schichten-Störungen in den Apenninen. R. | 68 | 868 |
| Schaaffhausen: Menschen-Gebeine im Löss bei Mastricht. R. | 60 | 860 |
| — — Kieselgeräthe und Knochen ausgestorbener Thiere. R. | 61 | 92 |
| — — fossile Knochen aus dem Lennethal. R. | 65 | 763 |
| — — fossile Mammuth-Knochen aus dem Bett der Lippe. R. | 65 | 764 |
| Schafhäutl: Ankündigung seines petrefactologischen Werkes über die bayerischen Alpen. B. | 62 | 331 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Schafhäutl: Beiträge zur näheren Kenntniss der bayerischen Gebirge. A. | 1864 | 812 |
| — — dasselbe. A. | 65 | 14 |
| — — die Nummuliten führenden Schichten des Kressenberges. A. | 65 | 769 |
| — — der weisse Jura im Wettersteingebirge und der Lias im Hochfelln der bayerischen Alpen. A. | 65 | 788 |
| — — weitere Beiträge zur näheren Kenntniss der bayerischen Alpen. A. | 67 | 257 |
| Schaffner: fossile Algen im grünen Jaspis Ostindiens. R. | 60 | 616 |
| Scharff, Fr.: über Werner und Delisle in Zusammenstellung mit Hauy. A. | 60 | 414 |
| — — über die milchige Trübung auf der Endfläche des säuligen Kalkspathes. A. | 60 | 535 |
| — — über die Bildungsweise des Aragonits. A. | 61 | 32 |
| — — Ausheilung verstümmelter Krystalle. R. | 61 | 84 |
| — — die Bauweise der würfelförmigen Krystalle. A. | 61 | 385 |
| — — der kohlensaure Kalk. III. Rhomboeder und Skalenoeder. A. | 62 | 684 |
| — — über Bleiglanz-Krystalle. A. | 63 | 545 |
| — — über den Zwillingsbau des Quarzes. A. | 64 | 530 |
| — — über das Irisiren im Quarz. B. | 65 | 824 |
| — — Zwillings-Bildung beim Quarz; Damascirung gewisser Flächen beim Adular und Quarz. B. | 66 | 196 |
| — — über die Bauweise des Feldspathes. R. | 67 | 97 |
| — — Kalkspath und Pseudomorphosen des Granats von Auerbach. B. | 67 | 452 |
| — — über missbildete Steinsalz-Krystalle. A. | 67 | 670 |
| — — über den Sericit. A. | 68 | 309 |
| — — der Bergkrystall von Carrara. A. | 68 | 822 |
| — — der Albit von Saas. B. | 69 | 342 |
| — — über die Bauweise des Feldspathes. II. Der schiefspaltende Feldspath. Albit und Periklin. R. | 69 | 749 |
| Schauroth, v.: Verzeichniss der Versteinerungen in Naturalien-Cabinet zu Coburg. R. | 65 | 755 |
| Scheerer: Feldspath aus Arendal, der über die Bildung der Perimorphosen oder Kernkrystalle Aufschluss zu geben scheint. R. | 60 | 350 |
| — — interessanter Barytspath-Krystall von Pribram. R. | 60 | 353 |
| — — Nebeneinander-Vorkommen von Thorit und Orangit. R. | 60 | 569 |
| — — über die Krystallform des Gadolinits. A. | 61 | 134 |
| — — Gold aus Californien. R. | 61 | 189 |
| — — Granat-Perimorphosen vom Lolen. R. | 61 | 333 |
| — — die grauen und rothen Gneisse. R. | 61 | 613 |
| — — die Gneisse des sächsischen Erzgebirges. R. | 63 | 108 |
| — — chemische und physische Veränderungen krystallinischer Silicat-Gesteine durch Naturprocesse. R. | 63 | 595 |
| — — über krystallinische Gesteine des Fassathals. A. | 64 | 385 |
| — — über Astrophyllit und sein Verhältniss zu Glimmer und Augit im Zirkonsyenit. R. | 64 | 845 |
| — — hat die Kieselsäure die Zusammensetzung $SiO_2$ oder $SiO_3$? R. | 65 | 89 |
| — — die Karlsbader Granite. R. | 65 | 244 |
| — — Beiträge zur Erklärung der Dolomit-Bildung mit besonderer Rücksicht auf die Dolomite Tyrols. A. | 66 | 1 |
| — — Vorkommen des Silbers zu Kongsberg. R. | 67 | 215 |
| — — über die chemische Constitution der Plutonite. R. | 67 | 480 |
| Schenk: Berichtigungen zu seiner Flora des Keupers und der rhätischen Formation. B. | 65 | 308 449 |
| — — die Flora der schwarzen Schiefer von Raibl. R. | 66 | 841 |
| — — über einige Pflanzen der Lettenkohle und des Schilfsandsteins. R. | 66 | 843 |
| Schill: die Umgebungen von Überlingen. R. | 61 | 224 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Schill. J.: geologische Beschreibung der Bäder Glotterthal und Suggenthal. R. | 63 | 596 |
| Schlönbach: das Bonebed und seine Lage gegen den sog. oberen Keuper-Sandstein im Hannöverschen. A. | 60 | 513 |
| Schlönbach, A.: Zähne in dem Bonebed bei Salzgitter; Microlestes, Trichodus, Xystrodus, Acrodus, Ceratodus; Bonebed zu Sehnde bei Hildesheim. B. | 60 | 694 |
| — — Beitrag zur genauen Niveau-Bestimmung des auf der Grenze zwischen Lias und Keuper im Hannöverschen und Braunschweigischen auftretenden Sandsteins. A. | 62 | 146 |
| — — Häufigkeit der Anodonta postera. B. | 63 | 184 |
| — — über den Gehalt an kohlensaurem Kalk im Plänerkalk bei Salzgitter und über ein interessantes Gebirgsprofil daselbst. B. | 69 | 725 |
| Schlönbach, U.: die Schichtenfolge des unteren und mittlen Lias in Norddeutschland. A. | 63 | 162 |
| — — Lias im n.w. Deutschland; monographische Bearbeitung der ausseralpinen Lias-Brachiopoden. B. | 64 | 213 |
| — — Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreide-Formation im n.w. Deutschland; über neue und wenig bekannte jurassische Ammoniten. R. | 65 | 889 |
| — — Parallelen zwischen dem oberen Pläner Norddeutschlands und den gleichalterigen Bildungen im Seinebecken. A. | 66 | 309 |
| — — norddeutsche Kreide-Brachiopoden. B. | 66 | 442 |
| — — Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreideformation im n.w. Deutschland. R. | 66 | 862 |
| — — Brachiopoden aus dem unteren Gault von Ahaus in Westphalen. R. | 66 | 863 |
| — — über einen Belemniten aus der alpinen Kreide von Grünbach. R. | 68 | 369 |
| — — über Aspidocaris ? liasica, eine neue Crustaceen-Form aus dem mittleren Lias. R. | 68 | 370 |
| — — über die norddeutschen Galeriten-Schichten und ihre Brachiopoden-Fauna. R. | 68 | 767 |
| — — über Belemnites rugifer aus dem eocänen Tuffe von Bolca. R. | 69 | 628 |
| — — Polyptychodon vom Dniester-Ufer bei Onuth in der Bukowina. R. | 69 | 512 |
| — — über seine geologische Aufnahme an der Roman-Banater Militärgrenze. B. | 69 | 729 |
| — — Beitrag zur Altersbestimmung des Grünsandes von Rothenfelde bei Osnabrück. A. | 69 | 808 |
| — — über Terebratula vulgaris. R. | 69 | 880 |
| Schlüter: die Macruren-Decapoden der Senon- und Cenoman-Bildungen Westphalens. R. | 63 | 756 |
| — — Schichten des Teutoburger Waldes bei Altenbecken. R. | 66 | 750 |
| — — Beitrag zur Kenntniss der jüngsten Ammoneen Norddeutschlands. 1. Ammoniten der Senonbildungen. R. | 69 | 122 |
| Schlumberger: Ceratodus runcinatus. R. | 63 | 381 |
| Schmidt, E E.: die Fisch-Zähne der Trias bei Jena. R. | 62 | 765 |
| — — Bos Palassi im alten Saal-Geschiebe bei Jena. A. | 63 | 541 |
| — — mikroskopische Formen des Wetterauer Zechsteins. B. | 63 | 565 |
| — — der Melaphyr von den Mombächler Höfen. R. | 63 | 840 |
| — — Cölestin der Thüringer Trias. R. | 64 | 242 |
| — — Schaumkalk von Lengefeld. R. | 64 | 720 |
| — — Gliederung der oberen Trias bei Erfurt. R. | 64 | 735 |
| — — über den Okenit. R. | 66 | 91 |
| — — über den Aragonit von Gross-Kamsdorf. R. | 66 | 93 |
| — — über den Psilomelan. R. | 66 | 94 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Schmid, E. E.: über die kleineren organischen Formen des Zechsteinkalkes in der Wetterau. A. | 1867 | 576 |
| — — Menschenschädel aus dem Süsswasserkalk von Greussen in Thüringen. R. | 68 | 248 |
| — — Vorkommen tertiärer Meeres-Conchylien bei Buttstädt. R. | 68 | 369 |
| — — Erlan im Fichtelgebirge. B. | 63 | 184 |
| Schmidt, Fr.: die sibirische Expedition der russischen geographischen Gesellschaft in d. J. 1859 bis 1867. R. | 69 | 606 |
| — — wissenschaftliche Resultate der Expedition zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuthcadavers. R. | 69 | 877 |
| Schmidt, Oscar: Murmelthierbau bei Gratz. B. | 66 | 437 |
| — — Murmelthiere bei Gratz. R. | 66 | 808 |
| Schneider, O.: geognostische Beschreibung des Löbauer Berges. R. | 67 | 868 |
| Schober: über den Polyhalit von Berchtesgaden. R. | 69 | 578 |
| Schönbein: Vorkommen des freien positiv-activen Sauerstoffes im Flussspath von Wölsendorf. R. | 62 | 487 |
| — — Antozonhaltigkeit des Wölsendorfer Flussspathes. R. | 63 | 716 |
| Schönichen: Galmei-Vorkommen an der Cantabrischen Küste. R. | 63 | 724 |
| — — die Schwefelkies-Lagerstätten der Provinz Huelva. R. | 64 | 85 |
| Schrauf, A.: über Wolnyn. R. | 61 | 190 |
| — — Bestimmung der optischen Constanten krystallisirter Körper. R | 61 | 693 |
| — — Monographie des Columbit. R | 62 | 86 |
| — — Erklärung des Vorkommens optisch zweiaxiger Substanzen im rhomboedrischen Systeme. R | 62 | 481 |
| — — Vergleichung von Zippe's Vanadit mit der Mineralspecies Descloizit. R. | 62 | 1000 |
| — — der Meteorit von Alessandria. R. | 63 | 589 |
| — — Analogien zwischen dem rhomboedrischen und prismatischen Krystall-System. B. | 65 | 46 |
| — — „Atlas der Kystallformen des Mineralreichs". R. | 65 | 329 |
| — — Ankündigung seines „Lehrbuches der physikalischen Mineralogie". B. | 65 | 831 |
| — — „Lehrbuch der physikalischen Mineralogie". R. | 66 | 97 |
| — — Gewichtsbestimmung des grossen Diamanten im kais. österreich. Schatz, genannt Florentiner. R. | 67 | 367 |
| Schröder, G.: Baryt- und Strontianerde-Gehalt im Chabasit. B. | 60 | 795 |
| Schrötter: Cäsium und Rubidium in der Salzsoole von Aussee. R. | 62 | 487 |
| — — Cäsium und Rubidium im Lithion-Glimmer von Zinnwald. R. | 62 | 599 |
| Schrüfer: die Jura-Formation in Franken. R. | 62 | 745 |
| — — die Lacunosa-Schichten von Würgau. R. | 63 | 758 |
| Schubert, v.: die wahre Erdgestalt. R. | 60 | 751 |
| — — Vorkommen des Ozokerits in Galizien. R. | 64 | 854 |
| Schülke: Verzeichniss der Versteinerungen aus der Umgegend Brilons. R. | 69 | 636 |
| Schütz: zur Kenntniss des Torfschweins. R. | 69 | 637 |
| Schütze: über einen Waldenburger Calamiten von ungewöhnlicher Grösse. B. | 68 | 590 |
| Schuster, Osk.: die alten Heidenschanzen Deutschlands mit specieller Beschreibung des Oberlausitzer Schanzensystems. R. | 69 | 762 |
| Schwanecke: Polyparien-Bildung durch Sauerstoffgas-Blasen in der Brunnensoole des unteren Kastens der alten Gradirung auf der Saline Rothenfelde bei Osnabrück. B. | 69 | 560 |
| Schwartz von Mohrenstern: über Rissoidae. R. | 60 | 374 |
| — — die Familie der Rissoiden. R. | 64 | 748 |
| Schwippel: Rossitz-Oslawaner Steinkohlen-Gebiet. R. | 65 | 359 |
| Scott: granitische Gesteine von Donegal. R. | 63 | 850 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Scudder: zoologische Verwandtschaft der ersten Spuren fossiler Neuropteren in Nordamerika. R. | 1867 | 875 |
| Seebach, v.: das „tellurische Eisen“ von Gross-Kamsdorf. R. | 61 | 584 |
| — — der Vulcan Izalco. R. | 66 | 469 |
| — — die Zoantharia perforata der paläozoischen Periode. R. | 66 | 869 |
| — — zur Kritik der Gattung Myophoria und ihrer triasischen Arten. R. | 68 | 123 |
| — — der Vulcan von Santorin und die Eruption von 1866. R. | 68 | 366 |
| — — zur Entwickelung der Kreideformation im Ohmgebirge. R. | 69 | 114 |
| Seeland: neues Bleiglanz-Vorkommen bei Baierdorf unfern Neumarkt in Steyermark. R. | 68 | 207 |
| Seeley: über Palaeocetus Sedgwicki. R. | 65 | 762 |
| — — über Plesiosaurus macropterus. R. | 65 | 763 |
| — — Torynocrinus aus dem oberen Grünsand von Hunstanton. R. | 66 | 639 |
| — — fossile Vögel aus dem Woodwardian-Museum. R. | 66 | 867 |
| — — Outline of a theory of the skeleton and the skull. R. | 68 | 115 |
| Sequenza: „Palaeontologia malacologica dei terreni terziarii del distretto di Messina“. R. | 64 | 874 |
| — — „Disquisitione palaeontologiche intorno ac Corallarii fossili della vocce terciarie del distretto di Messina“. R. | 64 | 875 |
| — — „Prima vicerche intorno ac Ricopodi fossili delle argille pleistoceniche dei intorni di Catania compite nell' anno 1862. R. | 64 | 875 |
| — — „Sulla formazione miocenica di Sicilia vicerche e considerazioni“. R. | 64 | 875 |
| — — Intorno alla Fluorina Siciliana. R. | 65 | 379 |
| — — „la formation zancléenne“. R. | 69 | 588 |
| Sella, Qu.: über die Geologie von Biella. R. | 66 | 255 |
| Selsky: Vulcan auf dem Eilande Chiachkotan. R. | 60 | 88 |
| Selwyn: Goldführende Drift und Quarzriffe von Victoria. R. | 67 | 235 |
| Semenow: die oberen devonischen Schichten des mittleren Russlands. R. | 65 | 355 |
| Senft, F.: die Humus-, Marsch-, Torf- und Limonit-Bildungen als Erzeugungsmittel neuer Erdrinde-Lagen. R. | 63 | 214 |
| — — „die krystallinischen Felsgemengtheile nach ihren mineralischen Eigenschaften, chemischen Bestandtheilen, Abarten, Umwandelungen, Associationen und Felsbildungsweisen“. R. | 68 | 208 |
| Serres, M. de: das steile Gestade am Mittelmeer bei Cette. R. | 60 | 233 |
| — — Notaeus laticaudus im Süsswassergebilde bei Narbonne. R. | 60 | 584 |
| Sexe: „Traces d'une époque glaciaire dans les environs du fjord de Hardanger“. R. | 67 | 621 |
| Sharpe: fossile Mollusken von Karoo Desert. R. | 61 | 638 |
| — — Secundär-Petrefacten vom Sunday-River. R. | 61 | 638 |
| Shepard: neuer Fundort von Lazulith in Georgia. R. | 61 | 191 |
| — — über amerikanische Meteoriten. R. | 62 | 196 |
| — — über den Syhedrit. R. | 66 | 92 |
| — — Scheelbleierz von den Gruben von Southampton. R. | 66 | 456 |
| — — Uwarowit aus Pennsylvanien. R. | 66 | 457 |
| — — Hagemannit, ein neues Mineral von Arksut-Fjord. R. | 67 | 193 |
| — — über Columbit von Northfield in Massachusetts. R. | 67 | 198 |
| — — neue Classification der Meteoriten. R. | 67 | 719 |
| — — Aquacreptit, ein neues Mineral von Chester. R. | 69 | 84 |
| — — neuer Fundort von Meteoreisen. | 69 | 580 |
| Shumard: Primordialzone in Texas und neue Arten derselben. R. | 62 | 763 |
| Siewert: Zusammensetzung des Kieserit. R. | 61 | 493 |
| Silliman, B.: über Dana's elementary geology. B. | 62 | 459 |
| — — über den Gaylussit im Nevada-Gebiete. R. | 67 | 211 |
| — — über die Existenz des Mastodon in den tiefliegenden Goldbauten von Californien. R. | 69 | 512 |
| Silva, da: Untersuchungen in Brasilien über die Richtung der Erdstösse. B. | 68 | 589 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Simler: Helvetan, eine neue Mineralspecies. R. | 1868 | 348 |
| Simon, C.: Kupfer- und Bleierz-Ablagerungen im Buntsandstein und Vogesensandstein der Gegend von Saarlouis. R. | 67 | 207 |
| Simonin: „la vie souterraine ou les mines et les mineurs". R. | 67 | 626 |
| Sismonda: Prodrome d'une flore tertiaire du Piémont. R. | 60 | 490 |
| — — Lias-Versteinerungen in Miocänschichten. R. | 60 | 839 |
| — — Gneiss mit einem Abdruck von Equisetum. R. | 66 | 127 |
| Smith: neue Meteoriten. R. | 61 | 328 |
| — — Meteorit von Harrison. R. | 61 | 584 |
| Smith, A.: Meteoreisen von Newstead in Roxburgshire. R. | 63 | 303 |
| Smith, Lawr.: über neue Meteoreisen. R. | 62 | 197 |
| — — die Smirgelgrube von Chester in Massachusetts. R. | 67 | 102 |
| — — über ein neues Meteoreisen, den Colorado-Meteoriten von Bussel-Gulch. R. | 67 | 365 |
| Söchting: Einschluss von Feldspath-Krystallen in Quarz-Krystallen. R. | 60 | 442 |
| Sohncke: über die Cohäsion des Steinsalzes in krystallographisch verschiedenen Richtungen. R. | 69 | 864 |
| Sommaruga, v.: Analyse von Grünstein-Trachyten von Schemnitz. R. | 66 | 604 |
| — — chemische Zusammensetzung des Wiener Tegels. R. | 66 | 604 |
| — — Zusammensetzung der Dacite. R. | 66 | 731 |
| — — chemische Studien über die Gesteine der ungarisch-siebenbürgischen Trachyt- und Basalt-Gebirge R. | 67 | 230 |
| Sorby: Anordnung der Mineralien in Feuer-Gesteinen und Bestimmung von Wärme und Druck, unter welchen dieselben entstanden sind. R. | 60 | 85 |
| — — mikroskopische Krystallstructur bei wässeriger und feueriger Entstehung. R. | 60 | 86 |
| — — künstliche Pseudomorphosen. R. | 61 | 697 |
| — — über die Anwendung des Mikroskops zum Studium der physikalischen Geologie. A. | 61 | 769 |
| — — Eindrücke in Kalkgeschieben. B. | 63 | 443 |
| Sorby, H. C.: über Kalkstein-Geschiebe mit Eindrücken. A. | 63 | 801 |
| Speyer, O.: die Tertiär-Fauna von Söllingen in Braunschweig. R. | 65 | 895 |
| — — die oberoligocänen Tertiärgebilde und deren Fauna im Fürstenthume Lippe-Detmold. R. | 67 | 508 |
| — — die Conchylien der Casseler Tertiärbildung. R. | 68 | 125 |
| Ssaftschenkow, v.: über den Paligorskit. R. | 63 | 199 |
| Stabile: Gesteine und deren Reste am Luganer See. R. | 61 | 726 |
| Stache: geologische Karte Istriens und der Quarnerischen Inseln. R. | 60 | 95 |
| — — geologische Verhältnisse der Quarnerischen Inseln. R. | 60 | 474 |
| — — neogene Ablagerungen Unter-Krains. R. | 60 | 725 |
| — — Nautilus lingulatus in Istrien. R. | 63 | 619 |
| — — Bau der Gebirge in Dalmatien. R. | 64 | 92 |
| — — Massen- u. Eruptivgesteine in Zjar, Malamachura- u. Suchigebirge. R. | 65 | 487 |
| — — die Foraminiferen der tertiären Mergel des Whaingaroa-Hafens. R. | 65 | 891 |
| — — geologisches Landschaftsbild von Siebenbürgen. R. | 67 | 226 |
| Städler: über die chemische Zusammensetzung des Lievrit. R. | 67 | 363 |
| Stapff: Vorkommen von Blende am Wetternsee. R. | 61 | 701 |
| Stapff: die Fahluner Erzlagerstätte. R. | 61 | 739 |
| Staring: die Mosasaurus- und Chelonier-Reste der Mastrichter Kreide. R. | 62 | 382 |
| — — geologische Karte der Niederlande. R. | 62 | 365 |
| Staub: die Pfahlbauten in den Schweizer Seen. R. | 65 | 103 |
| Steenstrup: Knochenbreccie am Adriatischen- und Mittelmeer. R. | 61 | 101 |
| Stein: Auftreten von Eisenerzen im Buntsandstein bei Aschaffenburg. R. | 62 | 111 |
| — — Vorkommen des Rotheisensteins in Berührung mit Porphyr bei Diez in Nassau. R. | 64 | 490 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Stein, A.: Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend. R. | 1866 | 716 |
| — — über den Phosphorit in Nassau. B. | 66 | 803 |
| — — über das Vorkommen von phosphorsaurem Kalk in der Lahn- und Dillgegend. R. | 69 | 489 |
| Steindachner: zur Kenntniss der fossilen Fische Österreichs. R. | 60 | 118 |
| — — dasselbe. II. R. | 60 | 376 |
| — — dasselbe. R. | 64 | 382 |
| Stelzner, A.: Beitrag zur Kenntniss des Versteinerungs-Zustandes der Crinoideen-Reste. A. | 64 | 565 |
| — — Auffindung der Terebratula diphya bei Losenstein. B. | 64 | 694 |
| — — Entstehung der Streifung an Krystallen. B. | 65 | 456 |
| — — die Granite von Geyer und Ehrenfriedersdorf. R. | 65 | 863 |
| — — die Zinnerz-Lagerstätten von Geyer. R. | 66 | 229 |
| — — über den eigenthümlichen Erhaltungs-Zustand einiger fossiler Echiniden. A. | 66 | 418 |
| — — Gesteine von Capverden. R. | 67 | 367 |
| — — die Bildung und die späteren Veränderungen des Faxekalkes; aus dem Dänischen des F. Johnstrup. A. | 67 | 543 |
| — — Pseudomorphosen von Markasit, Schwefelkies und lichtem Rothgültigerz nach Glaserz. R. | 69 | 480 |
| — — über die mikroskopischen Flüssigkeits-Einschlüsse in Mineralien und Gesteinen. R. | 69 | 492 |
| — — Porphyr-Vorkommen im Chemnitzthal. R. | 69 | 586 |
| — — Scheelit-Krystalle von Schwarzenberg. R. | 69 | 745 |
| Stevens: das takonische System. R. | 61 | 865 |
| Stiehler: über Credneria. B. | 60 | 218 |
| — — Liebespfeile in fossilen Helix-Schalen. B. | 61 | 676 |
| — — Synopsis der Pflanzenkunde der Vorwelt. I. R. | 61 | 869 |
| — — Stand unserer jetzigen Kenntnisse von den Monokotyledonen der Vorwelt. A. | 62 | 49 |
| — — die Bromeliaceen der Vorwelt. R. | 63 | 762 |
| — — die Moose, Flechten und Pilze der Vorwelt. R. | 63 | 762 |
| Stoddart: die Mikrozoenbank im Kohlenkalk bei Clifton unfern Bristol. R. | 62 | 1008 |
| Stöhr, E.: Findlinge von Gneiss am Battenberg in Rheinbayern. B. | 64 | 50 |
| — — das Kupfererz-Vorkommen in Singhbum, Bengalen. A. | 64 | 129 |
| — — der erloschene Vulcan Ringgit in Ostjava und sein angeblicher Ausbrach 1856. A. | 64 | 436 |
| — — die Kupfererze an der Mürtschenalp. R. | 65 | 351 |
| — — die Basaltklippe Batu dodol an Java's Ostküste und ihre Hebung in der Jetztzeit. A. | 65 | 641 |
| — — die vulcanischen Gebilde im Hegau. B. | 66 | 72 |
| — — das Pyropissit-Vorkommen in den Braunkohlen bei Weissenfels und Zeitz. A. | 67 | 403 |
| — — „il vulcano Tenggher della Giave orientale". R. | 67 | 869 |
| — — „Schiarimenti intorno alla carta delle salse e della localita oleifere di monte Gibio". R. | 67 | 870 |
| — — Argille scagliose im Apennin; über den erloschenen Vulcan Ringgit auf Ostjava. B. | 67 | 830 |
| Stolba: Analyse eines in den böhmischen Steinkohlen vorkommenden Minerals. R. | 65 | 621 |
| Stoliczka: Süsswasserbildung in der Kreide-Formation der n.ö Alpen. R. | 60 | 855 |
| — — eigenthümliches Auftreten krystallinischer Schiefer im s.w. Ungarn. R. | 62 | 199 |
| — — oligocäne Bryozoen von Latdorf. R. | 63 | 379 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Stoliczka: die Cerithien- und Ingersdorfer Schichten des ungarischen Tertiärbeckens. R. | 1863 | 380 |
| — — kritische Bemerkungen zu A. Römer's Beschreibung der norddeutschen tertiären Polyparien. R. | 64 | 340 |
| — — die fossilen Cephalopoden in der Kreide des s. Indien. R. | 64 | 505 |
| — — fossile Cephalopoden der Kreide im s. Indien. R. | 65 | 106 |
| — — fossile Bryozoen aus dem tertiären Grünsand der Orakei-Bay bei Auckland. R. | 65 | 366 |
| — — die fossilen Cephalopoden in der Kreideformation des s. Indien. R. | 65 | 888 |
| — — Revision der Gasteropoden in den Gosau-Schichten der Ostalpen. R. | 66 | 246 |
| — — Charakter der Cephalopoden in den südindischen Kreidegesteinen. R. | 66 | 492 |
| — — Durchschnitte durch das Himalaya-Gebirge. R. | 66 | 616 |
| — — geologische Beobachtungen während eines Besuches verschiedener Provinzen im w. Thibet. R. | 67 | 492 |
| — — die Gasteropoden der Kreide-Formation des s. Indien. R. | 68 | 235 |
| — — „the gasteropoda of the cretaceous rocks of the southern India. R. | 69 | 630 |
| — — über die Cephalopoden-Fauna der südindischen Kreideformation. R. | 69 | 631 |
| Stoppani: obertriasische Acephalen von Esino. R. | 60 | 762 |
| — — Cephalopoden von Esino. R. | 60 | 763 |
| — — Amorphozoen von Esino. R. | 61 | 368 |
| — — Echiniden aus Schichten der Avicula contorta und aus der astischen Formation. R. | 61 | 713 |
| — — sulla carta geologica dei diutorni del Monte Bianco dal A. Favre. R. | 64 | 502 |
| — — „Sulla concordanza geologica tra i due versanti delle Alpi". R. | 64 | 764 |
| — — „Prima ricerca di abitationi lacustri del laghi di Lombardia. R. | 64 | 765 |
| — — Pfahlbauten am See von Varese. R. | 65 | 380 |
| — — sulle antiche abitazioni lacustri del lago di Garda. R. | 65 | 501 |
| — — grosse Bivalven an den Grenzen der Contorta-Schichten. R. | 65 | 766 |
| — — „Paléontologie lombarde". IV. R. | 69 | 126 |
| Storch: Entstehung der Wetterauer Braunkohlenlager. B. | 65 | 450 |
| Streng, A.: die Quarz führenden Porphyre des Harzes. I. Die rothen Quarz führenden Porphyre. A. | 60 | 129 |
| — — dasselbe. II. Die grauen Porphyre. A. | 60 | 257 |
| — — über den Gabbro und den sogenannten Schillerfels des Harzes. I. Einleitung und Schillerfels enthaltend. A. | 62 | 513 |
| — — dasselbe. II. Gabbro. A. | 62 | 933 |
| — — über den Serpentinfels und Gabbro von Neurode in Schlesien. A | 64 | 257 |
| — — über die Zusammensetzung einiger Silicate mit besonderer Berücksichtigung der polymeren Isomorphie. A. | 65 | 411 |
| — — über die Diorite und Granite des Kyffhäuser-Gebirges. A. 67 | 513 | 641 |
| Strickland: dem Dodo verwandte Knochen auf Rodriguez. R. | 61 | 128 |
| Strobel: Terramara-Lager und Pfahlbauten von Parma. R. | 66 | 253 |
| Strobell: ein Pferd mit gespaltenem Hufe. R. | 68 | 254 |
| Strombeck, v.: Gault und Gargas-Mergel in NW.-Deutschland. R. | 62 | 97 |
| — — die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. R. | 63 | 865 |
| — — die bei Helmstädt aufgefundenen Schichten sind oligocän. B. | 64 | 202 |
| Stromeyer, A.: Zerlegung der sog. Bentheimer Kohle. R. | 61 | 189 |
| Strüver, J.: fossile Fische aus dem Keupersandstein von Coburg. R. | 65 | 506 |
| — — Mineralien im Granit von Baveno. R. | 67 | 107 |
| — — über Apatit aus dem Alathale. R. | 68 | 604 |
| — — über Granat von Cantoira im Thale von Lanzo. R. | 68 | 605 |
| — — Axinit von Baveno. R. | 68 | 609 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Strüver, J.: Sellait, ein neues Mineral. R. | 1869 | 370 |
| — — ein neues Zwillings-Gesetz am Anorthit. R. | 69 | 371 |
| Studer, B.: über die natürliche Lage von Bern. R. | 60 | 241 |
| — — geologische Beobachtungen in den Alpen des Thuner See's. R. | 63 | 759 |
| — — Ursprung der Schweizer Seen. R. | 64 | 725 |
| — — Geologisches aus dem Emmenthal. R. | 65 | 869 |
| — — zur Geologie der Berner Alpen. A. | 66 | 688 |
| — — Besteigung des Matterhorns durch H. Giordano. B. | 69 | 63 |
| Stübel, A.: Geologisches über die Inseln des grünen Vorgebirges. B. | 63 | 561 |
| — — Geologisches über Madeira. B. | 63 | 811 |
| — — über Reliefkarten. R. | 68 | 101 |
| Stur: obere Kreide und eocäne Ablagerungen im Waagthal. R. | 60 | 91 |
| — — Klippenkalk im Waagthale. R. | 60 | 450 |
| — — Kreide um Lemberg. R. | 60 | 605 |
| — — geologische Aufnahme N.-Galiziens. R. | 60 | 589 |
| — — Congerien- und Cerithien-Schichten bei Terlink in Ungarn. R. | 60 | 857 |
| — — Cerithien-Schichten bei Sereth in der Bukowina. R. | 60 | 858 |
| — — Steinkohlen-Flora von Rakonitz. R. | 61 | 212 |
| — — fossile Liaspflanzen aus Siebenbürgen. R. | 61 | 217 |
| — — Alter der Kohlen führenden Sandsteine in den n.ö. Alpen. R. | 64 | 747 |
| — — fossile Pflanzen aus der Steinkohle der Rossitzer Gegend. R. | 66 | 635 |
| — — zur Kenntniss der Flora der Süsswasserquarze, der Congerien- und Cerithien-Schichten im Wiener- und ungarischen Becken. R. | 67 | 763 |
| — — über Schützia Helmhackeri aus dem Rothliegenden von Zbejsow. R. | 68 | 110 |
| Suchsland und Valentin: Untersuchung der heissen Mineralquelle zum goldnen Brunn in Wiesbaden. R. | 60 | 353 |
| Süss: fossile Zustände der organischen Reste im Leithakalke. R. | 60 | 238 |
| — — Waldheimia Stoppanii. R. | 60 | 763 |
| — — die Wohnsitze der fossilen Brachiopoden. R. | 60 | 860 |
| — — numerische Übersicht der Klasse der Brachiopoden. A. | 61 | 154 |
| — — Zeuschner's Brachiopoden des Stramberger Kalkes. B. | 61 | 167 |
| — — Brachiopoden der Stramberger Schichten. R. | 61 | 246 |
| — — secundäre Brachiopoden aus Portugal. R. | 61 | 352 |
| — — über Bronn's Ansicht vom Entwickelungs-Gange des Thierreiches. R. | 61 | 364 |
| — — Alter der Tertiärschichten im Wiener Becken. R. | 61 | 504 |
| — — triadische Bildungen in dem Rajhoti-Pass, Indien. R. | 63 | 498 |
| — — neue Fundorte für Hyotherium und Anthracotherium. R. | 63 | 619 |
| — — über den Lauf der Donau. R. | 64 | 372 |
| — — Verschiedenheit und Aufeinanderfolge der tertiären Landfaunen bei Wien. R. | 64 | 381 |
| — — der Staub Wiens und der Wiener Sandstein. R. | 65 | 748 |
| — — zur Classification der Ammoniten. R. | 65 | 765 |
| — — die Cephalopoden-Sippe Acanthoteuthis. R. | 65 | 890 |
| — — Niederlassungen einer vorchristlichen Völkerschaft in Niederösterreich. R. | 66 | 503 |
| — — über den Charakter der österreichischen Tertiärablagerungen. R. | 67 | 117 |
| — — über den Löss. R. | 67 | 119 |
| — — Bedeutung der sog. brackischen Stufe oder der Cerithien-Schichten. R. | 67 | 245 |
| — — jurassische Geschiebe aus der Gegend von Stettin und Königsberg. B. | 67 | 342 |
| — — fossile Wirbelthiere von Eibiswald in Steyermark. R. | 67 | 503 |
| — — die Äquivalente des Rothliegenden in den Südalpen. B. | 68 | 329 |
| — — neue Reste von *Squalodon* aus Linz. R. | 69 | 512 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Süss, E. und v. Mojsisovics: Gliederung der Trias- und Jura-Bildungen in den ö. Alpen. R. | 1869 | 595 |
| Sullivan, W. und J. Oreilly: die Zinkerze in der spanischen Provinz Santander. R. | 64 | 849 |
| Swan: Geologie der Prinzen-Inseln im See von Marmora. R. | 69 | 108 |
| Szabo: zur geologischen Detailkarte des Grenz-Gebietes der Neograder und Pesther Comitate. R. | 60 | 732 |
| Szymanski, K.: Analyse eines Keuper-Dolomits von Zawierzie in Polen. B. | 65 | 601 |
| — — Meteoritenfall bei Pultusk am 30. Jan. 1868. B. | 68 | 326 |


## T.


| | | |
|---|---|---|
| Tamamschiantz: das Mineralien- und Gesteins-Verzeichniss von Georgien, Armenien und von der Kaukasischen Hauptkette. B. | 68 | 583 |
| Tamnau: Hohlkugeln und Mandeln von Mettweiler. R. | 60 | 234 |
| — — über Scheibenquarz. R. | 62 | 195 |
| Tantscher: Charakter der Galmei-Lagerstätte in Oberschlesien. R. | 64 | 482 |
| Tasche: Eisenkies auf poröser Basaltlava des Vogelsgebirges. R. | 61 | 700 |
| — — geologische Specialkarte von Schotten. R. | 61 | 93 |
| — — Beobachtungen auf einer Reise durch Schweden. B. | 62 | 466 |
| — — über die geologischen Aufnahmen Schwedens. A. | 63 | 129 |
| — — dasselbe. A. | 64 | 15 |
| Tate: über einige secundäre Fossilien von Südafrika. R. | 69 | 119 |
| Taylor: Clayit aus Peru; Glaserit der Chichincha-Inseln. R. | 61 | 185 |
| Temple: die Sodaseen in Ungarn. R. | 65 | 629 |
| Terquem: Foraminiferen im unteren Lias von Metz. B. | 60 | 794 |
| — — der untere Lias der Meurthe und Mosel. R. | 63 | 213 |
| Terreil: Analysen von Felsarten der Tarentaise. R. | 62 | 184 |
| Theobald, G.: das Bündner Münsterthal. R. | 64 | 110 |
| Thomson, Z.: Beluga Vermontana. R. | 60 | 255 |
| — — über Pseudosteatit. R. | 63 | 200 |
| Thornton, E.: Bericht über die Existenz eines grossen Kohlenfeldes in der Provinz Sta. Catharina in Brasilien. R. | 69 | 870 |
| Trautschold: die Juraschicht zu Dorogomilof bei Moskau. R. | 60 | 583 |
| — — die Organismen des Moskauer Jura. B. | 61 | 63 |
| — — Lagerung der Steinkohlen in Russland; Petrefacten der Moskauer Jura-Schicht. B. | 61 | 463 |
| — — Juraschichten von Galiowa. R. | 61 | 706 |
| — — Jura-Formation am Oka-Ufer; tieferer Rückzug der Wasser in's Innere der Erde. B. | 61 | 835 |
| — — der Moskauer Jura verglichen mit dem westeuropäischen. R. | 62 | 363 |
| — — die Juraschicht von Miowniki bei Moskau. R. | 62 | 757 |
| — — glanzkörniger brauner Sandstein bei Dimitrijewo-Gora an der Oka. R. | 63 | 620 |
| — — Zeichen der permischen Zeit im Gouv. Moskau. R. | 63 | 620 |
| — — „Nomenclator palaeontologicus der jurassischen Formation in Russland. R. | 63 | 870 |
| — — jurassische Fossilien von Indersk. R. | 64 | 506 |
| — — Vorkommen der Kohlen am Waldai. R. | 66 | 238 |
| — — Inoceramen-Thon von Simbirsk. R. | 66 | 238 |
| — — zur Fauna des russischen Jura. R. | 66 | 639 |
| — — einige Crinoideen und andere Thierreste des jüngeren Bergkalkes im Gouv. Moskau. R. | 69 | 255 |
| — — der südöstliche Theil des Gouv. Moskau. R. | 69 | 758 |
| Trinker: Quecksilber-Vorkommen zu Valalta im Venetianischen. R. | 60 | 355 |
| Tristram: Geologie des todten Meeres. R. | 66 | 109 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Troschel: Pseudopus-Arten aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge. R. | 1860 | 500 |
| — — fossile Schlange von Rott im Siebengebirge. R. | 62 | 754 |
| — — Übersicht der fossilen Thiere in der Braunkohle des Siebengebirges. R. | 62 | 895 |
| — — Murmelthier aus dem Löss. R. | 63 | 383 |
| — — Mastodon-Zahn von Alfter. R. | 64 | 751 |
| Truqui: Ersteigung des Popocatepetl, Sept. 1856. R. | 60 | 611 |
| Tschermak, G.: Untersuchung des Cancrinit von Ditro in Siebenbürgen. R. | 62 | 727 |
| — — Analyse des rhombischen Vanadits von Kappel in Kärnthen. R. | 62 | 728 |
| — — über den weissen Granat von Elba; Resultate seiner Untersuchungen zwischen Dichte, Krystallform und chemischer Beschaffenheit. B. | 62 | 867 |
| — — über einige Pseudomorphosen. R. | 63 | 363 |
| — — der Astrophyllit von Barkevig. A. | 63 | 553 |
| — — Entstehungsfolge der Mineralien in einigen Graniten. R. | 63 | 590 |
| — — die Krystallform des Triphylins. R. | 63 | 828 |
| — — Beitrag zur Geschichte der Mandelsteine. R. | 63 | 846 |
| — — einige Pseudomorphosen. R. | 64 | 72 |
| — — Neubildung im Basaltschutt bei Auerbach an der Bergstrasse. R. | 64 | 94 |
| — — einige Pseudomorphosen. R. | 65 | 84 |
| — — die Feldspath-Gruppe. R. | 65 | 474 |
| — — über Brochantit. R. | 65 | 481 |
| — — über Devillin. R. | 65 | 621 |
| — — Olivin in Augitporphyr und Melaphyr. R. | 65 | 859 |
| — — Mineralien aus dem w. Himalaja. B. | 65 | 837 |
| — — Gabbro am Wolfgangsee. R. | 66 | 366 |
| — — der Raibler Porphyr. R. | 66 | 463 |
| — — der Alloklas und sog. Glaukodot von Oravicza. R. | 66 | 594 |
| — — über den Silberkies. R. | 66 | 726 |
| — — Felsarten von ungewöhnlicher Zusammensetzung bei Teschen und Neutitschein. R. | 66 | 728 |
| — — einige Pseudomorphosen. R. | 66 | 827 |
| — — über den Silberkies. R. | 67 | 199 |
| — — über die isomorphe Reihe Glaukodot, Danait, Arsenikkies. R. | 67 | 477 |
| — — Quarzporphyrit aus dem Val San Pellegrino. R. | 67 | 485 |
| — — Quarz führende Plagioklas-Gesteine. R. | 67 | 615 |
| — — über die Kobalt führenden Arsenkiese Glaukodot und Danait. R. | 67 | 712 |
| — — Beobachtungen über die Verbreitung des Olivin in den Felsarten. R. | 68 | 88 |
| — — über Serpentinbildung. R. | 68 | 215 |
| — — Mineral-Vorkommnisse von Joachimsthal. R. | 68 | 349 |
| — — über Voltait von Kremnitz. R. | 68 | 351 |
| — — über Sylvin von Kalusz in Galizien. R. | 68 | 484 |
| — — über Damourit, als Umwandelungs-Product. R. | 69 | 482 |
| — — über die mikroskopische Unterscheidung der Mineralien aus der Augit-, Amphibol- und Biotit-Gruppe. R. | 69 | 752 |
| — — über die chemische Zusammensetzung der Feldspathe, welche Natron und Kalkerde enthalten. R. | 69 | 753 |
| — — die Porphyr-Gesteine Österreichs aus der mittleren geologischen Epoche. R. | 69 | 866 |
| Tschihatscheff, P. v.: Ausbruch des Vesuv. B. | 62 | 69 |
| Turley: Bitterspath bei Offenburg. R. | 61 | 585 |
| — — Salzausblühen im Torf. R. | 64 | 854 |
| — — der Zinkbergbau der Altenberger Gesellschaft bei Ammeberg in Schweden. R. | 67 | 619 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Tyler: Rastit, Marcylit und Monrolit. R. | 1866 | 453 |
| Tylor, A.: das Amiens-Geröll. A. | 69 | 130 |


## U.


| | | |
|---|---|---|
| Ubaghs: Bryozoen von Mastricht. R. | 66 | 749 |
| Ulrich, G.: Kupferbleiglanz aus den Goldfeldern von Victoria. R. | 60 | 79 |
| — — Gediegen Silber und Kupfer ebendaher. | 60 | 79 |
| — — Mineral-Vorkommnisse bei Gosslar. R. | 61 | 585 |
| Unger: der versteinerte Wald bei Cairo. R. | 60 | 597 |
| — — Eisenkiesbergbau auf Wollin. R. | 61 | 860 |
| — — Pflanzenreste aus Neuseeland. R. | 65 | 890 |
| — — über fossile Hölzer aus Abyssinien. R. | 66 | 765 |


## V.


| | | |
|---|---|---|
| Valenciennes: Ichthyosaurus Cuvieri aus dem Kimmeridgethon von Havre. R. | 62 | 756 |
| — — Ichthyosaurus Normanniae von da. R. | 62 | 757 |
| — — bei Poligny im Keuper entdeckter Dinosaurier. R. | 63 | 233 |
| Veitch: vulcanisches Phänomen auf Manilla. R. | 62 | 609 |
| Verneuil, de: neue Lynchus-Arten. R. | 64 | 115 |
| — — Feuersteingeräthe bei Madrid. R. | 64 | 118 |
| — — über seine geologische Karte von Spanien. B. | 65 | 212 |
| — — „carte géologique de l'Espagne et du Portugal". R. | 65 | 240 |
| — — über die durch Tschihatscheff bei Constantinopel gesammelten Versteinerungen. R. | 65 | 247 |
| — — die ausserordentliche Versammlung der geologischen Gesellschaft in Paris. B. | 67 | 344 |
| Villa: sulle Torbe della Brianza. R. | 65 | 254 |
| Villa, B.: die Gesteine der Umgebung von Morbegno. R. | 68 | 869 |
| Ville: brennbares Mineral zwischen Ténès und Orleansville. R. | 60 | 79 |
| — — Steinsalz in Algier. R. | 60 | 104 |
| Visiani: Flora der Tertiärschichten von Novale. R. | 61 | 867 |
| Visani, de: „sopra una nuova specie di palma fossile. R. | 69 | 125 |
| Fr. Vivenot: Quarz-Krystalle eingeschlossen in Chemnitzia. R. | 69 | 234 |
| Vogelgesang: geognostisch-bergmännische Beschreibung des Kinzigthaler Bergbaues R. | 66 | 231 |
| — — neue Aufschlüsse durch den Bau der Eisenbahn von Engen nach Donaueschingen. B. | 68 | 321 |
| Vogelsang, H.: zur Theorie der Gangbildungen. A. | 63 | 30 |
| — — der Kugelporphyr auf Corsica. R. | 63 | 102 |
| — — über den Kugeldiorit auf Corsica. R. | 63 | 207 |
| — — mikroskopische Structur der Schlacken und Beziehungen zur Genesis der krystallinischen Gesteine. R. | 64 | 494 |
| — — die Vulcane der Eifel. R. | 65 | 339 |
| — — über den farbigen Labradorit von der Küste von Labrador. R. | 68 | 480 |
| — — über die chemische Natur von Flüssigkeiten in Quarz-Krystallen. R. | 69 | 747 |
| Vohl: Zusammensetzung eines Eisenspaths von Linz. R. | 65 | 328 |
| Volborth, v.: Vorkommen von Conodonten in England und Schweden. B. | 61 | 464 |
| — — die mit platten Rumpfgliedern versehenen russischen Trilobiten. R. | 63 | 632 |
| — — neue Esthländische Illänen. R | 65 | 365 |
| — — Baerocrinus, neue Crinoiden-Gattung aus Esthland. R. | 66 | 248 |
| — — über Cystoblastus, eine neue Gattung von Crinoideen. R. | 69 | 124 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Volborth, v.: über Schmidtia und Acritis. R. | 1869 | 633 |
| Volger: Peleosteus primaevus, der älteste Knochenfisch. R. | 60 | 758 |
| — — Adular-Feldspath als Mörtel und Gangart in schüttigen Felsmassen des sächsischen Kohlengebirges. A. | 61 | 1 |
| — — Manganerze des Lahnthales. R. | 61 | 336 |
| — — Umwandelung des Dolomit in Topfstein. B. | 64 | 339 |
| Vortisch: nordische Geschiebe. R. | 64 | 98 |
| — — Blaueisenerde bei Satow in Mecklenburg. R. | 64 | 855 |


## W.


| | | |
|---|---|---|
| Waage, P.: über die Krystall-Form des Gadolinit. A. | 67 | 696 |
| Waagen: Versuch einer Classification der Schichten des oberen Jura. R. | 65 | 889 |
| — — Nachtrag zu seiner Schrift „die Classification der Schichten des oberen Jura. B. | 66 | 570 |
| Wagener, R.: jurassische Bildungen am Teutoburger Wald. R. | 65 | 746 |
| Wagner, A.: über die Griffelzähner oder Stylodontes. R. | 60 | 245 |
| — — ein fossiler Fisch im Juradolomit. R. | 60 | 254 |
| — — Fischsippen Sauropsis, Pachycormus. R. | 60 | 501 |
| — — Thierfährten im Buntsandstein von Fulda bis Würzburg. B. | 60 | 693 |
| — — Vergleichung der lithographischen Schiefer von Cirin und Franken. R. | 61 | 113 |
| — — neue Tertiär-Fische Südbayerns; Fisch- und Saurier-Arten dem unteren und oberen Lias gemeinsam. R. | 61 | 246 |
| — — verschiedene Ichthyosaurus-Arten im unteren und oberen Lias. R. | 61 | 375 |
| — — die nackten Dintenfische im lithographischen Schiefer und Lias des süddeutschen Juragebirges. R. | 62 | 248 |
| — — Lophiodon communis in den Bohnerz-Gruben zu Heidenheim. R. | 62 | 895 |
| — — Vorkommen von Hatchettin zu Wettin. A. | 64 | 687 |
| Wagner, Mor.: die Darwin'sche Theorie und das Migrationsgesetz der Organismen. R. | 69 | 639 |
| Walker: fossile Fische von Dura Den. R. | 63 | 256 |
| — — über eine phosphatische Ablagerung im unteren Grünsand von Bedfordshire. R. | 67 | 622 |
| — — neue Terebratuliden von Upware. R. | 68 | 246 |
| — — über die Brachiopoden in dem unteren Grünsand von Upware. R. | 68 | 873 |
| Wall: Geologie von Venezuela und Trinidad. R. | 60 | 859 |
| Wangenheim v. Qualen: Ursache der Versandungen der Wolga. R. | 61 | 228 |
| — — Lebensbilder aus Russland. R. | 64 | 110 |
| Wankel: Fauna der Mährischen Höhlen. R. | 61 | 384 |
| Warnsdorff, v.: über die geologischen Verhältnisse des Kurortes Kissingen. A. | 64 | 807 |
| Wartha: über den Pennin. R. | 67 | 362 |
| — — chemische Untersuchung einiger Gesteine, fossilen Holzes und Kohle von der arktischen Zone. R. | 67 | 736 |
| — — über die Formulirung der Silicate. R. | 69 | 484 |
| Webský: Uranophan. R. | 60 | 810 |
| — — Monazit bei Schreiberhau in Schlesien. R. | 67 | 106 |
| — — über die Krystallform des Kryoliths. A. | 67 | 822 |
| — — Sarkopsid, ein neues Mineral aus Schlesien. R. | 68 | 606 |
| — — Kochelit, ein neues Mineral aus Schlesien. R. | 68 | 607 |
| — — „die Mineral-Species nach den für das specifische Gewicht derselben angenommenen und gefundenen Werthen. R. | 68 | 752 |
| Wedding: über Beauxit. R. | 63 | 723 |
| — — Vorkommen von Eisenerzen in England. R. | 63 | 847 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Weekes: Braunkohlen-Formation zu Auckland auf Neuseeland. R. | 1860 | 745 |
| Weil: neues Platinerz aus Californien. R. | 60 | 354 |
| Weinkauff, H. C.: Septarien-Thon im Mainzer Becken. A. | 60 | 177 |
| — — Beitrag zur Kenntniss der Tertiär-Bildungen in der hessischen Pfalz und den angrenzenden preussischen und bayerischen Bezirken. A. | 65 | 171 |
| — — die Conchylien des Mittelmeeres, ihre geographische und geologische Bedeutung. R. | 68 | 636 |
| Weinland: Westindische Inselbildungen durch Rhizopora Mangle. B. | 60 | 213 |
| Weisbach, A.: Tabelle zur Bestimmung der Mineralien nach äusseren Eigenschaften. R. | 66 | 595 |
| — — über den Kupferwismuthglanz. R. | 67 | 99 |
| — — Vorkommen von gediegenem Antimon im Canada. R. | 67 | 609 |
| Weiss, E.: ein Megaphytum aus der Steinkohlenformation Saarbrückens. R. | 63 | 689 |
| — — über das Alter eines Theils des Saarbrücker-Pfälzer Kohlengebirges. A. | 63 | 379 |
| — — über den Schillerspath von Todtmoos. R. | 63 | 719 |
| — — über Voltzia und andere Pflanzen des Buntsandsteins zwischen der unteren Saar und dem Rhein. A. | 64 | 278 |
| — — geologische Karte des Saarbrücker Kohlengebirges. A. | 64 | 655 |
| — — Vorkommen organischer Reste im Saarbrückischen. B. | 64 | 694 |
| — — Leitfische des Rothliegenden. R. | 65 | 377 |
| — — Stellung der Saarbrückisch-Pfälzischen Schichten zur Steinkohlenformation und dem unteren Rothliegenden. B. | 65 | 843 |
| — — kündigt seine preisgekrönte Abhandlung, „Beiträge zur Kenntniss der Feldspath-Bildung“, an. B. | 67 | 179 |
| — — Beiträge zur Kenntniss der Feldspath-Bildung und Anwendung auf die Entstehung von Quarztrachyt und Quarzporphyr. R. | 67 | 216 |
| — — eingewachsene Feldspath-Zwillinge nach dem Bavenoer Gesetz. R. | 67 | 362 |
| — — über eine neue Anthracosia in der Steinkohlen-Formation. A. | 67 | 680 |
| — — Stylolithen-Bildung in gegenwärtiger Zeit. B. | 68 | 728 |
| — — über die Gliederung der Trias in den Umgebungen von Saarbrücken B. | 69 | 215 |
| — — Begründung von 5 geognostischen Abtheilungen in den Steinkohlen führenden Schichten des Saar-Rheingebietes. R. | 69 | 598 |
| — — über den Meteoriten-Fall bei Krähenberg. B. | 69 | 727 |
| Weiss, Fr.: die Gesetze der Satelliten-Bildung. R. | 60 | 595 |
| Weld: Dinornis-Ei und Menschenschädel beisammen gefunden in Neuseeland. R. | 60 | 500 |
| Werner, G.: über die Bedeutung der Krystall-Flächen-Umrisse und ihre Beziehungen zu den Symmetrie-Verhältnissen der Krystallsysteme. A. | 67 | 129 |
| — — Varietäten des Kalkspath in Württemberg. R. | 67 | 718 |
| Werther: chemische Untersuchung der Incrustation einer Bleikugel, gefunden im Magen eines Elenns. R. | 64 | 80 |
| Whatley: Saurier im rothen Sandsteine Ost-Pennsylvaniens. R. | 63 | 122 |
| White: mikroskopische Organismen in Hornstein-Knollen paläozoischer Gesteine. R. | 63 | 502 |
| — — geologische Skizze des s. Jowa. R. | 68 | 221 |
| White und St. John: „Descriptions of new subcarboniferous and coal measure fossils collected upon the geological survey of Jowa“. R. | 68 | 876 |
| Whiteaker: subäriale Denudation. R. | 69 | 602 |
| Wihteaves: Coralline-Oolith bei Oxford. R. | 63 | 122 |
| Whitney: „Report of a survey of the upper Mississippi-lead region“. R. | 63 | 849 |
| — — die Mineralien der Bleiregion am Mississippi. R. | 64 | 240 |
| — — „geological survey of California“. R. | 66 | 610 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Whitney: „geological survey of California. Paläontology". R. 1866 | 625 | 741 |
| — — dasselbe. II. Paläontology. R. | 67 | 251 |
| — — in Californien sind bis jetzt noch keine silurischen Fossilien gefunden worden; die ältesten gehören der Kohlenformation an. B. | 68 | 188 |
| Whyat-Edgell: Lichas-Art aus den Llandeilo-Flags. R. | 66 | 638 |
| Wibel, F.: „das gediegene Kupfer und das Rothkupfererz". R. | 64 | 855 |
| — — Umwandelungs-Producte alter Bronzen. B. | 65 | 213 |
| — — dasselbe. A. | 65 | 400 |
| — — Resultate seiner Schrift „die Cultur der Bronze-Zeit in Nord- und Mitteleuropa. B. | 65 | 723 |
| — — die Kultur der Bronze-Zeit. R. | 65 | 871 |
| Wicke: neuer Fundort von Cölestin. R. | 61 | 696 |
| — — über die Phosphat-Knollen im Eisenerze von Grossbölten und Adenstedt. R. | 67 | 210 |
| — — die Phosphorit-Lagerstätten in Nassau. R. | 69 | 88 |
| Wiik: geologische Verhältnisse der Gegend von Helsingfors. B. | 68 | 183 |
| — — Mineralogie und Geologie der Gegend von Helsingsfors. B. | 69 | 355 |
| Williams: Bathvillit, ein neues Mineral. R. | 65 | 84 |
| Williamson: über eine Ciratherium-Fährte aus dem Keupersandstein von Daresbury in Cheshire. R. | 67 | 504 |
| Winchell: Vorkommen des Steinsalzes in Michigan. R. | 63 | 372 |
| — — über Fossilien aus der Marshall- und Huron-Gruppe von Michigan. R. | 64 | 252 |
| — — Versteinerungen aus dem Potsdam-Sandstein von Michigan. R. | 64 | 867 |
| — — Ölformation in Michigan. R. | 66 | 237 |
| — — das Petroleum in Westcanada. R. | 66 | 475 |
| — — geological map of Michigan. R. | 68 | 99 |
| Winchell und Marcy: die im Niagarakalk von Chicago gesammelten Versteinerungen; Beschreibung neuer Arten. R. | 68 | 242 |
| Winkler, G.: die Vilser Schichten bei Berchtesgaden. B. | 63 | 809 |
| — — „Island". R. | 64 | 99 |
| — — Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen. A. | 64 | 295 |
| — — Geologisches aus Tyrol. B. | 65 | 41 |
| — — Ankündigung seiner „Versteinerungen des bayerischen Alpengebirges"; Bericht über seine Wanderung im Urschlauer Thal. B. | 68 | 55 |
| — — Versteinerungen aus dem bayerischen Alpengebiet mit geognostischen Erläuterungen. R. | 69 | 632 |
| Winkler, T. C.: „Musée Teyler". R. | 64 | 124 |
| — — „description de quelques nouvelles espèces de poissons fossiles de calcaire lithographique de Solenhofen." R. | 64 | 253 |
| — — Musée Teyler. R. | 65 | 376 |
| — — „Musée Teyler". 3. R. | 65 | 756 |
| — — dasselbe. 4. liv. R. | 66 | 623 |
| — — dasselbe. R. | 67 | 500 |
| — — dasselbe. 6. liv. R. | 67 | 875 |
| — — über die Schildkröten in der Sammlung des Teyler Museums. B. | 69 | 213 |
| Wirtgen: Vegetation der hohen und vulcanischen Eifel. R. | 66 | 747 |
| Wiser, D. F.: Krystallographische Mittheilungen. A. | 60 | 784 |
| — — neue Mineral-Vorkommnisse in der Schweiz. B. | 61 | 672 |
| — — Bergkrystall mit eingeschlossenem Antimonglanz und Eisenspath. B. | 61 | 832 |
| — — neue Mineral-Vorkommnisse der Schweiz; Silber von der Mürtschenalp, Kupfer vom Flumser Berg, fast farbloser Anatas. B. | 63 | 697 |
| — — Flussspath als Einschluss in Scheelit von Schlaggenwald; Chlorit, Adular und Eisenspath als Einschluss in Amethyst vom Zillerthal; Adular in Amethyst vom St. Gotthard; Millerit als Ein- | | |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| schluss in Kalkspath von Nanzenbach; Bergkrystall vom St. Gotthard; Apatit von der Fibia. B. | 1864 | 217 |
| Wiser, D. F.: Mineralien aus der Schweiz: Anatas, Epidot, Kalkspath, Auripigment, Kupferglanz, Eisenkies, Adular, Bergkrystall. B. | 65 | 725 |
| — — Mineralien aus der Schweiz: Adular, Bergkrystall, Eisenkies. B. | 65 | 835 |
| — — Mineralogisches aus der Schweiz; Apatit aus dem Rienthal; Disthen mit deutlichen Endflächen, Eisenglanz, Granat, Kobaltbeschlag, Titanit. B. | 66 | 193 |
| — — Mineralogisches aus der Schweiz; Verwachsensein von Rutil, Brookit und Anatas mit Eisenkies, Crichtonit mit Eisenkies; Anatas in Bergkrystall; Bergkrystall mit Eisenspath u. Rutil von Tavetsch. B. | 66 | 804 |
| — — flächenreiche Flussspath-Krystalle vom Galenstock in Oberwallis; Eisenglanz mit Rutil und Xenotim vom Piz Gaveradi; Brookit mit schneeweissem Amianth aus dem Griesernthal. B. | 67 | 337 |
| — — Zusammenvorkommen von Rutil, Anatas und Brookit im Griesern-Thal. B. | 67 | 832 |
| — — farbloser Turmalin von St. Gotthard; Drillings-Krystall von Phlogopit von Campo longo. B. | 68 | 465 |
| Witte: Archaeopteryx lithographica. B. | 63 | 567 |
| Wöhler: Meteoreisen von Kaba in Ungarn. R. | 60 | 77 |
| — — Meteorstein vom Caplande. R. | 60 | 352 |
| — — Meteorstein von Kakova im Temeser Comitate. R. | 60 | 82 |
| — — das Färbende im Smaragd. R. | 65 | 80 |
| — — die Meteoriten der Universitäts-Sammlung zu Göttingen. R. | 65 | 100 |
| — — Laurit, ein neues Mineral. R. | 66 | 829 |
| — — Anatas in der Steinkohlen-Formation. R. | 68 | 202 |
| — — Vorkommen des Laurits im Platinerz von Oregon. R. | 69 | 863 |
| Woldrich: Lagerung des Wiener Sandsteins bei Nussdorf. R. | 60 | 835 |
| Wolf, H.: Durchschnitte der Elisabeth-Bahn zwischen Wien nnd Linz. R. | 60 | 232 |
| — — südlicher Theil des Honther Comitates. R. | 60 | 361 |
| — — Diluvial-Bildungen in O.-Galizien. R. | 60 | 591 |
| — — Tertiärbildungen w. von Lemberg. R. | 60 | 739 |
| — — Trachyt-Sammlungen aus Ungarn. R. | 66 | 462 |
| — — Gliederung der Kreide-Formation in Böhmen. R. | 66 | 483 |
| — — geologisch-geographische Skizze der niederungarischen Ebene. R. | 68 | 365 |
| Wolf, Th.: die Auswürflinge des Laacher See's. R. | 67 | 862 |
| — — dasselbe. R. | 68 | 501 |
| Wood: eingeführte Fossilreste im rothen Crag. R. | 60 | 839 |
| Woods: Tertiär-Gesteine in S.-Australien. R. | 61 | 726 |
| Woodward: über einen neuen macruren Krebs. R. | 64 | 383 |
| Woodward: neues Cirripeden-Genus im Wenlock-Schiefer von Dudley. R. | 66 | 126 |
| — — Crustaceen-Zähne aus der Carbonformation und dem oberen Ludlow von Schottland. R. | 66 | 126 |
| — — neue Crustacee aus dem Lias von Lyme Regis. R. | 66 | 380 |
| — — neue Crustaceen aus der Ordnung der Eurypteriden. R. | 66 | 496 |
| — — neue Cirripeden-Gattung in dem Wenlockkalk und in den Platten von Dudley. R. | 66 | 496 |
| — — über mehrere fossile britische Crustaceen. R. | 67 | 383 |
| — — Structur der Xiphosuren und ihre Verwandtschaft mit den Eurypteriden. R. | 67 | 505 |
| — — über einen neuen Krebs, Neolimulus falcatus. R. | 68 | 373 |
| — — über Actinocrinus baccatum aus dem Kalkstein von Woolhope. R. | 68 | 873 |
| — — Beiträge zu den fossilen Crustaceen Britanniens. R. | 68 | 876 |
| — — einige neue Crustaceen aus dem oberen Silur von Lanarkshire und über die Structur des Pterygotus. R. | 69 | 627 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Woodward: über die Krümmung der Stosszähne des Mammuth. R. | 1869 | 638 |
| Worthen: über Geologie und Paläontologie von Illinois. A. . . . | 68 | 138 |
| Wright, Th.: Monograph on the British fossil Echinodermata from the Oolitic formations". R. . . . . | 63 | 876 |
| Würtenberger, F. J. und Th.: Verzeichniss von fossilen Pflanzen-Resten aus den Tertiär-Gebilden des Klettgau's. A. . . . . | 62 | 719 |
| Würtenberger: der weisse Jura im Klettgau. R. . . . . | 66 | 608 |
| Würtenberger, L.: die Schichtenfolge des schwarzen und braunen Jura im Klettgau. A. . . . . | 67 | 39 |
| — — Ammonites bimammatus auch im Klettgauer Jura. B. . . . | 67 | 179 |
| — — einige Beobachtungen im weissen Jura des oberen Donauthales. A. | 68 | 540 |
| Württenberger, G.: der Culm oder die untere Steinkohlenformation am Kellerwalde in Kurhessen. A. . . . . | 65 | 530 |
| — — Eindrücke an den Bohnerzen von Salzgitter und an in denselben vorkommenden Petrefacten. B. . . . . | 65 | 822 |
| — — über die Zechstein-Formation, deren Erzführung und den unteren Buntsandstein in Kurhessen. A. . . . . | 67 | 10 |
| — — die diluvialen Eisensteine des Kreises Fritzlar im Regierungs-Bezirke Cassel, verglichen mit den Basalteisensteinen des Vogelsberges. A. . . . . | 67 | 685 |
| Wyrouboff Gr.: über die färbenden Stoffe im Flussspath. R. . . . | 67 | 473 |
| — — neue mikroskopische Untersuchungen über die färbenden Stoffe im Flussspath. R. . . . . | 69 | 235 |


## Y.


| | | |
|---|---|---|
| Young: über Platysomus. R. . . . . | 67 | 126 |
| — — Notiz über neue Gattungen der carbonischen Glyptodipterinen. R. | 67 | 504 |


## Z.


| | | |
|---|---|---|
| Zaddach: Bernstein- und Braunkohlenlager des Samlandes. R. . . | 61 | 201 |
| Zepharovich, v.: Vorkommen von Bergtheer zu Peklenitza a. d. Mur. R. | 60 | 111 |
| — — mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. R. . | 60 | 616 |
| — — Mineral-Vorkommnisse in Salzburg. R. . . . . | 61 | 335 |
| — — die Gratzer Mineralien-Sammlung; krystallographische Monographie des Vesuvians; über neuere Kalk-Absätze. B. . . . | 62 | 64 |
| — — krystallographische Arbeit über den Epidot; Krystallformen des unterschwefligsauren Kalkes. B. . . . . | 62 | 337 |
| — — „krystallographische Studien über den Idokras". R. . . . . | 64 | 841 |
| — — über den Idokras von der Mussa-Alpe. R. . . . . | 64 | 847 |
| — — Anglesit von Schwarzenbach und Miss; Bournonit, Cerussit, Malachit und Azurit von Olsa; Korynit von Olsa. B. . . . | 65 | 48 |
| — — über den Idokras aus Norwegen. R. . . . . | 65 | 81 |
| — — Anglesit-Krystalle von Schwarzenbach und Miss in Kärnthen. R. | 65 | 473 |
| — — „Krystallographische Wandtafeln". R. . . . . | 66 | 96 |
| — — über Epidot von Zöbtau. R. . . . . | 66 | 454 |
| — — Sideroplesit und Magnesit aus Salzburg. R. . . . . | 66 | 455 |
| — — neue Calcit-Form von Pribram. R. . . . . | 67 | 98 |
| — — über den Wulfenit von Pribram. R. . . . . | 67 | 192 |
| — — Turmalin und Margarodit von Dobrowa in Kärnthen. R. . . | 67 | 199 |
| — — über die vom Werner-Verein in Brünn herausgegebene geologische Karte von Mähren und österreich. Schlesien. B. . . | 67 | 339 |
| — — Fluorit aus der Gams bei Hieflau in Steyermark. R. . . . | 67 | 475 |
| — — über den Enargit von Parad. R. . . . . | 67 | 477 |
| — — der Löllingit und seine Begleiter. R. . . . . | 67 | 715 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Zepharovich, v.: über Barrandit und Sphärit. R. | 1867 | 857 |
| — — die Erzlagerstätte von Reichenstein. R. | 68 | 78 |
| — — über Misspickel. R. | 68 | 79 |
| — — Ankerit-Krystalle vom Erzberg bei Vordernberg. R. | 68 | 204 |
| — — Barytocölestin vom Greiner in Tyrol. R. | 69 | 87 |
| Zerrenner, K.: die Rubingrube Kornilowsk. R. | 66 | 727 |
| Zeuschner, L.: paläont. Beiträge aus weissem Jurakalk von Inwald. R. | 60 | 629 |
| — — die Brachiopoden des Stramberger Kalkes. A. | 60 | 678 |
| — — Pachyrisma Beaumonti. R. | 63 | 251 |
| — — über das Alter der Grauwackeschiefer und der bräunlichgrauen Kalksteine von Swientomarz. A. | 66 | 513 |
| — — über den Zechstein von Kajetanow. A. | 66 | 520 |
| — — Spirifer simplex im devonischen Kalke von Sitka; Häufigkeit von Kalktuff im paläozoischen Gebiet Polens. B. | 66 | 579 |
| — — über die verschiedenen Formationen, auf denen sich der polnische Jura abgelagert hat. A. | 66 | 788 |
| — — Geologisches aus Polen. B. | 67 | 83 |
| — — devonische Formation im Sandomirer-Chenciner Gebirge. B. | 67 | 593 |
| — — devonische Formation im Sandomirer-Chenciner Gebirge; organische Reste des Thonschiefers von Skaly. B | 68 | 185 |
| — — über den Dolomit im devonischen Gebirgszuge zwischen Sandomierz und Chenciny. A. | 68 | 796 |
| — — über Petrefacten aus dem Jura von Bzow bei Kromolow. B. | 69 | 348 |
| — — über die Fauna der grauen Thone von Czenstochowa und des Eisenoolith von Pomorzany. B. | 69 | 726 |
| — — Alter des feuerfesten Thones bei Krakau. B. | 69 | 731 |
| Zigno, A. de: geologische Zusammensetzung der Euganeen. R. | 62 | 107 |
| — — „supra i depositi di piante fossili dell America settentrionale“. R. | 66 | 381 |
| — — „Dichopteris, genus novum filicum fossilium.“ R. | 66 | 382 |
| — — „Osservationi sulle felci fossili dell oolite.“ R. | 66 | 383 |
| Zimmermann, K. G.: Tertiär-Versteinerungen von Lüneburg und Lübeck; Pseudomorphosen von Quarz, Orthoklas, Zeolith und Magneteisen; Kreideschichten bei Stade. B. | 60 | 325 |
| — — turonisches Kieselgestein in Mecklenburg. B. | 61 | 310 |
| — — australischer Eisenmeteorit; Meteorin. B. | 61 | 557 |
| — — über Gletscherspuren am Harze. A. | 68 | 156 |
| Zincken, C.: Limulus Decheni aus dem Braunkohlensandstein bei Teuchern. R. | 63 | 249 |
| — — über den Kainit. B. | 65 | 310 |
| — — „die Braunkohle und ihre Verwendung“. R. | 65 | 748 |
| — — Zusammensetzung des Kainit. R. | 65 | 859 |
| — — über in einem miocänen Braunkohlen-Lager bei Bornstädt aufgefundene Pflanzenreste. B. | 67 | 82 |
| — — „die Braunkohle und ihre Verwendung; 1. Th. Die Physiographie der Braunkohle“. R. | 67 | 114 |
| — — unteroligocäne Petrefacten von Lörderburg bei Stassfurt. B. | 67 | 345 |
| — — flächenreicher Steinsalz-Krystall und Eisenkies von Stassfurt. B. | 67 | 840 |
| Zippe: Kupfererz-Lagerstätten im Rothliegenden Böhmens. R. | 60 | 612 |
| Zirkel: trachytische Gesteine der Eifel. R. | 61 | 360 |
| — — Monographie des Bournonit. R. | 62 | 998 |
| — — mikroskopische Untersuchungen von Gesteinen und Mineralien. R. | 63 | 615 |
| — — petrographische Untersuchungen über rhyolithische Gesteine der Taupo-Zone. R. | 64 | 632 |
| — — Syenit- und Granulit-Analyse. R. | 65 | 242 |
| — — über die mikroskopische Structur und Zusammensetzung der diesjährigen Laven von Nea-Kaimeni. A. | 66 | 769 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Zirkel F.: Dünnschliffe ächter Basalte. B. | 1867 | 81 |
| — — „Lehrbuch der Petrographie". R. | 67 | 109 |
| — — Beiträge zur geologischen Kenntniss der Pyrenäen. R. | 67 | 746 |
| — — über die mikroskopische Zusammensetzung der Phonolithe. R. | 68 | 87 |
| — — mikroskopische Untersuchungen über die glasigen und halbglasigen Gesteine. R. | 68 | 486 |
| — — über die mikroskopische Structur der Leucite und die Zusammensetzung Leucit führender Gesteine. R. | 68 | 609 |
| — — über die Verbreitung mikroskopischer Nepheline. A. | 68 | 697 |
| — — Leucit-Gesteine im Erzgebirge. R. | 69 | 755 |
| Zittel, K.: mineralogisch-paläontologische Reise durch Schweden und Norwegen. B. | 60 | 788 |
| — — Coralrag von Glos. R. | 61 | 352 |
| — — Beiträge zur Paläontologie von Neuseeland. A. | 63 | 146 |
| — — die obere Nummuliten-Formation in Ungarn. R. | 63 | 506 |
| — — die fossilen Bivalven der Gosaugebilde. R. | 64 | 251 |
| — — Anchitherium Aurelianense aus der Braunkohle von Leiding. R. | 64 | 510 |
| — — Bivalven der Gosaugebilde. R. | 65 | 108 |
| — — fossile Mollusken und Echinodermen aus Neuseeland. R. | 65 | 108 |
| — — Relief-Modelle der Gegend von Baden; geologische Aufnahmen in Baden. B. | 65 | 213 |
| — — über seine geologischen Aufnahmen in Baden im Seekreis. B. | 65 | 832 |
| — — die Bivalven der Gosaugebilde der n.ö. Alpen. R. | 66 | 624 |
| — — Labrador-Diorit von Schriesheim bei Heidelberg. A. | 66 | 641 |
| — — über die neuesten Schriften von Gemmellaro; die Stramberger Schichten auch in Süditalien. B. | 68 | 326 |
| Zittel, K. und Vogelgesang: geologische Beschreibung der Umgebungen von Möhringen und Mösskirch. R. | 68 | 490 |
| Zittel: Diploconus, ein neues Genus aus der Familie der Belemnitiden. A. | 68 | 548 |
| — — Paläontologische Notizen über Lias-, Jura- und Kreideschichten in den bayerischen und österreichischen Alpen. R. | 69 | 628 |

# II. Sach-Register.

Blosse Citate von Mineralien, Gebirgsarten und Petrefacten sind unberücksichtigt geblieben.

## A.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Acanthit | 1861 | 696 |
| Acanthocarpus | 65 | 375 |
| Acanthochirus | 63 | 376 |
| Acanthocladia anceps | 64 | 671 |
| „ dubia | 64 | 672 |
| Acanthodes | 1862 378 67 | 382 |
| Acanthophyton | 63 | 232 |
| Acanthopolis horridus | 67 | 504 |
| Acanthoteuthis | 62 248 65 | 890 |
| Acerotherium incisivum | 66 | 499 |
| Achtaragdit | 69 | 86 |
| Acraspedites admirandus | 66 | 261 |
| „ lithographicus | 66 | 282 |
| Acridites priscus | 64 | 163 |
| Acritis | 69 | 633 |
| Acrochasma | 61 | 243 |
| Acrochordocrinus insignis | 60 | 583 |
| Acrosalenia | 62 | 508 |
| Acrosaurier | 61 | 68 |
| Actaeonella | 63 | 503 |
| Actaeonidae | 63 | 503 |
| Actaeonina | 63 | 504 |
| Acteosaurus Tommasinii | 61 | 252 |
| Actinocrinus baccatum | 68 | 873 |
| Actinocamax verus | 63 | 502 |
| Actinodon latirostris | 69 | 250 |
| Adamin | 67 102 69 | 479 |
| Adelpholit | 65 | 88 |
| Adlersteine | 68 | 305 |
| Adnether Schichten | 60 | 849 |
| Adular | 61 1 61 | 335 |
| „ | 63 715 65 | 726 |
| „ | 65 835 66 | 197 |
| Aedelforsit | 64 | 626 |
| Aeger | 63 | 377 |
| Aepyornis | 62 | 127 |
| Aeschna Wittei | 1861 | 768 |
| Aeschynit | 66 | 90 |
| Agariocrinus | 60 | 589 |
| Agassichthys | 63 | 381 |
| Agassizocrinus | 60 | 589 |
| Agelacrinus | 61 | 127 |
| Agnostus Bavaricus | 68 | 687 |
| Ahlbildung | 63 | 769 |
| Ainalith | 65 | 88 |
| Akmit | 60 | 447 |
| Alaun | 63 | 671 |
| Alaunfels | 64 | 723 |
| Alaunschiefer | 69 | 398 |
| Albien | 65 | 744 |
| Albertit | 1866 112 66 | 237 |
| Albin | 63 | 835 |
| Albit | 61 334 61 | 578 |
| „ | 62 959 63 | 908 |
| „ | 65 740 67 | 309 |
| „ | 69 236 69 342 69 | 749 |
| Albit nach Wernerit | 64 | 72 |
| Alexandrit | 62 871 63 | 93 |
| „ | 69 | 584 |
| Algen | 64 | 759 |
| „ fossile, in Jaspis | 60 | 616 |
| Algodonit | 60 230 62 | 485 |
| „ | 66 | 458 |
| Alisonit | 61 | 191 |
| Allgäu-Schichten | 60 | 849 |
| Allochroit | 62 354 67 | 433 |
| Alloklas | 66 | 594 |
| Alluvium | 64 | 95 |
| Almandin | 67 432 69 | 234 |
| Alopiopsis pleiodon | 68 | 255 |
| Alosina salmonea | 61 | 247 |
| Alpenkalk, oolithischer | 65 | 18 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Alpenkohle | 1865 | 348 |
| | 1865 | 489 |
| Altait | 68 | 845 |
| Altalluvium | 64 | 95 |
| Aluminit | 61 | 191 |
| Alveolites | 63 | 505 |
| Amalgam | 61 | 83 |
| Amblygonit | 64 | 78 |
| Amblypterus Agassizi | 68 | 831 |
| Ameisen, fossile | 69 | 620 |
| Amethyst | 66 | 193 |
| Ammoneen | 69 | 122 |
| Ammoniakalaun | 61 | 661 |
| „ | 63 | 671 |
| Ammoniten | 66 | 490 |
| | 62 | 767 |
| Ammonites | 65 | 765 |
| | 65 | 888 |
| „ Baugieri | 67 | 58 |
| „ bimammatus | 67 | 178 |
| | 68 | 542 |
| „ curvicosta | 67 | 58 |
| „ ferrugineus | 67 | 57 |
| „ Humphriesianus | 67 | 56 |
| „ macrocephalus | 67 | 58 |
| „ Murchisonae | 67 | 55 |
| „ mutabilis | 66 | 609 |
| „ Oegir | 66 | 608 |
| „ opalinus | 67 | 55 |
| „ Parkinsoni | 67 | 57 |
| „ platynotus | 66 | 609 |
| „ polyplocus | 66 | 609 |
| „ Ramsaueri | 65 | 754 |
| „ Sauzei | 67 | 56 |
| „ scissus | 66 | 71 |
| „ Sowerbyi | 67 | 56 |
| „ steraspis | 68 | 546 |
| „ tatricus | 66 | 72 |
| „ torulosus | 67 | 55 |
| „ transversarius | 67 | 499 |
| | 68 | 540 |
| Amphibol | 67 | 434 |
| | 69 | 752 |
| Amphicentridae | 67 | 126 |
| Amphicoelia | 60 | 756 |
| Amphicyon | 64 | 210 |
| „ intermedius | 69 | 879 |
| Amphipeltis paradoxus | 63 | 627 |
| Amphistegina | 61 | 621 |
| Amphysile Heinrichi | 65 | 215 |
| Amygdalocystides | 62 | 244 |
| Analcim | 61 | 662 |
| „ | 67 | 302 |
| | 67 | 308 |
| Anamesit | 65 | 280 |
| | 68 | 210 |
| Anarthrocana deliquescens | 69 | 463 |
| Anatina Asteriana | 65 | 149 |
| „ selenoides | 65 | 149 |
| Anatas | 61 | 184 |
| | 61 | 335 |
| „ | 62 | 726 |
| | 63 | 697 |
| „ | 65 | 725 |
| | 66 | 805 |
| „ | 67 | 100 |
| | 67 | 364 |
| „ | | 68 202 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Anchitherium Aurelianense | 1864 | 510 |
| Ancyloceras-Mergel | 61 | 734 |
| Andalusit | 66 | 724 |
| Andesin | 67 | 104 |
| Andesit | 67 | 228 |
| Angerona electrica | 63 | 868 |
| Angiodendron | 62 | 116 |
| Anglesit | 1865 | 48 |
| | 65 | 473 |
| „ | 67 | 437 |
| Anguinosaurus | 60 | 765 |
| Anguisaurus | 61 | 68 |
| Angusta-Kalk | 64 | 482 |
| Anhydrit | 62 | 591 |
| | 62 | 732 |
| „ | 63 | 443 |
| | 65 | 600 |
| „ | 66 | 345 |
| | 67 | 79 |
| „ | 67 | 317 |
| | 67 | 784 |
| „ | | 68 576 |
| Anisomyon | 60 | 499 |
| Ankerit | 68 | 204 |
| Annularia longifolia | 64 | 165 |
| „ „ | 69 | 463 |
| „ sphenophylloides | 64 | 165 |
| Anodonta compressa | 64 | 653 |
| „ postera | 60 | 297 |
| „ subparallela | 64 | 654 |
| Anomia biplicata | 62 | 742 |
| „ vespertilio | 62 | 742 |
| Anomodontia | 60 | 754 |
| Anomopteris Mougeotii | 64 | 291 |
| Anomorrhea | 62 | 115 |
| Anona cacaoides | 66 | 55 |
| Anorthit | 60 | 229 |
| | 62 | 524 |
| „ | 67 | 206 |
| | 67 | 310 |
| „ | 67 | 778 |
| | 69 | 371 |
| Antholithes Triticum | 64 | 174 |
| Anthonys | 65 | 732 |
| Anthophila | 68 | 635 |
| Anthozoen | 60 | 375 |
| | 69 | 117 |
| Anthracit | 60 | 376 |
| | 64 | 90 |
| Anthracit-Sandstein | 60 | 736 |
| Anthracomya carbonica | 64 | 654 |
| „ elongata | 65 | 389 |
| Anthracoptera | 63 | 628 |
| Anthracoxen | 63 | 684 |
| Anthracotherium | 67 | 461 |
| Anthracosaurus Russeli | 63 | 626 |
| Anthracosia Weissiana | 67 | 681 |
| Antillia | 64 | 754 |
| Antimon | 67 | 609 |
| Antimonblüthe | 69 | 316 |
| Antimonglanz | 61 | 494 |
| | 63 | 836 |
| „ | 66 | 94 |
| | 69 | 316 |
| Antimonsilber | 65 | 476 |
| | 69 | 305 |
| Antozon | 63 | 716 |
| Antozonit | 62 | 488 |
| Apatit | 60 | 791 |
| | 61 | 490 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Apatit | 1861 562 | 61 659 |
| „ | 61 672 | 63 98 |
| „ | 64 218 | 64 713 |
| „ | 64 845 | 65 323 |
| „ | 65 349 | 65 695 |
| „ | 66 193 | 66 716 |
| „ | 66 836 | 67 314 |
| „ | 67 437 | 67 783 |
| „ | 68 604 | 69 183 |
| „ | | 69 732 |
| Aphaenogaster | | 69 624 |
| Aphyllostachys | | 66 764 |
| Aplax Oberndorferi | | 69 352 |
| Apophyllit | 61 334 | 63 464 |
| „ | 63 469 | 64 359 |
| „ | 67 200 | 67 304 |
| „ | 67 309 | 67 769 |
| „ | | 69 12 |
| Aporrhais speciosa | | 60 321 |
| Aquacreptit | | 69 84 |
| Aragonit | 60 439 | 61 32 |
| „ | 61 656 | 66 93 |
| „ | 65 743 | 67 359 |
| „ als Polarisator | | 62 601 |
| Araucarien | | 66 636 |
| Araucarites Tschihatscheffianus | | 69 465 |
| Arca striatula | | 65 148 |
| Archaeocyathus | 64 379 | 68 875 |
| Archaeopteryx lithographica | | 63 245 |
| „ „ | | 63 253 |
| „ „ | | 63 567 |
| Archaeotylus ignotus | | 64 208 |
| Archegosaurus | | 61 294 |
| Arethusina | | 68 257 |
| „ Koninckı | | 68 259 |
| „ Sandbergeri | | 67 703 |
| „ „ | | 68 259 |
| Arietenkalk | | 67 41 |
| Arksutit | | 66 833 |
| Arlberger Kalk | | 60 847 |
| Aroideen | | 68 110 |
| Arseneisen | | 68 412 |
| Arsenik | | 61 325 |
| Arsenikkies | | 67 477 |
| Arsenikkobalt | | 69 754 |
| Arsenikkobalteisen | | 68 410 |
| Arseniksilberblende | | 68 402 |
| Arsenomelan | | 67 203 |
| Arsenwismuthkupfererz | | 68 415 |
| Arthopleura armata | | 66 144 |
| Artisia | | 64 176 |
| Asaphus Wirthi | | 68 680 |
| Asar | | 60 39 |
| Asbest | | 60 82 |
| Asbolan | | 68 412 |
| Asche, vulcanische | | 65 287 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Ascoceras Bohemicum | 1860 | 667 |
| „ Murchisoni | 60 | 667 |
| Aspasiolith | 60 | 792 |
| Aspendesia cristata | 65 | 135 |
| Asperolith | 66 | 834 |
| Asphalt | 1862 883 | 67 626 |
| Asphaltschiefer | 67 | 125 |
| Aspidocaris liasica | 68 | 370 |
| Aspidolith | 69 | 745 |
| Aspidosoma Tischbeinianum | 63 | 382 |
| Asplenites | 63 | 249 |
| „ elegans | 64 | 167 |
| „ Reussi | 64 | 168 |
| Asterias asperula | 63 | 382 |
| Asterismus | 63 91 | 63 714 |
| Asteroblastus stellatus | 62 | 629 |
| Asterocerium | 63 | 506 |
| Asterodiscus pentagonalis | 65 | 140 |
| Asterophyllites latifolia | 63 | 231 |
| Astraeospongia | 60 | 759 |
| Astrophyllit | 63 550 | 64 845 |
| Astylospongia | 60 | 759 |
| Atakamit | 66 227 | 69 347 |
| Ateliocystites | 62 | 245 |
| Atelestit | 69 | 577 |
| Athyris | 68 | 372 |
| „ Royssii | 63 | 392 |
| Attakolith | 69 | 481 |
| Aturia | 66 | 634 |
| Aucella Hausmanni | 64 | 670 |
| „ Mosquensis | 62 | 759 |
| „ speluncaria | 64 | 670 |
| Augelith | 69 | 481 |
| Augit | 62 941 | 63 366 |
| „ | 65 693 | 66 451 |
| „ | 66 824 | 67 306 |
| „ | 67 314 | 67 700 |
| „ | 68 464 | 69 178 |
| „ | | 69 752 |
| Augitporphyr | 62 574 | 64 87 |
| „ | | 69 415 |
| Aulacophycus | | 62 115 |
| Auloceras | | 61 244 |
| Auripigment | | 61 334 |
| „ | 61 665 | 65 725 |
| Automolit | | 62 602 |
| Avicula contorta | 62 161 | 64 295 |
| „ „ | 65 367 | 68 229 |
| „ flexuosa | | 65 147 |
| „ laticeps | | 65 147 |
| „ Moutoniana | | 65 158 |
| „ pleuroptychodes | | 65 147 |
| Axinit | | 63 913 |
| „ | | 67 779 |
| Azurit | | 61 278 |

## B.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Badener Schichten | 1864 | 523 |
| Baerocrinus Ungeri | 67 | 633 |
| Bagrationit | 1861 | 852 |
| | 63 | 723 |
| Baikalit | 66 | 452 |
| Bairdienkalk | 67 | 452 |
| | 68 | 623 |
| Banatit | 64 | 493 |
| | 64 | 824 |
| Baphetes planiceps | 64 | 508 |
| Baretit | 68 | 750 |
| Barrandit | 67 | 857 |
| Baryt | 60 | 353 |
| | 61 | 661 |
| „ | 65 | 441 |
| | 67 | 318 |
| „ | 67 | 320 |
| | 68 | 420 |
| „ | 69 | 316 |
| Barytglimmer | 63 | 466 |
| Barytocölestin | 69 | 87 |
| Basalt | 60 | 604 |
| | 64 | 82 |
| „ | 65 | 641 |
| | 67 | 81 |
| „ | 67 | 229 |
| | 67 | 371 |
| „ | 67 | 726 |
| | 69 | 32 |
| „ | 69 | 241 |
| Basalteisenstein | 67 | 685 |
| Basalttuff mit Pflanzenresten | 63 | 127 |
| Basanit | 68 | 850 |
| Bathanga | 60 | 636 |
| Bathograptus | 66 | 122 |
| Bathypteris | 62 | 115 |
| Bathvillit | 65 | 83 |
| Batrachia | 60 | 756 |
| Baumfarn | 65 | 395 |
| Baumstämme, schwimmende | 68 | 162 |
| Bavarilla | 68 | 674 |
| „ Hofensis | 68 | 675 |
| Bavenoer Zwilling | 67 | 362 |
| Bayldonit | 66 | 727 |
| Beatricea | 62 | 247 |
| Beauxit | 63 | 723 |
| Belemnites | 63 | 762 |
| | 66 | 564 |
| „ | 68 | 369 |
| „ Bessinus | 69 | 349 |
| „ bicanaliculatus | 65 | 151 |
| „ Bzoviensis | 69 | 349 |
| „ compressus | 65 | 151 |
| „ minimus | 65 | 151 |
| „ mucronatus | 65 | 151 |
| „ quadratus | 63 | 502 |
| „ rugifer | 69 | 628 |
| Belinurus | 63 | 868 |
| Belodon | 66 | 575 |
| „ Kapffi | 60 | 556 |
| | 62 | 333 |
| „ Plieningeri | 60 | 212 |
| „ Plieningeri | 64 | 210 |
| Belonite | 68 | 486 |
| Belopeltis | 62 | 249 |
| Beloteuthis | 1862 | 250 |
| Beluga Vermontana | 60 | 255 |
| Beraunit | 68 | 82 |
| Bergkalk | 69 | 377 |
| Bergkrystall | 1864 | 217 |
| | 65 | 727 |
| „ | 65 | 835 |
| | 67 | 205 |
| „ | 68 | 828 |
| „ schliesst Antimonglanz ein | 61 | 832 |
| „ „ Eisenspath ein | 61 | 833 |
| „ „ Rutil ein | 60 | 784 |
| „ mit Antimonit-Einschluss | 69 | 852 |
| Bergtheer | 60 | 112 |
| „ | 63 | 851 |
| Berlinit | 69 | 481 |
| Bernstein | 61 | 201 |
| | 63 | 682 |
| „ | 66 | 505 |
| | 68 | 234 |
| „ | 69 | 620 |
| Beryll | 61 | 334 |
| | 63 | 477 |
| „ | 63 | 560 |
| | 67 | 780 |
| Berzelin | 69 | 235 |
| Beyrichia | 63 | 521 |
| „ Grewingkii | 67 | 592 |
| Bianchetto | 60 | 570 |
| Biflustra rustica | 65 | 135 |
| Biharit | 62 | 85 |
| Binnit | 64 | 709 |
| | 67 | 203 |
| Biotit | 67 | 104 |
| | 67 | 311 |
| „ | 67 | 431 |
| | 69 | 752 |
| „ nach Hornblende | 65 | 85 |
| Birmensdorfer Schichten | 64 | 523 |
| Bithinia Chastelli | 65 | 53 |
| Bittersalz | 61 | 585 |
| | 63 | 669 |
| „ | 65 | 238 |
| Bitterspath (Dolomit) | 61 | 450 |
| „ | 63 | 678 |
| | 64 | 709 |
| „ nach Kalkspath | 68 | 805 |
| Bitumen | 63 | 851 |
| Blaculla | 63 | 377 |
| Blättersandstein | 64 | 637 |
| Blätterthon | 64 | 637 |
| Blätterung | 62 | 358 |
| Blastoidocrinus | 62 | 243 |
| Blatta elliptica | 63 | 868 |
| „ ruficeps | 63 | 868 |
| Blattina affinis | 69 | 159 |
| „ euglyptica | 69 | 162 |
| „ „ var. | 69 | 162 |
| „ Weissiana | 69 | 163 |
| „ Geinitzi | 69 | 160 |
| „ leptophlebica | 69 | 158 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Blattina Manebachensis | 1869 | 160 |
| „ parvula | 69 | 161 |
| „ Blattina Rückerti | 69 | 163 |
| „ rusoma | 69 | 159 |
| „ spectabilis | 69 | 161 |
| Blaueisenerde | 64 | 855 |
| Blei | 61 | 129 |
| „ gediegenes | 1866 | 225 66 457 |
| Bleierzlager | 63 | 729 |
| Bleiformation, barytische | 64 | 481 |
| Bleiglanz | 60 | 573 61 324 |
| „ | 61 | 701 63 545 |
| „ | 63 | 594 63 674 |
| „ | 64 | 240 64 244 |
| „ | 64 | 730 65 481 |
| „ | 66 | 724 67 196 |
| „ | 67 | 437 67 620 |
| „ | 68 | 207 69 312 |
| „ | | 69 373 |
| „ schillernder | | 61 577 |
| Bleihornerz | | 66 226 |
| Bleivitriol | 64 | 241 65 473 |
| „ | | 67 437 |
| „ nach Bleiglanz | | 68 811 |
| Blende | 61 | 701 63 675 |
| „ | 64 | 709 64 240 |
| „ | 67 | 436 67 195 |
| „ | | 67 619 |
| „ dimorph | | 61 579 |
| „ nach Bleiglanz | | 68 813 |
| Blöcke, erratische | | 60 40 |
| Blumit | | 63 559 |
| Blutegel-Coccons, fossile | | 61 670 |
| Bogheadkohle | | 60 81 |
| Bohnerze | 61 | 599 65 822 |
| „ | | 68 491 |
| Bohnerz, vanadinhaltiges | | 64 365 |
| Bonebed | 60 | 513 62 746 |
| „ | | 65 307 |
| Bonsdorffit | | 63 365 |
| Boracit | 60 | 80 67 436 |
| „ künstlicher | | 61 81 |
| Boraxkalk | | 61 190 |
| Boronatrocalcit | | 62 191 |
| Bos Pallasi | | 63 541 |
| Bothriopygus obovatus | | 65 142 |
| Boulangerit | 69 | 84 69 746 |
| Bourboulit | | 63 588 |
| Bourgeocrinus cornutus | | 65 140 |
| „ ellipticus | | 65 140 |
| Bournonit | | 62 998 |
| „ nach Fahlerz | | 66 827 |
| Brachiopoden | 60 | 678 60 860 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Brachiopoden | 1861 | 154 61 352 |
| „ | 62 | 630 62 894 |
| „ | 63 | 125 63 760 |
| „ | 66 | 575 66 863 |
| „ | 68 | 630 68 766 |
| „ | 68 | 871 68 873 |
| Brachyichnithys typicus | | 64 253 |
| Bracklesham-Schichten | | 63 227 |
| Bragit | | 64 236 |
| Brandschiefer | | 64 630 |
| Braunbleierz | | 68 848 |
| Brauneisenerz | 61 | 486 64 148 |
| Brauneisenstein nach Eisenspath | | 65 266 |
| „ „ Zinkspath | | 68 814 |
| Braunit | | 64 358 |
| Braunkohle | 61 | 201 62 214 |
| „ | 65 | 748 67 112 |
| „ | 67 | 736 67 752 |
| Braunkohlen-Formation | 60 | 745 61 761 |
| „ „ | 65 | 378 66 630 |
| „ „ | | 67 213 |
| Braunspath | 68 | 421 69 318 |
| Braunsteinerze | | 65 483 |
| Brewstolin | | 64 78 |
| Brochantit | 65 | 329 65 481 |
| „ | 66 | 225 69 85 |
| Brodoponera | | 69 623 |
| Bromeliaceen | | 63 762 |
| Bronzen | | 65 400 |
| Brookit | 61 | 849 65 88 |
| „ | 66 | 804 67 104 |
| „ | 67 | 338 67 831 |
| Brucit | 61 | 488 63 468 |
| Brushit | | 66 88 |
| Bryozoen | 63 | 379 65 367 |
| „ | | 66 629 |
| „ | | 66 749 |
| „ Kalk | | 67 546 |
| „ Zone | | 66 501 |
| Buccinum atlanticum | | 62 26 |
| „ Doederleini | | 62 26 |
| „ vetulum | | 62 26 |
| Bucklandit | 61 | 851 61 852 |
| Bulla utriculus | | 62 34 |
| Buntkupfererz | 63 | 675 65 352 |
| Buntsandstein | 63 | 787 64 279 |
| „ | 64 | 738 69 584 |
| „ nach Kalkspath | | 67 320 |
| „ „ „ | | 69 714 |
| Bustamit | 66 | 365 66 718 |
| Butyrit | | 63 683 |
| Bylgia | | 63 376 |

# C.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Caenopithecus | 1863 | 255 |
| Cäsium | 1861 693 | 62 599 |
| „ | 63 199 | 66 755 |
| Calamites arenaceus | 64 | 291 |
| „ cannaeformis | 64 | 164 |
| „ Sternbergi | 63 | 873 |
| „ Suckowi | 64 | 164 |
| „ transitionis | 61 | 67 |
| „ Volkmanni | 64 | 164 |
| Calamopora | 63 | 504 |
| Calaverit | 68 | 845 |
| Calcaire de la Porte-de-France | 67 | 60 |
| Calcit | 67 98 | 67 315 |
| „ nach Analcim | 64 | 73 |
| „ „ Augit | 63 | 364 |
| „ „ Feldspath | 63 | 364 |
| „ „ Labradorit | 65 | 85 |
| Callianassa | 68 | 244 |
| Callipteris | 63 | 248 |
| Callograptus | 66 | 123 |
| Calosomen, fossile | 61 | 52 |
| Calymene Tristani | 68 | 680 |
| Camarophoria crumena | 63 | 392 |
| „ rhomboidea | 63 | 392 |
| Camelopardis Attica | 62 | 122 |
| Campin-Sand | 63 | 769 |
| Camponotus | 69 | 621 |
| Cancelleria parce-striata | 62 | 27 |
| Cancrinit | 62 727 | 63 593 |
| Cancrinus | 63 | 376 |
| Capitodus | 68 | 832 |
| Caprina | 68 | 505 |
| Caprinelliden | 68 | 504 |
| Carabocrinus | 62 | 242 |
| Cardinia nana | 64 | 654 |
| Cardinien-Sandstein | 68 | 623 |
| Cardiocarpon | 63 | 232 |
| „ emarginatum | 64 | 174 |
| Cardiphyngus | 63 | 758 |
| Cardita-Schichten | 66 | 751 |
| Cardium Hillanum | 65 | 149 |
| „ Philippianum | 60 | 299 |
| „ Reissi | 62 | 40 |
| „ Rhäticum | 60 | 299 |
| Carmenit | 65 | 326 |
| Carnallit | 63 199 | 64 713 |
| „ | | 66 325 |
| Carolathin | 63 | 686 |
| Carpenteria | 62 | 504 |
| Carpus | 65 | 61 |
| Cassianella | 62 | 753 |
| Cassis Rondeleti | 60 | 321 |
| Castellit | 66 | 718 |
| Catawbarit | 1860 | 853 |
| Caturus | 64 | 253 |
| Caulopteris gigantea | 65 | 393 |
| „ punctata | 66 | 378 |
| Celaeno | 62 | 250 |
| Cephalisation | 1864 864 | 67 120 |
| Cephalopoden | 61 243 | 62 632 |
| „ | 63 761 | 64 503 |
| „ | 64 505 | 66 492 |
| „ | 66 767 | 66 864 |
| „ | 68 123 | 68 638 |
| „ | | 69 251 |
| „ | | 69 631 |
| „ paläolithische | | 60 641 |
| Ceratiocaris | | 60 639 |
| Ceratites Strombecki | | 61 243 |
| Ceratotrochus conulus | | 65 133 |
| Cercopis aurata | | 63 868 |
| Cerin | | 64 712 |
| Cerithium crenulosum | | 62 30 |
| „ Hartungi | | 62 30 |
| „ incultum | | 62 31 |
| „ quadrifasciatum | | 65 151 |
| Cerithien-Kalk | 64 637 | 65 210 |
| „ Schichten | 60 857 | 60 858 |
| „ „ | | 67 245 |
| Cerithioderma | | 61 764 |
| Cerussit | 61 658 | 67 316 |
| „ nach Bleivitriol | | 65 266 |
| „ „ Baryt | | 62 1000 |
| „ „ „ | | 68 815 |
| Cervus Browni | | 69 511 |
| „ diluvianus | | 66 576 |
| „ elephas | | 64 510 |
| „ Falconeri | | 69 511 |
| „ furcatus | | 63 616 |
| „ hibernicus | | 61 667 |
| „ pseudoelephas | | 63 616 |
| Chabasit | 60 785 | 60 795 |
| „ | 61 449 | 64 477 |
| „ | 64 844 | 66 364 |
| „ | 67 304 | 67 308 |
| „ | | 69 237 |
| Chaetoessa brevialata | | 63 868 |
| „ Burmeisteri | | 63 868 |
| Chalcedon | | 61 487 |
| Chalkolith | 62 601 | 68 78 |
| Chalkophyllit | | 67 361 |
| Chasmotherium | | 63 255 |
| Chassignit | 62 997 | 65 321 |
| Chatamit | | 69 87 |
| Cheiracanthus | | 62 378 |
| Cheirurus discretus | | 68 683 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Cheirurus gracilis | 1868 | 682 |
| Chelonia | 60 | 756 |
| Chelydra Decheni | 64 | 699 |
| Chelytherium obscurum | 63 | 445 |
| Chemnitzia | 69 | 234 |
| Chenevixit | 66 | 726 |
| Chenopus-Schicht | 65 | 195 |
| Chiastolith | 1864 72 | 195 |
| Childrenit | 64 | 78 |
| Chilodus gracilis | 61 | 624 |
| Chimaera priscus | 60 | 212 |
| Chiolith | 66 | 224 |
| Chirotherium-Fährten | 60 | 493 |
| „ Fährte | 67 | 504 |
| Chiton | 63 234 | 67 874 |
| Chitonellus | 67 | 874 |
| Chladnit | 62 998 | 65 321 |
| Chlorit | 63 92 | 63 912 |
| „ | 67 430 | 68 746 |
| „ | 69 | 237 |
| „ nach Granat | 67 | 198 |
| „ „ Idokras | 65 | 264 |
| „ „ Strahlstein | 64 | 477 |
| Chloritoid | 61 577 | 67 105 |
| Chloritschiefer | 62 813 | 62 855 |
| Chlorkalium | 68 | 483 |
| Chlorolithin | 65 | 85 |
| Chloropal | 61 | 661 |
| Chlorselenquecksilber | 66 | 411 |
| Chlorsilber | 67 | 195 |
| Chondroarsenit | 66 | 597 |
| Chondrit | 62 997 | 65 321 |
| Chondrites Göppertianus | 64 | 164 |
| Chondrosteus | 60 | 864 |
| Choristoceras | 66 | 640 |
| Christophit | 64 | 79 |
| Chromeisen | 67 | 195 |
| Chromeisenstein | 62 | 1001 |
| Chromgranat | 62 | 188 |
| Chrompicotit | 69 | 370 |
| Chromzoisit | 67 | 835 |
| Chrysoberyll | 62 196 | 64 71 |
| „ | 68 80 | 68 184 |
| „ | 69 356 | 69 548 |
| Cidaris coronata | 65 | 141 |
| „ Jouanetti | 65 | 141 |
| „ pretiosa | 65 | 141 |
| „ sceptrifera | 69 | 815 |
| „ subvesiculosa | 65 | 141 |
| „ „ | 69 | 815 |
| „ tribuloides | 62 | 47 |
| Cidariten-Schichten | 64 | 525 |
| Cinulia | 63 | 504 |
| Cistudo anhaltina | 66 | 498 |
| Cladograpsus | 68 | 375 |
| Cladopora | 63 | 505 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Clathropteris platyphylla | 1863 | 410 |
| Clayit | 61 | 185 |
| Cleiocrinus | 62 | 243 |
| Cleithrolepis granulatus | 64 | 753 |
| Climaticus | 62 | 378 |
| Climacograptus | 66 | 121 |
| Climatograptus | 68 | 375 |
| Climaxodus | 69 | 620 |
| Clymenia | 1864 375 | 64 612 |
| „ angulosa | 64 | 377 |
| „ angustiseptata | 64 | 376 |
| „ annulata | 64 | 377 |
| „ Beaumonti | 64 | 377 |
| „ bilobata | 64 | 377 |
| „ binodosa | 64 | 377 |
| „ Dunckeri | 64 | 377 |
| „ flexuosa | 64 | 376 |
| „ Haueri | 64 | 377 |
| „ intermedia | 64 | 377 |
| „ laevigata | 64 | 377 |
| „ planorbiformis | 64 | 377 |
| „ speciosa | 64 | 377 |
| „ striata | 64 | 377 |
| „ subarmata | 64 | 377 |
| „ undulata | 64 | 377 |
| Clypeaster altus | 62 | 46 |
| Clytia | 61 | 73 |
| Coccotenthis | 62 | 249 |
| Cölestin | 61 696 | 64 242 |
| „ | 67 317 | 67 449 |
| „ | | 68 78 |
| Colonien | 65 631 | 66 293 |
| Columbit | 62 86 | 63 594 |
| „ | 65 87 | 65 855 |
| „ | 66 833 | 67 198 |
| Comarocystites | 62 | 244 |
| Comatula | 66 | 564 |
| „ teisenbergensis | 65 | 140 |
| Comptonit | 65 | 479 |
| Conactaeon | 63 | 504 |
| Concretionen | 68 | 294 |
| „ geschlossen | 68 | 300 |
| „ hohle | 68 | 304 |
| Congerien-Schichten | 60 735 | 60 857 |
| Coniferen, fossile | 67 | 247 |
| Conocephalites Bavaricus | 68 | 666 |
| „ deficiens | 68 | 672 |
| „ discrepans | 68 | 673 |
| „ extremus | 68 | 671 |
| „ Geinitzi | 68 | 667 |
| „ Münsteri | 68 | 668 |
| „ problematicus | 68 | 670 |
| „ quaesitus | 68 | 670 |
| „ Wirthi | 68 | 669 |
| Conoclypus obovatus | 65 | 143 |
| Conodontes Boisvittei | 63 | 243 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Conularia Hollebeni | 1869 | 60 |
| Conulites | 62 | 624 |
| Conus candidatus | 62 | 23 |
| „ trochulus | 62 | 24 |
| Cookeit | 66 | 597 |
| Coralrag | 61 | 352 |
| Corax falcatus | 69 | 834 |
| Corbicula-Schichten | 64 | 637 |
| „ Schicht | 65 | 211 |
| Corbula caudata | 65 | 149 |
| „ sulcata | 66 | 500 |
| „ velata | 65 | 149 |
| Cordaites | 62 | 762 |
| „ borassifolius | 64 | 175 |
| Cordierit 1861 | 697 | 63 315 |
| „ -Gneiss | 67 | 487 |
| Cornwallit | 69 | 580 |
| Corundophilit 67 | 104 | 69 466 |
| Cosalit | 68 | 847 |
| Crag 60 | 839 | 65 762 |
| „ | 66 | 127 |
| Crania tuberculata | 63 | 143 |
| Crassatella Gallieni | 65 | 149 |
| „ Marrotiana | 65 | 149 |
| „ Vindinnensis | 65 | 149 |
| Cratylus truncatus | 66 | 578 |
| Credneria | 60 | 218 |
| Crinoideen | 64 | 565 |
| Crocodilia | 60 | 756 |
| Crocodilus teisenbergensis | 65 | 153 |
| „ vicentinus | 68 | 255 |
| Crookesit | 69 | 235 |
| Crossopodia thuringiaca | 64 | 3 |
| Cryptodontia | 60 | 735 |
| Ctenodonta | 62 | 246 |
| Culex Loewi | 63 | 868 |
| Culm 61 | 859 | 64 734 |
| „ 65 | 530 | 69 601 |
| Cuprein | 63 | 838 |
| Curtonotus | 64 | 128 |
| Cuseler Schichten | 68 | 626 |
| Cyanit | 67 | 105 |
| Cyanitit | 1867 | 105 |
| Cyanochalcit | 69 | 579 |
| Cyatheites aequalis | 64 | 173 |
| „ Miltoni | 69 | 463 |
| Cyathocrinus gracilior | 63 | 382 |
| Cycadeen 1864 | 122 | 66 129 |
| „ | 68 | 110 |
| Cycadites | 66 | 131 |
| „ gyrosus | 66 | 132 |
| „ taxodinus | 66 | 131 |
| Cycadoidea Yatesi | 67 | 876 |
| Cyclocystoides | 62 | 246 |
| Cyclonema | 62 | 247 |
| Cyclophyllum | 68 | 375 |
| Cyclopteris | 62 | 762 |
| Cyclopteris orbicularis | 69 | 463 |
| „ rhomboidea | 64 | 173 |
| „ tenera | 64 | 173 |
| „ trichomanoides | 63 | 813 |
| Cylindrites | 63 | 504 |
| Cynochampsa | 60 | 483 |
| „ laniarius | 60 | 380 |
| Cypraea | 69 | 123 |
| „ amygdalum | 60 | 321 |
| „ parcicosta | 62 | 24 |
| Cyrena distorta | 65 | 51 |
| „ extensa | 65 | 51 |
| „ lata | 65 | 149 |
| Cyrenen-Mergel | 64 | 637 |
| „ „ | 65 | 205 |
| Cyrtoceras | 67 | 756 |
| Cyrtodonta | 62 | 246 |
| Cyrtograptus | 68 | 374 |
| Cyrtolit | 68 | 201 |
| Cystidea Bavarica | 68 | 694 |
| Cystoblastus | 69 | 124 |
| Cystocrinus | 60 | 760 |
| Cythere | 67 | 577 |
| „ elongata | 63 | 394 |
| „ gracilis | 63 | 394 |
| „ inornata | 63 | 394 |
| Cytocrinus | 60 | 760 |


## D.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Dachschiefer-Flora 1866 | 765 | |
| Dachstein-Bivalve | 62 | 1007 |
| „ Kalk | 60 | 848 |
| Dacit 1866 | 731 | 67 228 |
| „ | 68 | 205 |
| Dadoxylon | 63 | 231 |
| Dalmanites Kablikae | 62 | 118 |
| Damourit 67 | 106 | 69 482 |
| Danait 66 | 88 | 67 477 |
| „ | 67 | 712 |
| Danalit | 67 | 194 |
| Darwinit | 1861 | 696 |
| Datolith 1860 | 796 | 62 432 |
| „ | 67 | 314 |
| Decksand | 64 | 97 |
| Degeroit | 69 | 347 |
| Deianira | 60 | 856 |
| Delvauxit | 67 | 608 |
| Deltidium | 63 | 125 |
| Dendrerpeton | 63 | 235 |
| „ Acadianum | 64 | 508 |
| Dendrograptus 66 | 123 | 68 375 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Dentalina | 1867 | 583 |
| Dentalium elephantinum | 60 | 320 |
| Dentalium striatum | 65 | 150 |
| Desmia | 62 | 115 |
| Desmin | 1862 600 | 65 437 |
| „ | 67 200 | 67 303 |
| „ | 67 308 | 67 429 |
| Devillin | 65 477 | 65 621 |
| Devon | 65 | 812 |
| Devon-Formation | 67 594 | 69 635 |
| „ „ | 69 | 658 |
| Diabas | 61 708 | 62 855 |
| „ | 62 986 | 64 493 |
| „ | 67 484 | 69 356 |
| Diaklasit | 62 | 529 |
| Diallagit | 62 | 937 |
| Diamant | 61 232 | 63 715 |
| „ | 64 198 | 65 353 |
| „ | 67 195 | 67 367 |
| „ | 67 | 608 |
| Diansäure | 60 | 446 |
| Diaspor | 64 852 | 67 103 |
| „ | 67 105 | 67 106 |
| „ | 67 438 | 69 749 |
| Diastopora Dutempleana | 65 | 138 |
| Diceras arietina | 65 | 148 |
| Dichograpsus | 63 867 | 68 375 |
| Dichopteris | 66 | 382 |
| Dichroismus | 69 368 | 69 532 |
| Dicranograptus | 68 | 375 |
| Dictyocaris | 60 | 639 |
| Dictyodendron | 62 | 116 |
| Dictyonema | 66 | 123 |
| Dictyophylon | 67 | 287 |
| „ Liebeanum | 67 | 286 |
| Dictyopteris neuropteroides | 64 | 170 |
| Dictyophthalmus Schrollianus | 65 | 374 |
| Dicynodontae | 60 | 755 |
| Didus nazarenus | 66 | 247 |
| Didymaspis | 67 | 874 |
| Didymograpsus | 68 | 375 |
| Didymotheca | 65 | 375 |
| Diluvial-Formation | 60 591 | 61 706 |
| „ Geschiebe | 63 | 752 |
| „ Sand | 64 | 96 |
| „ Thon | 64 | 97 |
| Diluvium | 63 219 | 64 96 |
| Dimodosaurus | 63 | 233 |
| Dimorphismus | 61 | 579 |
| Dinichthys Herzeri | 68 | 874 |
| Dinocyon Thenardi | 62 | 120 |
| Dinornis | 60 500 | 66 379 |
| Dinosauria | 60 | 755 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Dinotherium | 1861 | 766 |
| Dioonopteris | 65 | 373 |
| Diopsid | 1862 353 | 63 96 |
| „ | 66 388 | 66 451 |
| „ | 67 314 | 67 435 |
| Diorit | 62 193 | 62 811 |
| „ | 62 854 | 66 801 |
| „ | 67 513 | 67 641 |
| „ | 67 730 | 69 92 |
| „ | | 69 293 |
| Dioritgneiss | | 67 645 |
| Diplacanthus | | 62 378 |
| Diplazites | | 63 249 |
| Diploconus | | 68 548 |
| „ | | 68 552 |
| Diplodendron | | 62 116 |
| Diplograpsus | | 68 375 |
| Diplostylus Dawsoni | | 63 628 |
| Diprotodon | | 63 384 |
| Dipyr | | 62 489 |
| Discina contraria | | 68 692 |
| „ nitida | | 63 392 |
| „ varians | | 68 692 |
| Disthen | 66 194 | 67 105 |
| „ | | 67 606 |
| „ nach Andalusit | | 64 73 |
| Ditroit | | 68 83 |
| Dolerit | 60 56 | 61 88 |
| „ | 65 338 | 69 242 |
| Dolmen | | 67 498 |
| Dolomit | 61 488 | 64 812 |
| „ | 63 369 | 65 601 |
| „ | 67 315 | 67 371 |
| „ | | 68 797 |
| Dolomitisation | | 66 574 |
| Dolomit-Bildung | | 66 1 |
| Domeykit | 60 230 | 62 486 |
| „ | 66 458 | 67 826 |
| Domit | | 65 623 |
| Dopplerit | 63 685 | 66 602 |
| Dosinia | | 65 365 |
| Dreissena | | 64 654 |
| Drobna | | 63 377 |
| Dufrenit | | 68 81 |
| Dufrenoysit | 64 710 | 67 203 |
| Dunit | 65 94 | 66 76 |
| Dusa | | 63 377 |
| Dyas | 62 227 | 63 395 |
| „ | | 67 1 |
| Dyoplax arenaceus | | 68 121 |
| Dysplanus | | 63 632 |
| Dyspotaea semicanalis | | 62 33 |

## E.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Echiniden | 1866 | 418 |
| Echinocorys gibba | 69 | 821 |
| Echinocyamus scutatus | 65 | 142 |
| „ placenta | 65 | 142 |
| Echinodermen | 1866 491 | 68 120 |
| Echinolampas Francii | 65 | 142 |
| Ectatomma | 69 | 623 |
| Edrioaster | 62 | 245 |
| Eier, fossile | 60 | 553 |
| Ei, fossiles | 63 | 465 |
| Eichwaldia | 62 | 246 |
| Eindrücke in Geschieben | 60 | 219 |
| „ „ „ | 64 | 611 |
| Eisen | 61 | 584 |
| Eisenalaun | 63 | 671 |
| Eisenglanz | 60 787 | 64 842 |
| „ | 66 194 | 68 483 |
| „ pseudomorph nach Kalkspath | 60 | 572 |
| „ nach Olivin | 63 | 364 |
| Eisenglimmer | 67 | 321 |
| Eisenglimmerschiefer | 60 | 853 |
| Eisengranitel | 62 | 578 |
| Eisenkies | 60 714 | 61 410 |
| „ | 61 862 | 61 700 |
| „ | 61 746 | 62 913 |
| „ | 64 85 | 65 235 |
| „ | 65 726 | 65 836 |
| „ | 67 841 | 67 196 |
| „ | 68 608 | 69 316 |
| „ nach Eisenglanz | 64 | 480 |
| „ „ „ | 65 | 85 |
| Eisenkiesel | 64 | 778 |
| Eisenoxyd nach Magneteisen | 65 | 238 |
| „ „ „ | 65 | 258 |
| „ „ Quarz | 67 | 591 |
| Eisenrose | 67 | 338 |
| Eisenspath | 61 487 | 65 328 |
| „ | 65 479 | 65 622 |
| „ | 68 | 848 |
| Eisenstassfurtit | 65 | 331 |
| Eisenstein, diluvialer | 67 | 685 |
| Eisenstein-Lager | 64 | 737 |
| Eisenthongranat | 67 | 422 |
| Eisenvitriol | 63 | 668 |
| Ekmanit | 67 | 361 |
| Eläolith | 61 430 | 62 186 |
| Elder | 63 | 377 |
| Elephas Africanus | 61 | 505 |
| „ primigenius | 66 | 438 |
| Emerit | 67 | 103 |
| Emerylith | 67 | 103 |
| Emmonsia | 63 | 506 |
| Emys lutaria | 63 | 244 |
| Enargit | 1865 856 | 67 477 |
| „ | 68 747 | 69 85 |
| Encrinus liliiformis | 64 | 570 |
| Enneamerus | 69 | 624 |
| Ennema | 62 | 247 |
| Enstatit | 63 95 | 66 387 |
| Entalophora brevissima | 65 | 137 |
| „ clava | 65 | 137 |
| „ icaunensis | 65 | 137 |
| „ madreporacea | 65 | 137 |
| „ ramosissima | 65 | 137 |
| „ subregularis | 65 | 138 |
| Entomostraceen | 65 505 | 66 119 |
| „ | 66 870 | 69 124 |
| „ | | 69 625 |
| Eosaurus Acadianus | 63 | 247 |
| Eozoon | 66 210 | 66 352 |
| „ | 66 368 | 66 481 |
| „ | | 69 551 |
| „ canadense | 64 867 | 65 884 |
| „ -Gestein | 67 | 122 |
| Ephemerites Rückerti | 65 | 385 |
| Epichlorit nach Quarz | 67 | 591 |
| Epigenit | 69 205 | 69 862 |
| Epidosit | 62 | 492 |
| Epidot | 60 785 | 61 490 |
| „ | 61 850 | 62 419 |
| „ | 62 603 | 63 96 |
| „ | 63 808 | 63 911 |
| „ | 64 820 | 65 725 |
| „ | 66 454 | 67 434 |
| „ | 67 771 | 69 13 |
| „ | | 69 236 |
| „ nach Fassait | | 64 41 |
| „ „ Feldspath | | 66 828 |
| „ „ Granat | | 69 721 |
| Equisetites columnaris | 65 | 14 |
| „ platyodon | 65 | 449 |
| „ Socolowskii | 69 | 462 |
| Equus Caballus | 64 | 255 |
| „ fossilis | 64 | 255 |
| „ parvulus | 69 | 767 |
| Erdbeben | 60 610 | 61 769 |
| „ | 62 105 | 66 528 |
| „ | 60 743 | 67 389 |
| „ | 68 442 | 69 695 |
| Erde, Entwickelungs Gesetz der | 67 | 230 |
| Erdgestalt | 60 | 751 |
| Erde, Klima der | 60 | 828 |
| Erdmagnetismus | 68 | 869 |
| Erdöl | 60 110 | 66 367 |
| „ | 66 475 | 65 347 |
| „ | 65 348 | 67 623 |
| „ | | 69 247 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Erdschlöpfe | 1868 | 39 |
| Eretmocrinus | 60 | 499 |
| Eretlopterus | 61 | 252 |
| Erlan | 1863 | 184 64 48 |
| „ | 66 | 436 |
| Erratische Formation | 61 | 211 |
| Eryma | 62 | 232 63 375 |
| Eryon | 63 | 375 |
| Erzgänge | 68 | 98 |
| Erzlagerstätten | 61 | 231 |
| „ | 61 | 459 61 499 |
| „ | 61 | 602 61 609 |
| „ | 66 | 367 67 110 |
| „ | 67 | 207 67 211 |
| Escharella ramosa | 65 | 135 |
| Escharipora pentapora | 65 | 135 |
| Esino-Dolomit | 62 | 887 |
| Esmarkit | 63 | 471 |
| Estheria | 61 | 834 62 74 |
| „ | 64 | 125 |
| „ rugosa | 64 | 649 |
| Etallonia | 62 | 235 63 376 |
| Ethmophyllum | 68 | 875 |
| Eucalyptocrinus | 62 | 633 |
| Euconactaeon | 63 | 504 |
| Eucyclus | 61 | 637 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Eugereon Boeckingi | 1866 | 868 |
| Eninospongia | 60 | 763 |
| Euklas | 64 | 71 |
| Eukrit | 1862 | 998 65 322 |
| Eunicee | 69 | 627 |
| Euosmit | 64 | 10 |
| Euphemerina | 66 | 497 |
| Euphotid | 64 | 83 |
| Euralit | 69 | 357 |
| Euritporphyr | 60 | 131 |
| Eurypterus | 61 | 252 |
| „ pulicaris | 63 | 628 |
| Eurysomidae | 67 | 126 |
| Eusynchit | 64 | 237 64 844 |
| Eutaxit | 68 | 850 |
| Euthynotus | 60 | 504 |
| „ intermedius | 60 | 504 |
| „ micropedius | 60 | 504 |
| „ speciosus | 60 | 504 |
| Euxenit | 66 | 90 |
| Evansit | 66 | 87 |
| Exelissa | 62 | 383 |
| Exogyra recurvata | 65 | 146 |
| „ virgula | 65 | 146 |
| Explosionskratere | 69 | 843 |


## F.


| | | |
|---|---|---|
| Fahlbänder | 1869 | 437 |
| Fahlerz | 1865 | 584 67 197 |
| „ | 68 | 748 69 301 |
| „ | 69 | 748 |
| Fasciolaria filamentosa | 62 | 29 |
| Faujasit | 60 | 59 |
| Fauserit | 65 | 479 65 858 |
| Fayalit | 69 | 344 |
| Faxekalk | 66 | 864 67 543 |
| „ | 68 | 229 68 762 |
| Feldspath | 65 | 474 65 687 |
| „ | 67 | 97 67 360 |
| „ | 67 | 610 67 716 |
| „ | 68 | 206 |
| „ grüner von Bodenmais | 60 | 351 |
| „ schillernder | 69 | 387 |
| „ in Quarz-Krystall eingeschlossen | 60 | 442 |
| „ pseudomorph nach Augit | 60 | 573 |
| „ -Bildung | 67 | 179 67 216 |
| Felsite in Verwachsung | 60 | 446 |
| Felsit-Pechstein | 68 | 488 |
| „ Porphyr | 66 | 463 67 618 |
| „ Tuff | 64 | 672 |
| Fenestella plebeja | 63 | 393 |
| Ferberit | 63 | 650 65 327 |
| Fergusonit | 61 | 330 |

| | | |
|---|---|---|
| Feuerstein | 1863 | 841 |
| „ -Geräthe | 60 | 99 |
| Fibroferrit | 65 | 328 |
| Fichtelit | 63 | 683 |
| Filicava triangularis | 65 | 139 |
| Filispara reticulata | 65 | 138 |
| Fische, fossile | 1861 | 125 61 246 |
| „ „ | 61 | 248 61 623 |
| Fischzähne der Trias | 62 | 765 |
| Fissurina | 63 | 500 |
| Flabellata | 63 | 747 |
| Flora der Salzstellen | 63 | 747 |
| „ permische | 65 | 301 |
| Flussspath | 60 | 793 61 395 |
| „ | 61 | 663 61 672 |
| „ | 62 | 487 63 201 |
| „ | 63 | 464 63 716 |
| „ | 63 | 910 64 217 |
| „ | 64 | 714 66 724 |
| „ | 67 | 107 67 195 |
| „ | 67 | 337 67 473 |
| „ | 67 | 474 67 783 |
| „ | 69 | 12 69 235 |
| „ | 69 | 236 69 439 |
| „ | | 69 745 |
| „ nach Feldspath | | 65 267 |
| Foraminiferen | 60 | 630 60 872 |
| „ | 61 | 616 62 253 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Foraminiferen | 1862 504 | 62 621 |
| „ | 62 624 | 63 120 |
| „ | 63 498 | 63 500 |
| „ | 64 748 | 64 871 |
| „ | 65 109 | 65 891 |
| „ | 65 250 | 66 484 |
| „ | 66 487 | 66 488 |
| „ | 66 489 | 66 501 |
| „ | | 68 126 |
| Forcherit | | 63 200 |
| Forellenstein | | 64 257 |
| Formica | | 69 622 |
| Formicidae | | 69 621 |
| Fossoria | | 68 636 |
| Fournetit | | 1861 595 |
| Foyait | | 61 426 |
| Franklinit | | 60 349 |
| Freieslebenit | | 60 578 |
| Fritzscheit | | 65 743 |
| Fruchtschiefer | | 69 284 |
| Fuchsit | | 67 312 |
| Fukoiden-Kalkstein | | 62 496 |
| Fulgorina Klieveri | | 69 166 |
| Fusulina robusta | | 69 61 |
| Fusus elatior | | 60 322 |
| „ rotatus | | 60 322 |
| „ Waelii | | 60 322 |


## G.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Gabbro | 1860 80 | 62 513 |
| „ | 62 933 | 62 962 |
| „ | 63 343 | 64 257 |
| „ | 66 366 | 67 862 |
| Gadolinit | 61 134 | 67 696 |
| Gänge, Theorie der | | 63 30 |
| Gailthaler Schichten | | 60 610 |
| Galenit | | 67 437 |
| Galerites albogalerus | | 69 816 |
| Galeriten-Schichten | | 68 767 |
| Galesaurus | | 60 483 |
| „ planiceps | | 60 380 |
| Gallinula gigantea | | 60 379 |
| Galmei | 62 1003 | 63 724 |
| „ -Lager | | 64 482 |
| Gangthonschiefer | 65 336 | 69 358 |
| Ganocephala | | 60 753 |
| Garbenschiefer | | 67 487 |
| Gargas-Mergel | | 62 97 |
| Gastrochaena dilatata | | 65 150 |
| Gasteropoden | 66 246 | 68 236 |
| „ | 68 120 | 68 637 |
| „ | | 69 122 |
| Gault | | 62 97 |
| „ | 66 243 | 66 863 |
| Gayllüssit | | 67 211 |
| Gedrit | | 62 82 |
| Generatio spontanea | | 60 243 |
| Gervillia cerathophaga | | 64 669 |
| „ inflata | | 62 161 |
| „ praecursor | | 62 160 |
| Geschiebe mit Eindrücken | | 61 225 |
| „ „ „ | | 64 315 |
| Gesomyrmex | | 69 621 |
| Gesteins-Bildung | | 62 641 |
| „ Concretionen | | 68 297 |
| Geyerit | | 69 315 |
| Gilbertit | | 61 662 |
| Glagerit | | 64 235 |
| Glanzkobalt | 1868 | 848 |
| Glaserit | | 61 185 |
| Glauberit | | 61 92 |
| Glaubersalz | | 63 669 |
| Glaukodot | 1867 477 | 67 712 |
| Glaukonit | 60 634 | 63 373 |
| „ | 66 600 | 68 360 |
| Gletscher | 61 105 | 67 621 |
| „ | 68 156 | 68 225 |
| „ -Perioden | 60 741 | 60 831 |
| Glimmer | 60 568 | 61 486 |
| „ | 62 795 | 62 951 |
| „ | 63 91 | 63 304 |
| „ | 63 466 | 63 476 |
| „ | 66 351 | 69 179 |
| „ nach Andalusit | | 63 467 |
| „ „ Cordierit | | 63 197 |
| „ „ Hornblende | | 63 364 |
| „ „ „ | | 65 263 |
| „ „ Spinell | | 65 262 |
| „ „ Zoisit | | 68 806 |
| „ mit Turmalin- und Granat-Einschluss | | 60 442 |
| „ -Melaphyr | | 63 439 |
| „ -Porphyrit | | 61 495 |
| „ „ | | 63 257 |
| „ -Syenit | | 64 405 |
| Glimmertrapp | | 65 1 |
| Glinkit | | 60 230 |
| Globosit | | 65 743 |
| Glossopteris | | 64 634 |
| „ Browniana | | 69 119 |
| „ Sutherlandi | | 69 119 |
| Glyphea | | 61 368 |
| Glyptocrinus | | 62 243 |
| „ Flatheanus | | 67 286 |
| Glyptocystites | | 62 244 |
| Glyptodipterinen | | 67 504 |
| Glyptodon | 63 382 | 65 376 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Glyptodon | 1867 | 123 |
| Glyptolaemus | 62 | 377 |
| Gmelinit | 60 | 78 |
| Gnathodontia | 60 | 755 |
| Gneiss | 1861 257 | 61 613 |
| „ | 63 1 | 63 108 |
| „ | 62 810 | 62 851 |
| „ | 63 203 | 63 316 |
| „ | 63 531 | 63 595 |
| „ | 63 613 | 64 22 |
| „ | 64 390 | 64 829 |
| „ | 65 290 | 66 740 |
| „ | 67 165 | 67 487 |
| „ | 68 358 | 69 96 |
| „ | 69 292 | 69 296 |
| „ amphoterer | | 67 617 |
| „ bojischer | | 69 99 |
| „ grauer | | 64 389 |
| „ rother | 64 388 | 67 617 |
| „ hercynischer | | 69 99 |
| Gneissit | | 67 165 |
| Gobius Nassoviensis | | 65 604 |
| Göthit | | 64 478 |
| Gold | 61 602 | 61 666 |
| „ | 61 854 | 62 352 |
| „ | 63 463 | 63 472 |
| „ | 65 245 | 65 323 |
| „ | 66 598 | 66 603 |
| „ | 66 605 | 67 196 |
| „ | 67 235 | 67 443 |
| „ | 67 719 | 68 748 |
| Gomphoceras Alphaeus | | 60 667 |
| Goniasteroidocrinus | | 60 498 |
| Goniatiten | 62 284 | 64 614 |
| „ | | 64 751 |
| Goniatites | | 67 754 |
| „ Bronni | | 62 304 |
| „ compressus | | 62 306 |
| „ divisus | | 62 298 |
| „ falcifer | 62 292 | 62 324 |
| „ globosus | | 62 294 |
| „ Hercynicus | | 62 323 |
| „ intumescens | | 62 324 |
| „ linearis | 62 296 | 62 317 |
| „ Münsteri | 62 302 | 62 322 |
| „ ovatus | | 62 290 |
| „ Petraeus | | 62 291 |
| „ planidorsatus | | 62 300 |
| „ „ | | 62 319 |
| „ quadripartitus | | 62 297 |
| „ retrorsus | | 62 314 |
| „ Sandbergeri | | 62 320 |
| „ subbilobatus | | 62 302 |
| „ „ | | 62 321 |
| „ subglobosus | | 62 295 |
| „ subinvolutus | | 62 305 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Goniatites sublinearis | 1862 | 295 |
| „ subpartitus | 62 | 291 |
| „ trullatus | 62 | 324 |
| „ undulosus | 62 | 293 |
| „ Ungeri | 62 | 301 |
| „ Verneuili | 62 | 290 |
| Goniobates Agassizi | 62 | 753 |
| Goniocylindrites | 63 | 504 |
| Goniophorus | 62 | 508 |
| Goodallia | 60 | 766 |
| Gordia marina | 64 | 1 |
| Graminites Feistmanteli | 65 | 392 |
| Grammatit | 1862 353 | 67 307 |
| „ | 67 | 782 |
| Granat | 63 | 96 |
| „ | 63 911 | 64 627 |
| „ | 64 819 | 66 194 |
| „ | 67 165 | 67 196 |
| „ | 67 452 | 68 605 |
| „ | 68 745 | 69 487 |
| „ weisser | 62 | 867 |
| „ -Perimorphosen | 61 | 333 |
| Granatin | 69 | 93 |
| Granit | 61 856 | 62 358 |
| „ | 62 370 | 62 769 |
| „ | 62 897 | 62 958 |
| „ | 63 16 | 63 113 |
| „ | 63 206 | 63 474 |
| „ | 63 850 | 64 23 |
| „ | 64 397 | 64 852 |
| „ | 65 863 | 65 244 |
| „ | 65 481 | 66 145 |
| „ | 67 107 | 67 209 |
| „ | 67 513 | 67 641 |
| „ | 67 730 | 67 732 |
| „ | 68 358 | 68 391 |
| „ | 68 611 | 69 260 |
| „ | 69 377 | 69 756 |
| „ vom Julier | | 60 726 |
| Granitit | | 60 355 |
| Granulit | | 65 242 |
| Graphit | 60 263 | 61 602 |
| „ | 63 726 | 65 309 |
| „ | | 69 101 |
| Graphitschiefer | | 60 264 |
| Graphiurus callopterus | | 67 125 |
| Graptolithen | 63 114 | 66 211 |
| „ | 68 874 | 67 874 |
| „ | | 68 374 |
| Graptolithinen | | 66 121 |
| Graptolithus | 66 121 | 68 374 |
| Graptolithenschiefer | | 67 251 |
| Grauerze | | 67 203 |
| Greenovit | | 68 479 |
| Grengesit | | 62 188 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Grenzgebilde zwischen Keuper und Lias | 1860 | 293 |
| Griffelzähner | 60 | 245 |
| Griphornis longicaudatus | 63 | 246 |
| Griphosaurus problematicus | 63 | 245 |
| Grobkalk | 67 | 509 |
| Grüneisenerz nach Triphyllin | 64 | 72 |
| Grüneisenstein | 64 | 76 |
| Grünsand | 1861 202 | 63 123 |
| „ | 67 622 | 69 808 |
| Grünstein-Trachyt | 66 604 | 66 735 |
| „ „ | | 67 227 |
| Grundwasser | | 68 94 |
| Gryphaea vesicularis | | 65 146 |
| Guano | 61 206 | 62 184 |
| Guano | 1863 221 | 64 866 |
| Gummierz | | 60 581 |
| Gurgulho | | 61 233 |
| Gurkenkern-Schicht | | 60 297 |
| Guttensteiner Kalk | 60 845 | 62 886 |
| Gymnit | | 67 609 |
| Gyps | 61 660 | 63 666 |
| „ | 65 873 | 67 206 |
| „ | 67 307 | 67 317 |
| „ | 68 576 | 69 321 |
| Gyracanthus formosus | | 63 391 |
| Gyrodus | | 64 253 |
| Gyrolith | | 62 191 |
| Gyromices Ammonis | | 63 248 |
| Gyttja | | 63 144 |

## H.

| | | |
|---|---|---|
| Haarkies | 1864 | 80 |
| Haarsalz | 63 | 669 |
| Hadrosaurus Foulkei | 61 | 753 |
| Hagemannit | 67 | 193 |
| Haidingerit | 68 | 349 |
| Haimeophyllum | 63 | 506 |
| Halianassa Collini | 68 | 246 |
| Halitherium Schinzi | 62 | 385 |
| Hallstätter Kalk | 60 | 847 |
| „ Schichten | 61 | 243 |
| Halysites | 69 | 853 |
| Harmotom | 61 332 | 67 430 |
| Hartit | 63 | 683 |
| Hartungia | 60 | 376 |
| „ typica | 62 | 32 |
| Hatchettin | 64 | 687 |
| Hausmannit | 64 | 358 |
| Hauyn | 61 188 | 67 306 |
| „ | 67 311 | 68 606 |
| „ | | 69 329 |
| „ -Fels | | 68 83 |
| Hebung in historischer Zeit | | 62 732 |
| Hebungs-Systeme | | 61 209 |
| „ Wellen | | 60 849 |
| Hefriga | | 63 377 |
| Heidenloch-Schichten | | 66 608 |
| Heidenschanzen | | 69 762 |
| Helianthaster Rhenanus | | 63 382 |
| Helicotoma | | 62 247 |
| Helicidaris | | 61 112 |
| Helladotherium Duvernoyi | | 61 767 |
| Hellia gryphus | | 65 149 |
| Helluomorpha protogaea | | 63 818 |
| Helminthodes antiquus | | 65 55 |
| Helvetan | | 68 348 |
| Helvin | | 69 744 |
| Hemiaster Toucasanus | | 69 817 |
| Hemicidaris | | 65 141 |
| Hemimorphit | 1867 | 314 |
| Hessenbergit | 1864 232 | 66 363 |
| Hessit | | 68 844 |
| Heterocrinus | | 62 243 |
| Heteromorphie | | 60 705 |
| „ des kohlensauren Kalkes | | 61 179 |
| Heterosit | | 63 828 |
| Heterostichus | | 60 254 |
| Heterostomella | | 66 489 |
| Hjelmit | 60 790 | 61 330 |
| Hierlatz-Schichten | | 62 59 |
| Himantopterus | | 61 252 |
| Hinnites quadricostatus | | 62 44 |
| „ Reissi | | 62 44 |
| Hipparion | 60 877 | 64 255 |
| „ Mediterraneum | | 61 367 |
| Hippurites | | 64 512 |
| Hisingerit | | 69 345 |
| Hislopit | | 60 444 |
| Höhlenbär | | 63 617 |
| Hölzer, versteinerte | | 60 120 |
| Hörnesit | | 61 331 |
| Hoevelit | | 63 568 |
| Hohlräume in Krystallen | | 64 78 |
| Holmesit | | 67 770 |
| Holoptychius Portlocki | | 65 389 |
| Homoeolepis | | 60 252 |
| „ drosera | | 60 252 |
| „ minor | | 60 253 |
| Homoeosaurus | | 68 26 |
| Honigstein | 61 84 | 61 719 |
| „ | | 63 686 |
| Hoplocrinus dipentas | | 67 638 |
| Hormotoma | | 62 247 |
| Hornblende | 61 430 | 62 946 |
| „ | 63 306 | 63 477 |
| „ | 67 529 | 67 530 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Hornblende . . 1868 | 53 | 68 88 |
| „ . . . . . | 69 | 179 |
| „ -Gestein . . . | 67 | 369 |
| „ -Granit . . . . | 62 | 573 |
| „ -Schiefer . . . | 61 | 232 |
| Hornbuck-Schichten . . . | 66 | 608 |
| Hornfels . . . . 62 | 803 | 62 844 |
| „ . . . . . | 63 | 897 |
| Hornsilber . . . . . | 69 | 449 |
| Hornstein-Porphyr . . . | 60 | 143 |
| Houghit . . . . . | 66 | 720 |
| Hovit . . . . . | 63 | 836 |
| Howardit . . . . 62 | 997 | 65 321 |
| Hübnerit . . . . . | 66 | 86 |
| Hunterit . . . . . | 60 | 570 |
| Hyacinth . . . . . | 67 | 476 |
| „ von Compostella . | 64 | 778 |
| Hyaena Chaeretis . . . . | 62 | 121 |
| Hyaenictis graeca . . . . | 62 | 121 |
| Hyalith . . . . . 61 | 574 | 61 583 |
| Hyalomelan . . . . . | 69 | 346 |
| Hyalophan . . . 64 | 709 | 67 102 |
| „ . . . . . | 68 | 204 |
| Hybocrinus . . . . . | 62 | 242 |
| Hydractinia . . . . . | 68 | 249 |
| Hydrargyllit . . . 69 | 579 | 69 749 |
| Hydrobia angulifera . . | 65 | 53 |
| „ Schwarzenbergeri | 65 | 53 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Hydromagnesit . . . . . | 1861 | 695 |
| Hydrometamorphismus . . . | 63 | 113 |
| Hydrotachylyt . . . . . | 69 | 32 |
| Hydrotalkit . . . . . | 66 | 720 |
| Hydrotephroit . . . . . | 67 | 607 |
| Hydrozinkit . . . . . | 67 | 436 |
| Hylaea marginata . . . . | 62 | 35 |
| Hylerpeton . . . . . | 63 | 235 |
| Hymenocyclus concameratus | 65 | 140 |
| „ rugosus . . | 65 | 140 |
| Hymenopteren . . . . . | 68 | 635 |
| Hymniphoria . . . . . | 61 | 246 |
| Hyolithes Hofensis . . . . | 68 | 689 |
| „ imperfectus . . | 68 | 688 |
| Hyolonomus aciedentatus . | 63 | 235 |
| „ Lyelli . . . . | 63 | 235 |
| „ Wymanni . . . | 63 | 235 |
| Hyotherium Meissneri . . . | 63 | 619 |
| „ Soemmeringi . | 69 | 879 |
| Hyperit . . . . . | 69 | 357 |
| Hypersthen . . 1862 | 945 | 69 368 |
| Hypersthenit . . . 64 | 493 | 69 377 |
| Hypoclinea . . . 69 | 621 | 69 622 |
| Hypocrinus Schneideri . . | 63 | 383 |
| Hypostilbit . . . . . | 67 | 200 |
| Hypsocormus . . . . 60 | 504 | 60 506 |
| „ insignis . . . | 60 | 507 |
| Hystrix . . . . . | 60 | 864 |

## I.

| | | |
|---|---|---|
| Jade . . . . . | 1864 | 75 |
| Jättegryttor . . . . . | 60 | 46 |
| Jamesonit . . . . . | 68 | 747 |
| Janira quinquecostata . . . | 69 | 830 |
| Jarosit . . . . . | 64 | 362 |
| Jaulingit . . . . . | 63 | 684 |
| Ichnites lithographicus . . | 63 | 377 |
| Ichtyerpeton . . . . . | 66 | 379 |
| Ichtyolithen . . . . . | 64 | 753 |
| Ichthyopterygia . . . . . | 60 | 753 |
| Ichthyosaurus . . . . . | 61 | 375 |
| „ Cuvieri . . . | 62 | 756 |
| „ Normanniae . | 62 | 757 |
| Idmonea cenomana . . . . | 65 | 136 |
| „ irregularis . . . | 65 | 137 |
| „ pseudodisticha . . | 65 | 136 |
| „ ramosa . . . . | 65 | 136 |
| „ unipora . . . . | 65 | 136 |
| Idokras . . . . . 63 | 557 | 64 847 |
| „ . . . . . 64 | 841 | 65 81 |
| Jeanpaulia Schlagintweitiana | 63 | 412 |
| Jefferisit . . . . 66 | 598 | 67 431 |
| Jelin . . . . . | 62 | 384 |
| Illaena . . . . . 65 | 365 | 65 507 |
| Illaenus . . . . . | 63 | 632 |

| | | |
|---|---|---|
| Ilmenit . . . . . | 1867 | 104 |
| Imatrasteine . . 1861 | 304 | 68 299 |
| Infulaster major . . . . . | 69 | 819 |
| Infundibulum cretaceum . . | 65 | 150 |
| Inocaulis . . . . . | 66 | 123 |
| Inoceramenthon . . . . . | 66 | 239 |
| Inoceramus acuteplicatus . | 65 | 147 |
| „ expansus . . | 65 | 147 |
| Insecten fossile . 61 | 255 | 64 865 |
| Insel-Bildung . . . . . | 60 | 213 |
| Inzersdorfer Schichten . . | 60 | 735 |
| „ „ . . | 63 | 380 |
| Jodblei . . . . . | 67 | 159 |
| Jollyt . . . . . | 65 | 742 |
| Jordanit . . . . 64 | 711 | 67 203 |
| Irisiren . . . . . | 65 | 824 |
| Isis teisenbergensis . . . | 65 | 134 |
| Itabirit . . . . . | 60 | 853 |
| Itakolumit . . . 60 | 853 | 60 855 |
| „ . . . . . | 61 | 232 |
| Ittnerit . . . . . 67 | 770 | 69 346 |
| Juglans laevigata . . . . | 66 | 54 |
| „ ventricosa . . . . | 66 | 54 |
| Juliergranit . . . . . | 60 | 726 |
| Jura-Formation . . 60 | 583 | 60 836 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Jura-Formation . 1861 | 63 | 706 |
| „ „ . . 62 363 | 62 | 745 |
| „ „ . . 62 748 | 63 | 744 |
| „ „ . . 62 757 | 64 | 103 |
| „ „ . . 64 802 | 65 | 244 |
| Jura . . . . . | 66 | 370 |
| „ -Formation . . 66 570 | 66 | 639 |
| „ „ . . 67 142 | 68 | 238 |
| „ . . . . . | 68 | 361 |
| „ „ . . 68 490 | 68 | 759 |
| Jura-Formation . . . . | 1869 | 595 |
| Jura, brauner . 1866 | 862 67 | 39 |
| „ „ . . . . | 67 | 507 |
| „ schwarzer . . . . | 67 | 39 |
| „ weisser . . 65 | 789 66 | 608 |
| „ „ . . . . . | 68 | 540 |
| Jurensis-Mergel . . . . | 67 | 51 |
| Ivigtit . . . . . | 69 | 234 |
| Ixolyt . . . . . | 63 | 684 |


## K.


| | | |
|---|---|---|
| Kablikia dyadica . . . 1862 | | 118 |
| Kacholong . . . . . | 61 | 703 |
| „ nach Quarz . . | 67 | 833 |
| Kämmererit . . . . 61 | 699 63 | 93 |
| „ . . . . 65 | 620 68 | 77 |
| Kännelkohle . . . . . | 67 | 492 |
| Kaidacarpum . . . . . | 68 | 873 |
| Kainit . . . . . 65 | 310 65 | 602 |
| „ . . . . . 65 | 859 66 | 337 |
| Kakoxen . . . . 68 | 82 64 | 702 |
| Kalialaun . . . . . | 63 | 671 |
| Kaliglimmer . . . . . | 69 | 842 |
| Kalk, glaukonitischer . . . | 67 | 735 |
| „ körniger . . 61 | 495 66 | 465 |
| „ „ . . 67 | 620 67 | 731 |
| „ „ . . . . | 69 | 732 |
| „ kohlensaurer, Heteromorphie desselben . | 61 | 179 |
| „ Stramberger . . . . | 60 | 678 |
| „ -Eisengranat . . . . | 67 | 433 |
| „ -Geschiebe mit Eindrücken . | 63 | 801 |
| „ „ hohle . . | 67 | 111 |
| „ -Natronfeldspath . . | 67 | 536 |
| Kalkspath . . . . 60 | 535 61 | 183 |
| „ . . . . 61 | 423 62 | 350 |
| „ . . . . 62 | 684 63 | 678 |
| „ . . . . 64 | 241 65 | 725 |
| „ . . . . 66 | 230 66 | 452 |
| „ . . . . 67 | 98 67 | 198 |
| „ . . . . 67 | 315 67 | 359 |
| „ . . . . 67 | 718 68 | 347 |
| „ . . . . 68 | 351 68 | 481 |
| „ . . . . 68 | 603 68 | 606 |
| „ . . . . 69 | 9 69 | 12 |
| „ . . . . 69 | 317 69 | 367 |
| „ . . . . 69 | 449 69 | 477 |
| Kalkthongranat . . 67 | 776 67 | 433 |
| Kalktuff . . . . . | 66 | 579 |
| Kalkuranit . . . . . | 61 | 184 |
| Kallaïs . . . . . | 65 | 475 |
| Karneol . . . . . | 61 | 487 |
| „ -Schicht . . . . . | 64 | 739 |
| Karpathensandstein . . . | 1860 | 90 |
| Karphosiderit . . . . . | 64 | 625 |
| Kassiterit . . . . . | 67 | 437 |
| Kataspilit . . . . . | 68 | 203 |
| Keramohalit . . . . . | 63 | 699 |
| Keraterpeton . . . . . | 66 | 379 |
| „ Galvani . . . | 66 | 622 |
| Kern-Concretionen . . . . | 68 | 300 |
| „ -Krystalle . . . . | 60 | 350 |
| Kerolith . . . . . | 65 | 859 |
| Kersantit . . . . . | 63 | 439 |
| Kersanton . . . . . | 63 | 439 |
| Keuper . . . . . 60 | 517 68 | 217 |
| Kiesel-Geräthe . . 61 | 92 61 | 108 |
| „ -Schiefer . . . . . | 62 | 805 |
| „ -Wismuth . . . . . | 69 | 576 |
| „ -Zink . . . . . | 61 | 324 |
| Kieserit . . . . 61 | 493 61 | 574 |
| „ . . . . 66 | 341 68 | 469 |
| Kinzigit . . . . 60 | 797 61 | 641 |
| Kirchneria . . . . . | 62 | 119 |
| Kirrolith . . . . . | 69 | 481 |
| Kischtim-Parisit . . . . . | 63 | 100 |
| Klappersteine . . . . . | 68 | 305 |
| Klinochlor . . . . 63 | 92 66 | 351 |
| „ . . . . 66 | 315 67 | 430 |
| „ nach Vesuvian . | 65 | 86 |
| Klippenkalk . . . . . | 60 | 450 |
| Klipsteinit . . . . 66 | 354 66 | 452 |
| „ . . . . . | 66 | 569 |
| Knochen-Breccien . . . . | 61 | 101 |
| „ -Höhlen . . 60 | 93 60 | 629 |
| „ „ . 60 | 743 61 | 719 |
| „ „ . 61 | 755 62 | 218 |
| „ „ . 62 | 755 63 | 244 |
| „ „ . . . . | 65 | 767 |
| „ Sand . . . . . | 64 | 637 |
| Kobalt-Beschlag . . . . . | 66 | 195 |
| „ -Fahlerz . . . . . | 64 | 223 |
| „ -Nickelkies . . . . | 62 | 1001 |
| Kobellit . . . . . | 62 | 1000 |
| Kochelit . . . . . | 68 | 607 |
| Könlit . . . . . | 63 | 683 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Kohlen-Gebirge | 1862 609 | 63 687 |
| „ „ | | 64 655 |
| „ -Kalk | 63 383 | 65 886 |
| „ -Schiefer | | 67 236 |
| Kokscharowit | | 63 585 |
| Kolonien | | 60 62 |
| Konarit | | 65 857 |
| Konit | | 61 697 |
| Koprolithen | 62 351 | 64 630 |
| Korallen | 60 635 | 64 250 |
| „ | 66 510 | 67 634 |
| „ -Kalk | | 67 547 |
| Korund | 65 479 | 67 103 |
| „ | 67 313 | 67 782 |
| Korynit | | 65 50 |
| Kotschubeit | | 63 836 |
| Krabben, fossile | | 60 125 |
| Kreide | 63 218 | 63 126 |
| „ | 63 865 | 69 137 |
| „ mit Feuersteinschichten | | 60 221 |
| „ -Flora | 68 243 | 69 114 |
| „ -Formation | 60 88 | 60 91 |
| „ „ | 60 102 | 60 594 |
| „ „ | 60 851 | 64 112 |
| „ „ | 64 121 | 64 733 |
| „ „ | 66 482 | 66 494 |
| „ „ | 67 634 | 67 664 |
| „ „ | 67 795 | 68 119 |
| „ „ | 68 232 | 69 493 |
| Krokoit | | 61 184 |
| Kruster, fossile | | 60 864 |
| „ silurische | | 60 639 |
| Kryolith | 62 186 | 67 314 |
| Kryolith | 1867 | 810 |
| Kryophyllit | | 68 201 |
| Kryptolin | | 64 78 |
| Krystall-Concretionen | | 68 295 |
| Kugeldiorit | | 63 207 |
| Kugelporphyr | | 63 102 |
| Kupfer | 1860 79 | 60 573 |
| „ | 60 574 | 61 181 |
| „ | 61 523 | 61 542 |
| „ | 63 697 | 64 855 |
| „ | 69 1 | 69 13 |
| „ -Bleiglanz | | 60 79 |
| „ -Blüthe | | 61 521 |
| „ -Erze | 63 872 | 64 129 |
| „ „ | 64 741 | 67 612 |
| Kupfererz-Lager | | 60 612 |
| „ -Lagerstätten | | 61 513 |
| Kupferglanz | 61 524 | 62 601 |
| „ | 64 147 | 65 726 |
| „ | | 67 195 |
| Kupferindig nach Fahlerz | | 66 201 |
| Kupferkies | 63 674 | 65 352 |
| „ | 65 861 | 66 227 |
| „ | 67 195 | 68 413 |
| „ | | 69 305 |
| Kupfer-Lasur | 61 278 | 64 148 |
| „ -Nickel | 68 411 | 69 313 |
| „ -Pecherz | | 61 486 |
| „ -Schaum | | 61 574 |
| „ -Schwärze | | 64 147 |
| „ -Wismuthglanz | 67 99 | 69 847 |
| Kupfferit | 63 586 | 67 191 |


## L.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Labrador-Diorit | 1866 | | 641 |
| Labradorit | 60 390 | | 62 935 |
| „ | 1863 715 | | 68 480 |
| „ -Diorit | | | 69 93 |
| Labyrinthodonten | 63 236 | | 66 379 |
| Labyrinthodontia | | | 60 753 |
| Lacertilia | | | 60 756 |
| Lacunosa-Schichten | | | 63 758 |
| Lagena | | | 63 500 |
| Lampromyrmex | | | 69 624 |
| Lamprophan | | | 67 612 |
| Lamprosaurus Goepperti | | | 60 560 |
| Lampterocrinus | | | 60 759 |
| Landschneckenkalk | | | 64 637 |
| Langit | | | 65 324 |
| Lanthanit | | | 63 592 |
| Lasius | | | 69 622 |
| Lasurstein | 60 440 | | 69 345 |
| Laumontit | 65 478 | | 67 304 |
| „ | 67 308 | | 69 9 |
| Laumontit | 1869 | 12 | 69 374 |
| Laurentian-Gruppe | | | 65 805 |
| Laurit | 1866 829 | | 69 863 |
| Lava | 65 622 | | 65 711 |
| „ | 66 459 | | 66 667 |
| „ | 66 769 | | 66 837 |
| „ | 67 484 | | 68 553 |
| „ | 69 42 | | 69 167 |
| „ | | | 69 652 |
| Lavenströme der Eifel | | | 61 95 |
| Lawrowit | | | 67 193 |
| Laxmannit | | | 69 371 |
| Lazulith | 61 191 | | 67 106 |
| „ | | | 67 437 |
| Leadhillit | | | 68 319 |
| Leaia Baentschiana | 64 657 | | 65 389 |
| „ „ | | | 65 841 |
| „ Leidyi | | | 64 657 |
| Lebacher Schichten | | | 65 839 |
| Leda Deffneri | | | 62 156 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Leda infraliasina | 1864 | 297 |
| Ledererit | 68 | 350 |
| Leitfossilien | 66 | 638 |
| Leithakalk | 60 | 238 |
| Leopoldit | 1866 | 331 |
| | 68 | 469 |
| Lepadiden | 65 | 251 |
| Lepholepis irregularis | 65 | 136 |
| Lepidodendron Serlii | 69 | 463 |
| Lepidolith | 62 | 600 |
| | 67 | 312 |
| Lepterpeton | 66 | 379 |
| Leptophlocum | 63 | 231 |
| Leptoteuthis | 62 | 249 |
| Leptothorax | 69 | 624 |
| Legumen | 61 | 763 |
| Lettenkohle | 63 | 494 |
| | 63 | 793 |
| „ | 66 | 843 |
| | 68 | 623 |
| „ | 69 | 585 |
| Leuchtenbergit | 67 | 859 |
| | 69 | 203 |
| Leuciscus eurystomus | 62 | 895 |
| „ Krantzi | 62 | 895 |
| „ plesiopterus | 62 | 895 |
| „ remotus | 62 | 895 |
| Leucit | 65 | 681 |
| | 65 | 685 |
| „ | 67 | 305 |
| | 67 | 432 |
| „ | 68 | 609 |
| | 69 | 178 |
| „ -Gestein | 69 | 755 |
| „ -Pseudomorphosen | 60 | 61 |
| Leucitophyr | 64 | 473 |
| Lherzolith | 63 | 95 |
| Lias | 60 | 839 |
| | 63 | 162 |
| „ | 63 | 215 |
| | 63 | 748 |
| „ | 63 | 863 |
| | 64 | 213 |
| „ | 67 | 39 |
| | 68 | 620 |
| „ | 69 | 378 |
| | 69 | 724 |
| „ unterer | 60 | 306 |
| | 60 | 312 |
| „ -Flora | 61 | 348 |
| „ -Pflanzen | 61 | 217 |
| Lichas | 66 | 638 |
| „ primulus | 68 | 679 |
| Lievrit | 61 | 183 |
| | 67 | 363 |
| Lignit | 65 | 354 |
| Lima | 69 | 624 |
| „ alpis sordidae | 64 | 299 |
| „ aspera | 65 | 147 |
| Lima dupla | 1864 | 298 |
| „ granulata | 69 | 831 |
| „ guestphalica | 69 | 832 |
| Limaria | 63 | 505 |
| Limopsis | 63 | 380 |
| „ Belcheri | 66 | 500 |
| Limulus Decheni | 1863 | 249 |
| | 63 | 868 |
| Linarit | 62 | 87 |
| | 64 | 843 |
| „ | 69 | 479 |
| Linearia | 61 | 763 |
| Lingula Bavarica | 68 | 690 |
| „ cedens | 68 | 691 |
| „ humillima | 68 | 691 |
| „ inchoans | 68 | 692 |
| „ Wirthi | 68 | 691 |
| „ Flags | 68 | 376 |
| Lingulella | 68 | 374 |
| Lingulinopsis | 60 | 636 |
| Linthia blombergensis | 64 | 313 |
| Litorinella adversa | 65 | 52 |
| „ complanata | 65 | 52 |
| „ obtusa | 65 | 51 |
| „ turrita | 65 | 52 |
| Litorinellenkalk | 64 | 637 |
| Lithionit | 64 | 476 |
| | 67 | 781 |
| Lithophysen | 66 | 733 |
| Löllingit | 67 | 715 |
| Löss | 67 | 119 |
| | 67 | 143 |
| „ | 67 | 676 |
| Löwigit | 61 | 848 |
| Lonchopteris rugosa | 64 | 171 |
| Lophiodon | 62 | 637 |
| | 66 | 245 |
| „ communis | 62 | 895 |
| „ Isselensis | 65 | 26 |
| Lophoctenium Hallanum | 61 | 66 |
| „ Hartungi | 64 | 5 |
| Lophoit nach Strahlstein | 66 | 828 |
| Loxodon | 66 | 380 |
| Loxonema | 62 | 247 |
| Loxoma Allmanni | 63 | 236 |
| Luxullian | 65 | 477 |
| Lutetia | 60 | 766 |
| Lysis | 65 | 732 |


## M.


| | | |
|---|---|---|
| Maare | 1869 | 843 |
| Machaeracanthus | 63 | 381 |
| Macrauchenia Boliviensis | 62 | 632 |
| Macromischa | 69 | 624 |
| Macrophlebium Hollebeni | 69 | 164 |
| Macropoma Mantelli | 65 | 153 |
| Magila | 63 | 376 |
| Magnesiaglimmer | 67 | 781 |
| Magnesit | 63 | 468 |
| | 66 | 456 |
| Magnesit | 1867 | 316 |
| | 67 | 436 |
| | 60 | 60 |
| | 61 | 578 |
| „ | 61 | 582 |
| | 63 | 601 |
| „ | 64 | 148 |
| | 65 | 684 |
| „ | 67 | 196 |
| | 67 | 534 |
| „ | 67 | 836 |
| | 68 | 88 |
| „ | 69 | 178 |
| | 69 | 513 |
| „ | | 749 |
| „ nach Augit | | 363 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Magneteisen nach Chrysotil | 1867 | 175 |
| Magnetismus | 60 | 568 |
| Magnetkies . . 1869 368 | 69 | 441 |
| „ | 69 | 863 |
| Malachit . . . . 61 487 | 64 | 146 |
| „ . 65 49 67 196 | 67 | 317 |
| „ nach Kalkspath | 66 | 828 |
| „ „ Kupfer | 68 | 805 |
| Malocystites | 62 | 244 |
| Malakolith | 68 | 355 |
| Mammuth . . . . 66 757 | 69 | 638 |
| „ | 69 | 876 |
| Mandeln . . . . 60 234 | 61 | 83 |
| Mandelsteine | 63 | 846 |
| Manganblende . . 61 665 | 66 | 409 |
| „ | 67 | 828 |
| Manganepidot | 68 | 203 |
| Manganit | 66 | 724 |
| Manganspath | 61 | 456 |
| Mangrove-Baum | 60 | 213 |
| Marcelin | 64 | 358 |
| Marcylit | 66 | 454 |
| Margarit . . . . 62 351 | 67 | 105 |
| „ | 67 | 770 |
| Margarodit | 67 | 199 |
| Markasit . . . . 60 714 | 66 | 724 |
| „ nach Glaserz | 69 | 480 |
| „ „ Zinnober | 67 | 716 |
| Marlekor | 68 | 299 |
| Martit | 65 | 238 |
| Massospondylus carinatus | 60 | 382 |
| Mastodon . . . . 67 785 | 69 | 512 |
| „ tapiroides 61 371 | 66 | 576 |
| Matheria | 62 | 246 |
| Mazzalina | 61 | 765 |
| Mecochirus | 63 | 376 |
| Medolo | 62 | 767 |
| Medusen . . . . 66 244 | 66 | 256 |
| Medusites admirandus | 66 | 261 |
| „ lithographicus | 66 | 282 |
| Meeresgrund | 61 | 714 |
| Meeressand . . . 63 127 | 64 | 637 |
| „ | 65 | 181 |
| Meeresthon | 65 | 194 |
| Meerschaum | 67 | 860 |
| Megalania prisca | 60 | 869 |
| Megalodon chamaeformis | 62 | 1007 |
| „ columbella | 62 | 1007 |
| „ complanatus | 62 | 1007 |
| „ gryphoides | 62 | 1007 |
| „ Gumbelii | 65 | 766 |
| „ triqueter | 62 | 1007 |
| Megalodus | 62 | 759 |
| Megaphytum | 62 | 379 |
| Megatherium Americanum | 61 | 361 |
| Megistostoma | 65 | 732 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Meionit . . . 1862 489 | 63 | 583 |
| „ | 67 | 434 |
| Melania horrida | 65 | 54 |
| „ polymorpha | 65 | 54 |
| Melanit | 65 | 438 |
| Melanopsis costata | 65 | 53 |
| Melaphyr . . . . 60 1 | 63 | 840 |
| „ . . . . 65 344 | 69 | 374 |
| „ . . . . 69 5 | 69 | 7 |
| „ einfacher dichter | 60 | 13 |
| „ mandelsteinartiger | 60 | 13 |
| „ porphyrartiger | 60 | 13 |
| Meletta | 65 | 215 |
| Meliniae | 64 | 868 |
| Mellit . . . . 62 194 | 63 | 686 |
| Melonit | 68 | 845 |
| Melopsit | 69 | 232 |
| Membranipora bipunctata | 65 | 135 |
| „ pustulosa | 65 | 135 |
| Meneghinit | 68 | 354 |
| Menschen, fossile 66 502 | 67 | 243 |
| „ „ 67 871 | 68 | 248 |
| „ „ | 69 | 199 |
| „ -Geschlecht, Alter desselben | 60 | 638 |
| „ „ Alter dess. | 61 | 106 |
| „ -Reste im Löss | 60 | 860 |
| Mergel, blauer | 61 | 712 |
| „ lithionhaltiger | 68 | 360 |
| Merista | 61 | 772 |
| Mesitin | 67 | 436 |
| Mesolepidae | 67 | 126 |
| Mesoneuraster | 66 | 869 |
| Mesopithecus Pentelici | 63 | 618 |
| „ Pentelicus | 62 | 752 |
| Mesoplodon Christoli | 62 | 751 |
| Mesosiderit . . . 63 362 | 65 | 321 |
| Mesotyp | 60 | 60 |
| Messingblüthe | 66 | 599 |
| Metaxit | 66 | 721 |
| Metaxoit | 63 | 200 |
| Metamorphismus . . 60 727 | 60 | 817 |
| Metarctos | 61 | 767 |
| Meteoreisen . . . 61 316 | 61 | 699 |
| „ . . . . 62 109 | 62 | 597 |
| „ . . . . 62 606 | 64 | 71 |
| „ . . . . 63 203 | 65 | 359 |
| „ . . . . 66 808 | 67 | 365 |
| „ . 68 361 | 68 | 459 | 69 | 580 |
| Meteoriten . . . . 60 77 | 60 | 82 |
| „ . . . . 60 82 | 60 | 352 |
| „ . . . . 61 329 | 61 | 584 |
| „ . . . . 61 612 | 61 | 748 |
| „ . . . . 62 108 | 62 | 196 |
| „ . . . . 62 490 | 62 | 882 |
| „ . . . . 62 997 | 63 | 100 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Meteoriten | 1863 | 361 |
| „ | 1863 362 | 63 589 |
| „ | 64 236 | 64 476 |
| „ | 65 99 | 66 400 |
| „ | 66 738 | 66 826 |
| „ | 66 831 | 67 371 |
| „ | 67 718 | 67 724 |
| „ | 68 216 | 68 326 |
| „ | 68 467 | 68 498 |
| „ | 69 80 | 69 371 |
| „ | 69 727 | 69 758 |
| „ | | 69 866 |
| Miamia Bronsoni | | 64 865 |
| Miascit | 1862 491 | 67 613 |
| Michelinia | | 63 505 |
| Micraster breviporus | | 69 819 |
| „ brevis | | 65 143 |
| „ cor anguinum | | 65 143 |
| „ „ testudinarium | | 69 818 |
| Microlestes antiquus | | 60 694 |
| Micropsalis papyraceus | | 60 377 |
| Mikrostructur | | 64 494 |
| Millerit | 60 716 | 62 602 |
| „ | | 64 217 |
| Mineral-Bildung, secundäre | | 60 576 |
| „ -Concretionen | | 68 295 |
| „ -Quellen | | 65 752 |
| „ -Quelle von Geilnau | | 60 443 |
| „ „ vom Faulbrunnen, Wiesbaden | | 60 444 |
| „ -Quellen von Grosswardein | | 60 79 |
| „ „ von Bikszad | | 60 80 |
| „ -Quelle v. Schützenhof, Wiesbaden | | 60 569 |
| Minette | 60 724 | 61 495 |
| „ | 63 257 | 63 418 |
| „ | 63 478 | 65 745 |
| Miocän | | 61 197 |
| Miolophus | | 66 128 |
| Misspickel | 61 664 | 67 197 |
| „ | | 68 79 |
| Mitra aperta | | 62 25 |
| „ Volvaria | | 62 25 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Mithracites Vectensis | 1861 | 384 |
| Mizzonit | 1863 584 | 63 721 |
| Modiola minuta | | 60 297 |
| Molasse | | 64 658 |
| Mollia guttata | | 65 134 |
| Molybdänglanz | 63 697 | 66 724 |
| „ | | 67 197 |
| Monazit | 64 72 | 65 237 |
| „ | | 67 106 |
| Monomorium | | 69 624 |
| Monotis similis | | 66 609 |
| Montanit | | 68 846 |
| Monticellit | | 61 90 |
| Monzon-Syenit | | 64 404 |
| Mordenit | | 65 236 |
| Morea | | 61 764 |
| Morelia papyracea | | 62 754 |
| Moresnetit | | 66 596 |
| Moronolit | | 66 454 |
| Mosasaurus | | 60 374 |
| Mossottit | | 61 331 |
| Münchberger Gneiss | | 61 258 |
| Multicresis variabilis | | 65 139 |
| Muntjac | | 60 871 |
| Murchisonites | | 61 631 |
| Murex octonarius | | 60 322 |
| Murmelthiere | | 66 868 |
| Muschelkalk | 63 857 | 63 790 |
| „ | 64 741 | 67 450 |
| „ | 67 632 | 69 211 |
| „ | | 69 584 |
| Muscovit | 67 306 | 67 311 |
| „ | 67 781 | 67 431 |
| Mustela Gamlitzensis | | 67 461 |
| Mustela Pentelici | | 62 121 |
| Müsenit | | 62 1001 |
| Myliobates pressidens | | 63 446 |
| Myophoria | 68 123 | 69 62 |
| „ Raibliana | | 66 38 |
| Myrdy | | 63 144 |
| Myriolepis Clarkei | | 64 753 |
| Myrmica | | 69 624 |
| Mytilus minutus | | 62 160 |
| „ pectinatus | | 65 148 |


## N.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Nagelflue | 1864 | 315 |
| Najaden | 60 | 124 |
| Nakrit | 1861 78 | 66 91 |
| „ nach Scheelit | | 67 70 |
| Nantokit | | 68 354 |
| Naphtha | 60 110 | 69 247 |
| Napoleon-Sandstein | | 63 372 |
| Nappberg-Schichten | | 66 609 |
| Natica acutemargo | | 65 150 |
| Natica athleta | 1865 | 150 |
| „ atlantica | | 62 33 |
| „ Hugardiana | | 65 150 |
| Naticiden | | 68 509 |
| Natrolith | 1860 60 | 67 77 |
| „ | 67 307 | 67 769 |
| Natronglimmer | | 63 466 |
| Nauckit | | 6 809 |
| Nautilus Bouchordianus | | 65 152 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Nautilus lingulatus | 1863 | 619 |
| „ parallelus | 65 | 152 |
| „ Pompilius | 66 | 120 |
| „ radiatus | 65 | 152 |
| „ undulatus | 65 | 152 |
| Nemapodia tenuissima | 61 | 66 |
| Nematura elongata | 65 | 52 |
| „ globosa | 65 | 52 |
| Neocom | 66 | 866 |
| Neolimulus falcatus | 68 | 372 |
| Nephelin | 1860 58 | 61 98 |
| „ | 65 686 | 67 79 |
| „ | 67 306 | 67 432 |
| „ | 67 779 | 68 87 |
| „ | 68 697 | 69 180 |
| „ | | 69 338 |
| „ -Dolerit | | 65 674 |
| Nephelinit | 64 82 | 69 485 |
| Nephrit | 65 79 | 65 618 |
| „ | 68 85 | 69 231 |
| Nereograpsus Jacksoni | | 64 4 |
| Nerineen | | 68 508 |
| Neritiden | | 68 509 |
| Neuropteriden | | 67 875 |
| Neuropteris | | 62 762 |
| „ acutifolia | | 64 169 |
| „ gigantea | | 64 169 |
| Neuropteris Loshi | 1864 | 168 |
| Nevadit | 68 | 852 |
| Nickelerze | 1861 488 | 66 457 |
| „ | | 67 718 |
| Nigrescit | | 68 202 |
| Nodicava rugosa | | 65 139 |
| Nodosaria | | 67 583 |
| Noeggerathia | 62 761 | 64 874 |
| „ aequalis | | 69 464 |
| „ Beinertiana | | 64 175 |
| „ distans | | 69 464 |
| „ expansa | | 69 458 |
| „ foliosa | | 65 391 |
| Nosean | 64 473 | 65 664 |
| „ | 67 306 | 68 88 |
| „ -Melanit-Gestein | | 63 842 |
| „ -Phonolith | | 64 475 |
| Notaeus laticaudus | | 60 584 |
| Nototherium Mitchelli | | 67 503 |
| Nucula maxima | | 65 148 |
| Nulliporenzone | | 66 501 |
| Nummuliten-Formation | | 60 949 |
| „ „ | | 63 219 |
| „ „ | | 63 506 |
| „ -Schichten | | 65 376 |
| Nymphaeops | | 63 758 |
| Nyssa rugosa | | 66 56 |


## O.


| | | |
|---|---|---|
| Obolella | 1864 | 379 |
| Obolus minor | 68 | 693 |
| „ palliatus | 68 | 693 |
| Obsidian | 68 | 487 |
| Odontopteris | 62 | 762 |
| Oecophylla | 69 | 621 |
| Ölformation | 66 | 237 |
| Ölkohle | 60 | 717 |
| Ölschiefer | 67 | 42 |
| Okenit | 66 | 91 |
| Oldhamia | 1861 631 | 66 122 |
| Olenus expectans | 68 | 678 |
| „ frequens | 68 | 677 |
| „ Gümbeli | 68 | 677 |
| Oligocän | 61 192 | 61 195 |
| „ | 66 501 | 66 631 |
| „ | 67 508 | 68 124 |
| „ | 69 635 | 69 637 |
| Oligoklas | 62 788 | 63 476 |
| „ -Granit | | 62 573 |
| „ -Trachyt | | 65 338 |
| Olivin | 61 696 | 63 95 |
| „ | 63 831 | 63 832 |
| „ | 64 628 | 65 443 |
| „ | 65 859 | 67 313 |
| „ | 67 435 | 68 88 |
| Olivin | 1869 179 | 69 357 |
| „ | 69 368 | 69 577 |
| Olivinfels | 65 449 | 66 76 |
| „ | 66 385 | 67 171 |
| „ | 67 480 | 68 90 |
| „ | | 68 723 |
| Ompalia | | 63 251 |
| Oncodendron | | 62 116 |
| Oolaster | | 69 451 |
| „ Mattseensis | | 69 455 |
| Opal nach Augit | | 63 363 |
| „ „ Nephelin | | 63 363 |
| Opatowitzer Kalk | | 63 857 |
| Operculina | | 61 618 |
| Ophiderpeton | | 66 379 |
| Ophidia | | 60 756 |
| Ophileta | | 62 247 |
| Ophiocrinus | | 61 639 |
| Opis similis | | 66 243 |
| Opis thocoelia | | 60 756 |
| Orangit | 60 569 | 63 830 |
| Orbitulipora | | 63 379 |
| Ornithopterus | | 60 764 |
| Ornithichniten | | 61 877 |
| Orthacanthus Decheni | | 68 122 |
| Orthis Bavarica | | 68 690 |

| | | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|---|
| Orthit | 1861 852 | 62 | 912 |
| „ | 63 471 | 63 | 722 |
| „ | 66 89 | 69 | 236 |
| Orthoceras | | 68 | 639 |
| „ pleurotomum | | 60 | 667 |
| „ truncatum | 60 644 | 60 | 664 |
| Orthoceratitenkalk | | 69 | 398 |
| Orthoklas | 61 430 | 62 | 787 |
| „ | 63 343 | 63 | 476 |
| „ | 63 908 | 67 | 305 |
| „ | 67 193 | 67 | 434 |
| „ | 67 541 | 67 | 779 |
| „ | 69 236 | 69 | 753 |
| Orthurus Sturii | | 67 | 125 |
| Osmelith | | 66 | 832 |
| Osteolith | | 67 | 833 |
| Ostrea curvirostris | | 65 | 146 |
| „ decurtata | | 65 | 146 |
| Ostrea flabelliformis | | 1865 | 146 |
| „ gryphoides | | 65 | 834 |
| „ hippodium | | 65 | 146 |
| „ Knorri | | 67 | 57 |
| „ lateralis | | 69 | 828 |
| „ praerupta | | 65 | 146 |
| „ sella | | 65 | 146 |
| „ vesicularis | | 65 | 146 |
| Otodus appendiculatus | | 69 | 833 |
| Otostoma | | 60 | 767 |
| Ottrelith | | 69 | 339 |
| Ottweiler Schichten | 1865 839 | 68 | 626 |
| Oudenodon | 60 381 | 60 | 482 |
| Ovibos moschatus | | 66 | 495 |
| Oxalit | | 63 | 680 |
| Ozokerit | 64 854 | 68 | 608 |
| Ozon | | 61 | 91 |


## P.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Pachnolith | 1863 | 828 | |
| „ | 66 | 833 | |
| Pachycormus | 60 | 501 | |
| „ crassus | 60 | 510 | |
| „ curtus | 60 | 510 | |
| „ elongatus | 60 | 510 | |
| Pachyocrinus | 62 | 242 | |
| Pachyodon | 62 | 378 | |
| Pachyspondylus | 60 | 382 | |
| Palaeastacus | 63 | 376 | |
| Palaeaster | 68 | 126 | |
| Palaeasterina | 62 | 245 | |
| Palaechinus | 66 | 627 | |
| Palaeobatrachus Meyeri | 62 | 895 | |
| Palaeocarabus Russelianus | 64 | 128 | |
| Palaeocetus Sedgwicki | 65 | 762 | |
| Palaeocrinus | 62 | 242 | |
| Palaeocystites | 62 | 245 | |
| Palaeomanon | 60 | 759 | |
| Palaeomeryx minor | 66 | 577 | |
| Palaeorhynchus giganteus | 61 | 247 | |
| Palaeosiren Beinerti | 64 | 513 | |
| Palaeotrochis | 68 | 875 | |
| Palagonit | 69 | 195 | |
| Palapteryx | 66 | 114 | |
| Palephemera mediaeva | 63 | 250 | |
| Paligorskit | 63 | 199 | |
| Palinurina | 64 | 376 | |
| Palissya Brauni | 63 | 405 | |
| Pallasit | 62 997 | 65 | 321 |
| Pallisyen-Sandstein | 63 | 406 | |
| Palmacites crassinervius | 65 | 371 | |
| Palpipes | 61 | 561 | |
| Paludina | 66 | 497 | |
| „ subfusca | 65 | 52 | |
| Paludinella annulata | 1865 | 52 | |
| Pampas-Formation | 63 | 872 | |
| Panderella | 62 | 509 | |
| Parachelys Eichstättensis | 64 | 207 | |
| Paradoxites Harlani | 60 429 | 65 | 107 |
| Paraffinkohle | 67 | 410 | |
| Paragonit | 67 312 | 69 | 748 |
| Paranthin | 62 | 489 | |
| Parisit | 65 | 238 | |
| Partnach-Schichten | 60 | 847 | |
| Partzit | 67 | 476 | |
| Pasceolus | 62 | 247 | |
| Passiflora pomaria | 66 | 52 | |
| Pastreit | 67 | 611 | |
| Paterait | 64 | 712 | |
| Pechstein | 65 437 | 65 | 721 |
| „ | 68 | 488 | |
| Pecten membranaceus | 65 | 147 | |
| „ orbicularis | 65 | 147 | |
| „ polymorphus | 62 | 43 | |
| „ scutulatus | 65 | 147 | |
| „ squamiger | 65 | 147 | |
| „ tumidus | 64 | 298 | |
| „ undosus | 65 | 147 | |
| Pectunculus obsoletes | 65 | 148 | |
| „ sublaevis | 65 | 148 | |
| Pegmatit | 62 572 | 64 | 24 |
| Pegathokiten | 60 | 39 | |
| Pektolith | 61 489 | 61 | 849 |
| „ | 66 | 832 | |
| Peltocaris | 63 | 622 | |
| Pelobates Decheni | 62 | 895 | |
| Penaeus | 63 | 376 | |
| Peneroplis | 61 | 616 | |
| Pennin | 61 392 | 62 | 350 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Pennin . . . . . 1863 92 | 67 | 305 |
| „ . . . . . 67 362 | 67 | 771 |
| „ . . . . . 68 746 | 69 | 236 |
| Pentacrinus basaltiformis . | 64 | 573 |
| „ Bronni . . . | 64 | 571 |
| „ cingulatus . . | 65 | 140 |
| „ subangularis . . | 64 | 573 |
| Pentalophodon . . . . . | 66 | 380 |
| Pentatoma Schaurothi . . . | 63 | 868 |
| Periklin . . . . 61 335 | 66 | 822 |
| „ . . . . . | 69 | 749 |
| Perimorphosen . . 60 350 | 61 | 333 |
| Permische Formation 61 104 | 61 | 752 |
| Permien . . . . . | 65 | 817 |
| Perna Soldani . . . . . | 65 | 51 |
| Perowskit . . . . 62 196 | 65 | 439 |
| Petalit . . . . . | 67 | 310 |
| Petalura acutipennis . . . | 60 | 378 |
| Petraster . . . . . | 62 | 245 |
| Petroleum . . . . 64 731 | 67 | 623 |
| Pettkoit . . . . . | 67 | 458 |
| Petzit . . . . . | 68 | 844 |
| Peuce Braunana . . . . | 60 | 497 |
| Pfahlbauten . . . 60 362 | 62 | 627 |
| „ . . . 65 103 | 65 | 247 |
| „ . . . 65 249 | 65 | 380 |
| „ . . . 66 503 | 68 | 85 |
| Phacops latifrons . . . . | 63 | 521 |
| Phästin . . . . . | 66 | 828 |
| Phalangites priscus . . . | 61 | 561 |
| Phaneropleuron . . . . . | 62 | 378 |
| Phanerosaurus Naumanni . . | 60 | 560 |
| Pharmakolith . . . 68 344 | 68 | 412 |
| Pharmakosiderit . . 62 465 | 67 | 445 |
| Pharyngodopilus . . . . | 65 | 382 |
| Phasianella neocomensis . . | 65 | 150 |
| Phillipsit . . . . 60 59 | 61 | 449 |
| Phlogopit . . . . 67 306 | 67 | 318 |
| „ . . . . . | 68 | 466 |
| Phoca pontica . . . . . | 68 | 247 |
| Pholadomya Esmarki . . . | 65 | 150 |
| Pholidogaster pisciformis . | 63 | 236 |
| Pholidopleurus typus . . . | 67 | 125 |
| Phonolith . . . . 61 220 | 62 | 356 |
| „ . . . . 65 663 | 66 | 73 |
| „ . . . . . | 68 | 87 |
| Phorus onustus . . . . . | 65 | 150 |
| Phosphorescenz . . . . . | 60 | 371 |
| Phosphorit . . . 66 363 | 66 | 803 |
| „ . . . 67 101 | 67 | 210 |
| „ . . . 67 622 | 68 | 109 |
| „ . . . 68 482 | 69 | 88 |
| „ . . . . . | 69 | 489 |
| „ nach Kalkspath . | 67 | 701 |
| Phyllodocitenschiefer . . . | 68 | 729 |
| Phyllograpsus . . . . . | 63 | 867 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Phyllograptus . 1866 121 | 68 | 375 |
| Phyllopora Ehrenbergi . . | 64 | 672 |
| Phymechinus mirabilis . . | 65 | 142 |
| Phytolitharien . . . . . | 67 | 511 |
| Phytopus antiquus . . . . | 62 | 765 |
| Piauzit . . . . . | 63 | 684 |
| Pickeringit . . . . . | 64 | 477 |
| Picotit . . . . . 63 96 | 66 | 388 |
| Pikrit . . . . . 66 728 | 68 | 89 |
| Pikrofluit . . . . . | 63 | 201 |
| Pikrolith . . . . . | 68 | 747 |
| Pileolus giganteus . . . . | 64 | 120 |
| Pilularia principalis . . . | 63 | 635 |
| Pinites silesiacus . . . . | 63 | 378 |
| Pinit . . . . . 60 142 | 60 | 262 |
| Pinitoid . . . . . | 61 | 142 |
| „ -Granit . . . . . | 68 | 395 |
| „ -Schiefer . . . . | 66 | 464 |
| Pinna aspera . . . . . | 65 | 51 |
| „ rugata . . . . . | 65 | 51 |
| „ rugosa . . . . . | 66 | 499 |
| Pinnularia dispalans . . . | 63 | 231 |
| Pinus resinosa . . . . . | 66 | 57 |
| Pisolith . . . . 60 230 | 64 | 491 |
| Pitticit . . . . . | 61 | 659 |
| Placodus . . . . . | 63 | 699 |
| „ Andriani . . . . | 63 | 500 |
| „ gigas . . 63 510 | 68 | 48 |
| Pläner . . . . . 63 209 | 66 | 309 |
| „ . . . . . 67 797 | 69 | 725 |
| „ . . . . . | 69 | 496 |
| Plagiaulax . . . . . | 63 | 237 |
| Plagioklas-Gesteine . . . | 67 | 615 |
| Plagiolepis . . . . . | 69 | 621 |
| Plagionit . . . . . | 69 | 312 |
| Plagiophyllit . . . . . | 67 | 488 |
| Planerit . . . . . | 63 | 470 |
| Planorbis multiformis . . . | 67 | 250 |
| „ quadrus . . . . | 65 | 52 |
| „ symmetrus . . . | 65 | 52 |
| Platin . . . . . 60 231 | 60 | 354 |
| „ . . . . . 61 327 | 67 | 194 |
| Platydactylus minutus . . . | 63 | 868 |
| Platysomidae . . . . . | 67 | 126 |
| Platysomus . . . 60 246 | 60 | 251 |
| Pleonast . . . . 68 605 | 69 | 338 |
| Plerosaurus . . . . . | 61 | 68 |
| Plesiocetus . . . . . | 60 | 373 |
| „ Burtini . . . . | 60 | 373 |
| „ Goropi . . . . | 60 | 373 |
| „ Hüpschi . . . | 60 | 373 |
| Plesiosaurus Cramptoni . . | 64 | 254 |
| „ macropterus . . | 65 | 763 |
| Plesioteuthis . . . . . | 62 | 250 |
| Plethopora truncata . . . | 65 | 139 |
| Pleurocystites . . . . . | 62 | 244 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Pleurodictyum problematicum | 1863 | 497 |
| „ „ | 63 | 519 |
| Pleurolepis | 60 | 247 |
| Pleuromya recurva | 65 | 149 |
| Pleurophyllum | 62 | 759 |
| Pleurosaurus Goldfussi | 69 | 350 |
| Pleurostomella | 60 | 635 |
| Pleurotoma cataphracta | 60 | 324 |
| „ dubia | 60 | 322 |
| „ gracilis | 60 | 324 |
| „ perturrita | 62 | 29 |
| „ semimarginata | 60 | 323 |
| „ distincta | 65 | 151 |
| „ gigantea | 65 | 151 |
| „ penea | 64 | 667 |
| Plintholepis | 66 | 247 |
| Plumbalophan | 68 | 750 |
| Plutonit 1864 | 389 | 67 | 480 |
| Pococera venulosa | 63 | 868 |
| Podocrates | 63 | 757 |
| Polirschiefer | 64 | 629 |
| Pollux | 64 | 625 |
| Polyargyrit | 69 | 311 |
| Polybasit 60 | 716 | 68 | 402 |
| „ | 69 | 310 |
| Polycyclia | 63 | 747 |
| Polyedrie | 63 | 469 |
| Polyhalit 69 | 323 | 69 | 578 |
| Polyparien | 69 | 560 |
| Polyporites | 66 | 245 |
| Polyptychodon 60 | 494 | 69 | 512 |
| Polysemia | 60 | 559 |
| Polytelit | 69 | 85 |
| Ponera | 69 | 623 |
| Poneridae | 69 | 622 |
| Porina filograna | 65 | 134 |
| Porocrinus | 62 | 242 |
| Porphyr 61 | 498 | 67 | 370 |
| „ 67 | 729 | 67 | 868 |
| „ 68 | 358 | 69 | 393 |
| „ | 69 | 586 |
| „ -Gesteine | 69 | 866 |
| „ , grauer | 60 | 257 |
| „ , Quarz führender | 60 | 129 |
| „ , schwarzer | 60 | 385 |
| „ , verglaster | 62 | 737 |
| Porphyrio coerulescens | 60 | 380 |
| Porphyrit | 60 | 4 |
| Porphyrsandstein | 66 | 464 |
| Posidonienschiefer | 67 | 49 |
| Posidonomya Becheri 61 | 313 | 63 | 118 |
| Poteriocrinus nanus | 63 | 383 |
| Praedonia | 68 | 635 |
| Pregrattit | 63 | 197 |
| Prehnit 60 | 796 | 61 | 662 |
| „ 62 | 432 | 62 | 912 |
| Prehnit 1862 | 959 | 67 | 304 |
| „ 67 | 307 | 67 | 340 |
| „ 67 | 591 | 68 | 355 |
| „ | 69 | 12 |
| Prenolepis | 69 | 622 |
| Primordial-Fauna 60 | 747 | 60 | 769 |
| „ „ 63 | 748 | 64 | 119 |
| „ -Zone | 62 | 763 |
| Prionomyrmex | 69 | 622 |
| Pristerodon M'Kayi | 68 | 876 |
| Proboscidier | 60 | 866 |
| Proboscina dilatata | 65 | 138 |
| Procoelia | 60 | 756 |
| Productus horridus | 64 | 671 |
| Propater astacorum | 65 | 59 |
| Propylit | 68 | 852 |
| Prosopon Mitella | 64 | 209 |
| „ Neuhausense | 64 | 208 |
| Prosoponiscus problematicus | 63 | 385 |
| Protobastit | 62 | 526 |
| „ -Fels 62 | 521 | 62 | 539 |
| Protolycosa anthracophila | 66 | 136 |
| Protopteris confluens | 60 | 878 |
| „ Sternbergii | 65 | 396 |
| Protorosaurus | 65 | 60 |
| Prototaxites Logani | 60 | 640 |
| Proviverra | 63 | 255 |
| Psephoderma Alpinum | 64 | 698 |
| Pseudastacus 62 | 234 | 63 | 375 |
| Pseudocranyon | 63 | 758 |
| Pseudoglyphea | 61 | 369 |
| Pseudoglyphia | 63 | 376 |
| Pseudomorphosen 60 | 61 | 60 | 229 |
| „ 60 | 325 | 60 | 572 |
| „ 60 | 573 | 60 | 720 |
| „ 61 | 59 | 61 | 79 |
| „ 61 | 180 | 61 | 461 |
| „ 61 | 486 | 61 | 523 |
| „ 61 | 573 | 62 | 356 |
| „ 62 | 1000 | 63 | 197 |
| „ 63 | 363 | 63 | 467 |
| „ 63 | 582 | 63 | 832 |
| „ 64 | 41 | 64 | 72 |
| „ 64 | 79 | 64 | 477 |
| „ 64 | 479 | 65 | 84 |
| „ 65 | 257 | 66 | 827 |
| „ 67 | 198 | 67 | 452 |
| „ 67 | 591 | 68 | 805 |
| „ 69 | 480 | 69 | 721 |
| , künstliche | 61 | 697 |
| Pseudonephrit | 66 | 558 |
| Pseudophit | 69 | 343 |
| Pseudophus Heymanni | 60 | 500 |
| „ rugosus | 60 | 500 |
| Pseudosteatit | 63 | 200 |
| Psilomelan 61 | 186 | 61 | 487 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Psilomelan . . . 1866 94 | 67 | 320 |
| Psilophyton . . . 60 640 | 63 | 231 |
| Pteriidae . . . . . | 64 | 867 |
| Pteriniinae . . . . . | 64 | 868 |
| Pteroceras-Schichten . . . | 65 | 252 |
| Pterodactylus . . 65 844 | 68 | 31 |
| „ Fittoni . . . | 60 | 382 |
| „ micronyx . . | 63 | 247 |
| „ secundarius . | 68 | 31 |
| „ Sedgwicki . . | 60 | 382 |
| „ spectabilis . . | 61 | 467 |
| „ „ . . | 63 | 247 |
| Pterolith . . . . . | 65 | 858 |
| Pterophyllum gonorrhachis . | 66 | 133 |
| Pteropoden . . . 67 768 | 68 | 115 |
| Pteropsis . . . . . | 61 | 765 |
| Pterosauria . . . . . | 60 | 755 |
| Pterozamites . . . . . | 63 | 414 |
| Ptilograptus . . . . . | 66 | 122 |
| Plychodus polygyrus . . . | 65 | 153 |
| Ptychognathus . . . . . | 60 | 482 |
| „ declivis . . | 60 | 381 |
| „ verticalis . . | 60 | 381 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Puddelschlacke . . . . | 1860 | 668 |
| Puquellus . . . . . | 61 | 764 |
| Punamu . . . . . | 65 | 79 |
| Purpurina . . . . . | 61 | 625 |
| Puschkinit . . . . . | 61 | 850 |
| Pycnodontidae . . . . . | 67 | 126 |
| Pyrargyrit . . . . . | 67 | 197 |
| Pyrit . . . . 1860 714 | 61 | 410 |
| Pyroaurit . . . . . | 67 | 607 |
| Pyromephites Larteti . . . | 62 | 121 |
| Pyrochlor . . . . 65 439 | 65 | 856 |
| „ . . . . . | 69 | 733 |
| Pyrochroit . . . . . | 65 | 83 |
| Pyrolusit . . . . 66 724 | 67 | 197 |
| Pyromorphit . . . 64 222 | 67 | 449 |
| „ . . . 67 824 | 69 | 747 |
| „ nach Cerussit . | 68 | 812 |
| Pyrop . . . . . | 67 | 432 |
| Pyrophyllit . . . 67 106 | 69 | 82 |
| Pyropissit . . . . 63 685 | 67 | 403 |
| Pyroretin . . . . . | 63 | 685 |
| Pyrosmalith . . . . . | 61 | 848 |


## Q.


| | | |
|---|---|---|
| Quader . . . . . 1869 | 495 | |
| Quadersandstein . . . . . | 63 | 209 |
| Quadraten-Kreide . . . . | 66 | 242 |
| Quartär-Formation . 60 830 | 69 | 500 |
| Quartärgebilde . . . . . | 68 | 563 |
| Quarz . . . . . 61 84 | 61 | 181 |
| „ . . . . . 61 487 | 63 | 676 |
| „ . . . . . 64 244 | 64 | 530 |
| „ . . . . . 65 824 | 66 | 196 |
| „ . . . . . 66 201 | 68 | 86 |
| „ . . . . . 69 234 | 69 | 316 |
| „ . . . . . 69 748 | 69 | 865 |
| „ nach Apophyllit . . . | 64 | 73 |
| „ „ Fasergyps . . . | 63 | 364 |
| Quarz nach Orthoklas . . | 1864 | 73 |
| „ -Fels . . . . . | 69 | 97 |
| Quarzit . . . . . | 64 | 854 |
| Quarz-Krystalle, Pflanzenreste einschliessend | 62 | 728 |
| „ -Krystall, schliesst Epidot ein . . . | 60 | 785 |
| „ -Porphyr . . 64 391 | 64 | 400 |
| „ „ . . 65 331 | 67 | 220 |
| „ „ . . 67 485 | 68 | 211 |
| „ „ . . . . . | 69 | 430 |
| „ -Trachyt . . . . . | 67 | 220 |
| Quecksilber . . . . . | 60 | 355 |
| Quercus primaeva . . . . | 63 | 378 |


## R.


| | | |
|---|---|---|
| Radiopora bulbosa . . . 1865 | 138 | |
| „ francquana . . . 65 | 138 | |
| „ heteropora . . . 65 | 138 | |
| „ Huotiana . . . . 65 | 138 | |
| Radiolith . . . . . | 64 | 364 |
| Rädelerz . . . . . | 62 | 999 |
| Rahtit . . . . . 66 453 | 67 | 613 |
| Raia spiralis . . . . . | 68 | 833 |
| Raimondit . . . . . | 66 | 593 |
| Raibler Schichten . 60 848 | 66 | 34 |
| Raphistoma . . . . . | 62 | 247 |
| Rastolyt . . . . . | 63 | 366 |
| Rastrites . . . . 66 123 | 68 | 374 |
| Rauchquarz . . . . . 1861 | 672 | |
| Realgar . . . 1860 439 | 61 | 183 |
| „ . . . . 61 333 | 61 | 574 |
| „ . . . . 64 709 | 66 | 227 |
| „ . . . . . | 68 | 413 |
| Reptescharella punctata . . | 65 | 135 |
| Reptescharinella pusilla . . | 65 | 134 |
| Reptilien, fossile . 60 380 | 60 | 384 |
| „ „ . . . . | 60 | 752 |
| „ -Fährten . . . . | 64 | 752 |
| Reptomulticava irregularis . | 65 | 139 |
| Reteocrinus . . . . . | 62 | 243 |
| Retepora fenestrata . . . | 65 | 134 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Retinit | 1863 | 682 |
| Retiograptus | 66 | 122 |
| Retiolites | 66 | 121 |
| Rewdanskit | 69 | 83 |
| Rhabdocarpos | 1864 | 176 |
| Rhabdogenium | 65 | 391 |
| Rhabdolepis Agassizi | 60 | 634 |
| Rhachiopteris | 68 | 831 |
| Rhamphorhynchus Gemmingi | 63 | 232 |
| Rhinoceros Etruscus | 60 | 211 |
| „ leptorhinus | 69 | 511 |
| Rhizolithes Kablikae | 68 | 371 |
| Rhizomorpha Mangle | 63 | 528 |
| Rhizopoden | 60 | 213 |
| Rhizodus Hibberti | 61 | 236 |
| Rhizoprion | 61 | 634 |
| Rhizostomites admirandus | 66 | 244 |
| „ lithographicus | 62 | 119 |
| Rhodochrosit | 66 | 261 |
| Rhodonit | 66 | 282 |
| Rhombenporphyr | 61 | 456 |
| Rhopalomyrmex | 61 | 442 |
| Rhynchonella Becksi | 61 | 663 |
| „ Cuvieri | 69 | 403 |
| „ Geinitziana | 69 | 621 |
| „ marsupium | 69 | 825 |
| „ plicatilis | 69 | 822 |
| „ spinosa | 69 | 822 |
| „ trigona | 66 | 495 |
| „ Ungeri | 64 | 309 |
| Rhynchopora Geinitziana | 69 | 822 |
| Rhyolithe | 65 | 145 |
| Rhyolith | 64 | 302 |
| Richmondit | 64 | 824 |
| | 66 | 380 |
| | 61 | 99 |
| | 64 | 632 |
| | 67 | 229 |
| | 66 | 829 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Richterit | 1867 | 478 |
| Ringiculinae | 63 | 503 |
| Riesenhirsch | 61 | 667 |
| Riesentöpfe | 1860 46 | 63 143 |
| „ | 67 | 621 |
| Riesenvögel, fossile | 60 | 379 |
| Rissoa | 64 | 748 |
| Rissoina | 60 | 373 |
| Rösslerit | 61 334 | 68 349 |
| Röth | 69 | 584 |
| Rothgültigerz | 63 588 | 69 310 |
| „ | 69 | 480 |
| Rothkupfererz | 61 520 | 64 146 |
| „ | 64 730 | 64 855 |
| „ | 67 | 197 |
| Rothliegendes | 60 593 | 60 606 |
| „ | 62 869 | 63 211 |
| „ | 64 219 | 65 750 |
| „ | 66 869 | 68 327 |
| „ | 68 358 | 68 627 |
| Rubidgea Mackayi | 69 | 119 |
| Rubidium | 61 692 | 62 599 |
| „ | 63 199 | 66 755 |
| Rubin | 66 | 727 |
| Rusophycus | 65 | 505 |
| Rutil | 60 796 | 61 490 |
| „ | 62 432 | 62 727 |
| „ | 63 698 | 64 72 |
| „ | 65 88 | 65 323 |
| „ | 66 806 | 67 106 |
| „ | 67 201 | 67 438 |
| „ | 67 783 | 67 832 |
| „ in Bergkrystall | 60 | 785 |


## S.


| | | |
|---|---|---|
| Saarbrücker Schichten | 1865 | 839 |
| „ „ | 68 | 626 |
| Sagenaria Veltheimiana | 61 | 67 |
| Salamandra ogygia | 60 | 559 |
| Salenia | 62 | 508 |
| Saleniiden | 62 | 507 |
| Salmiak | 60 76 | 63 673 |
| Salterella | 64 | 379 |
| Salzgehalt des Meeres | 67 | 233 |
| Salzstellen, Flora der | 63 | 747 |
| Samarskit | 65 | 858 |
| Samaropsis | 65 | 375 |
| Sandbergeria | 61 | 607 |
| „ cancellata | 61 | 507 |
| Sandbergerit | 66 | 719 |
| Sanidin | 67 434 | 68 87 |
| „ | 69 | 372 |
| „ -Oligoklas-Trachyt | 65 | 338 |
| Sandstein | 1861 | 860 |
| „ , alter rother | 69 | 593 |
| „ , krystallisirter | 64 | 91 |
| Sarkolith | 61 | 91 |
| Sarkopsid | 68 | 606 |
| Sarmatische Stufe | 67 | 246 |
| Saurier | 61 | 65 |
| „ -Fährten | 63 | 760 |
| Saurichnites Leisnerianus | 63 | 389 |
| Sauropsis | 60 | 500 |
| Sauropterygia | 60 | 754 |
| Saurosternon Bainii | 68 | 876 |
| Saussurit | 64 83 | 67 773 |
| „ nach Feldspath | 63 | 364 |
| Saxicava alpina | 64 | 299 |
| Scalaria fissicosta | 65 | 150 |
| Scalites | 62 | 247 |
| Scaphaeus ancylochelis | 64 | 383 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Scaphander Grateloupi | 1862 | 34 |
| Scaphiocrinus | 60 | 589 |
| Schabeisenzähne | 60 | 695 |
| Schaumkalk | 1860 196 64 | 720 |
| Scheelit | 61 184 61 | 493 |
| „ | 64 234 64 | 819 |
| „ | 67 437 69 | 745 |
| „ nach Wolframit | 68 | 809 |
| Scheererit | 63 | 683 |
| Schefferit | 64 | 235 |
| Scheibenquarz | 62 | 195 |
| Schildkröten, fossile | 60 379 67 | 766 |
| „ „ | 69 213 69 | 879 |
| Schiefer, lithographischer | 68 | 25 |
| Schilfglaserz | 60 | 578 |
| Schillerfels | 62 513 62 | 521 |
| „ | 62 541 62 | 984 |
| „ | 64 326 68 | 88 |
| Schillern | 69 368 69 | 532 |
| Schillerspath | 62 532 63 | 719 |
| Schillerstein | 62 | 534 |
| Schizodendron | 62 | 116 |
| Schizopteris fasciculata | 69 | 458 |
| Schlammvulcane | 69 | 248 |
| Schmidtia | 69 | 633 |
| Schnee, gelber | 66 | 249 |
| Schoenit | 66 | 340 |
| Schorlamit | 63 559 65 | 438 |
| Schrammen | 60 | 43 |
| Schreibersit | 62 | 997 |
| Schrötterit | 69 | 347 |
| Schützia anomala | 63 525 65 | 374 |
| „ Helmhackeri | 68 | 110 |
| Schwefel | 60 439 61 | 551 |
| „ | 63 366 63 | 669 |
| „ | 63 839 66 | 345 |
| „ | 67 | 447 |
| Schwefelselenzinkquecksilber | 66 | 414 |
| Schwelkohle | 67 | 410 |
| Schwemmland | 64 | 95 |
| Seekuh | 67 | 498 |
| Seesterne | 66 | 504 |
| Sellait | 69 | 370 |
| Semionotus | 65 | 506 |
| „ -Sandstein | 68 | 62 |
| Semnopithecus Penthelicus | 61 | 384 |
| Septarien | 68 | 303 |
| „ -Thon | 61 177 64 | 637 |
| „ „ | 65 189 66 | 485 |
| Sequoia Reichenbachi | 68 | 63 |
| Sericit | 68 92 68 | 307 |
| Sernfgestein | 65 | 351 |
| Serpentin | 62 354 63 | 343 |
| „ | 64 257 67 | 197 |
| „ | 67 305 67 | 366 |
| „ | 67 771 67 | 835 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Serpentin | 1868 78 68 | 89 |
| „ | 68 215 68 | 746 |
| „ | 69 | 97 |
| „ -Fels | 62 522 62 | 540 |
| Serpula | 67 | 582 |
| „ draconocephala | 65 | 152 |
| „ Nöggerathi | 65 | 152 |
| „ pusilla | 64 | 667 |
| Serpulites Hofensis | 68 | 688 |
| Servino | 60 | 846 |
| Shalkit | 65 | 321 |
| Siderit | 67 | 316 |
| Siderolith-Gebirge | 62 | 891 |
| Sideroplesit | 66 | 455 |
| Sigillaria | 63 117 66 | 248 |
| „ Feistmanteli | 65 | 392 |
| Silber | 60 79 60 | 441 |
| „ , haarförmiges | 60 | 582 |
| „ | 60 714 60 | 793 |
| „ | 61 853 63 | 697 |
| „ | 67 197 67 | 215 |
| „ | 68 352 68 | 400 |
| „ | 69 212 69 | 440 |
| „ | 69 446 69 | 9 |
| „ | 69 | 13 |
| „ -Glanz | 67 197 68 | 401 |
| „ „ | 69 | 311 |
| „ -Kies | 66 725 67 | 199 |
| „ -Oxyd, kohlensaures | 64 | 221 |
| „ -Sand | 69 | 445 |
| Silicoborocalcit | 68 | 848 |
| Sillimanit | 61 | 697 |
| Silur | 65 | 810 |
| „ | 69 395 69 | 600 |
| „ -Formation | 60 759 67 | 753 |
| „ „ | 68 115 68 | 641 |
| Siphonium ingens | 69 | 250 |
| Sirenen | 67 | 249 |
| Sizygophyllia | 60 | 365 |
| Skiddaw-Schiefer | 63 | 867 |
| Skleroklas | 64 711 67 | 203 |
| „ | 69 | 369 |
| Skolezit | 60 60 60 | 786 |
| Skolopsit | 63 198 69 | 346 |
| Skorodit | 67 | 445 |
| Smaragd | 64 233 65 | 80 |
| Smaragdit | 64 83 67 | 191 |
| „ | 67 | 774 |
| Smirgel | 65 620 67 | 102 |
| Sodalith | 61 326 62 | 186 |
| „ | 65 695 69 | 180 |
| Soda-Seen | 65 | 629 |
| Solarium numisma | 65 | 150 |
| Solen Dupianus | 65 | 150 |
| Solenoceras | 61 | 763 |
| Sombrerit | 63 | 471 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Sombrero-Phosphat | 1864 | 631 |
| Soricideus | 68 | 833 |
| Speerkies | 64 | 75 |
| Speiskobalt | 68 | 403 |
| Spessartin | 69 | 235 |
| Sphaerella | 61 | 763 |
| Sphärit | 67 | 858 |
| Sphärolith | 68 | 211 |
| Sphärosiderit | 68 | 205 |
| Sphaerucaprina | 68 | 506 |
| Sphaerulites Spallanzanii | 68 | 506 |
| „ Tenoreani | 63 | 512 |
| Sphalerit | 67 | 436 |
| Sphen 1864 | 850 | 66 595 |
| „ | | 68 605 |
| Sphenoklas | | 64 627 |
| Sphenophyllum | | 65 362 |
| „ emarginatum | | 64 165 |
| „ longifolium | | 65 372 |
| Sphenopteris anthriscifolia | | 69 463 |
| „ coralloides | | 64 166 |
| „ decipiens | | 64 167 |
| „ intermedia | | 64 167 |
| „ irregularis | | 64 166 |
| „ muricata | | 64 167 |
| „ oxydata | | 69 460 |
| „ Suessi | | 69 459 |
| „ tridactylites | | 69 458 |
| Spiauterit | | 63 837 |
| Spinell 63 | 365 | 65 326 |
| „ 67 | 99 | 67 313 |
| Spiractaeon | | 63 503 |
| Spirifer cuspidatus | | 69 633 |
| „ octoplicatus | | 63 392 |
| „ rostratus | | 65 145 |
| „ Urii | | 63 392 |
| Spiriferensandstein | | 64 488 |
| Spiripora antiqua | | 65 136 |
| Spiriporina | | 65 367 |
| Spirorbis carbonarius | | 63 248 |
| Spodumen | | 67 310 |
| Spondylus duplicatus | | 65 146 |
| „ gibbosus | | 65 147 |
| „ personatus | | 65 147 |
| „ radiatus | | 65 147 |
| „ spinosus | | 65 146 |
| „ „ | | 69 829 |
| „ teisenbergensis | | 65 147 |
| Spongillopsis carbonica | | 64 518 |
| „ dyadica | | 64 517 |
| Sprödglaserz | | 69 312 |
| Sprudelschale | | 63 599 |
| Squalodon | | 69 512 |
| „ Antverpiensis | | 62 750 |
| Stachelschwein, fossiles | | 60 864 |
| Staffelit 66 | 717 | 67 449 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Staffelit | 1867 | 833 |
| Stangeria paradoxa | 64 | 123 |
| Stassfurtit 1864 | 713 | 65 329 |
| „ | | 66 333 |
| Staurolith 61 | 579 | 66 835 |
| „ 67 | 313 | 67 590 |
| „ 68 | 352 | 68 846 |
| Steingeräthe | | 69 639 |
| Steinkohle 69 | 738 | 61 715 |
| „ | | 63 858 |
| Steinkohle mit Pflanzen-Structur | | 60 371 |
| Steinkohlen | | 64 365 |
| „ -Flora 61 | 212 | 62 117 |
| „ „ | | 69 507 |
| „ Formation 60 | 239 | 60 456 |
| „ „ 61 | 105 | 64 98 |
| „ „ 65 | 530 | 65 814 |
| „ „ 66 | 102 | 66 619 |
| „ „ 66 | 627 | 66 635 |
| „ „ 66 | 760 | 67 1 |
| „ „ 67 | 249 | 67 273 |
| „ „ 67 | 493 | 68 358 |
| „ „ 68 | 626 | 69 379 |
| Steinmark 64 | 239 | 67 479 |
| Steinöl | | 63 225 |
| Steinsalz 60 | 104 | 61 385 |
| „ 65 | 862 | 66 344 |
| „ 67 | 221 | 67 670 |
| „ 67 | 764 | 67 783 |
| „ 67 | 841 | 68 615 |
| „ 69 | 243 | 69 247 |
| „ | | 69 864 |
| „ blaues | | 62 881 |
| „ -Krystalle | | 62 599 |
| „ -Octaeder | | 64 80 |
| Steirophyllum | | 62 116 |
| „ lanceolatum | | 63 873 |
| Stenaster | | 62 245 |
| Stenochirus | | 63 375 |
| Stephanit 60 | 713 | 60 716 |
| „ 61 | 664 | 67 197 |
| Sternberger Kuchen | | 69 635 |
| Sternbergia | | 64 176 |
| Stetefeldtit | | 68 85 |
| Stickstoff in Gesteinen | | 61 713 |
| „ „ Mineralien | | 60 711 |
| „ „ Meteoreisen | | 62 600 |
| Stichoporina | | 63 379 |
| Stigmaria 62 | 633 | 66 248 |
| „ arenaria | | 63 635 |
| „ cochleata | | 63 635 |
| „ exigua | | 63 231 |
| „ ficoides | | 63 762 |
| „ inaequalis | | 61 67 |
| Stigmatodendron | | 62 115 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Stigmomyrmex | 1869 | 624 |
| Stilbit | 1861 187 | 61 581 |
| „ | 62 961 | 67 303 |
| „ | 67 308 | 67 429 |
| Stilpnomelan | | 61 489 |
| Stilpnosiderit nach Glimmer | | 64 72 |
| Stockwerksporphyr | | 60 97 |
| Stramberger Kalk | | 60 678 |
| „ Schichten | | 69 251 |
| Striatopora | | 63 505 |
| Stricklandinia | 64 751 | 68 372 |
| Strigovit | | 69 236 |
| Strontianit | 61 655 | 67 316 |
| Studerit | | 65 477 |
| Stylodon pusillus | | 66 621 |
| Stylodontes | | 60 245 |
| Stylolithen | 62 590 | 68 728 |
| Stylotyp | | 65 741 |
| Styracodus acutus | 1861 | 624 |
| Susannit | | 68 319 |
| Sussexit | | 69 83 |
| Svanbergit | | 67 106 |
| Syenit | 1862 812 | 62 856 |
| „ | 64 852 | 65 242 |
| „ -Porphyr | 64 405 | 69 403 |
| „ „ | | 69 408 |
| Syhedrit | | 66 92 |
| Sylvanit | 66 224 | 69 722 |
| Sylvin | | 68 484 |
| Symplesit | | 68 412 |
| Syringocrinus | | 62 243 |
| Syringodendron gracile | | 63 231 |
| Syringopora Fischeri | | 63 388 |
| Syringothyris | | 68 246 |
| Syringoxylon mirabile | | 63 231 |
| Szajbelyit | 62 85 | 63 833 |


## T.


| | | |
|---|---|---|
| Tabergit | 1867 822 | 69 202 |
| Tachhydrit | | 66 333 |
| Tachylyt | | 69 346 |
| Taeniaster | | 62 245 |
| Taeniodon Ewaldi | 60 307 | 62 154 |
| „ praecursor | | 62 151 |
| Tänit | | 62 997 |
| Tafelstructur | | 63 482 |
| Takonisch | | 67 244 |
| Takonische Gesteine | | 62 362 |
| Takonisches System | | 61 865 |
| Talk | 67 305 | 67 771 |
| „ nach Enstatit | | 67 80 |
| „ „ Smaragdit | | 68 808 |
| „ -Hydrat | | 62 350 |
| „ -Schiefer | | 67 368 |
| Taltalit | 63 470 | 66 459 |
| Tanalia | | 60 856 |
| Tantalit | 60 80 | 63 595 |
| „ | | 65 86 |
| Tapanhoacanga | | 61 233 |
| Taphrocanna | | 62 115 |
| Tapiolith | | 65 86 |
| Tarsus | | 65 61 |
| Tasmanit | | 65 480 |
| Taviglianaz-Sandstein | | 65 478 |
| Taxodon Burmeisteri | | 67 124 |
| Tegel | 62 621 | 66 604 |
| Teleiophyllia | | 64 754 |
| Teleosteus primaevus | | 60 758 |
| Telerpeton Elginense | | 67 761 |
| Tellurerz | | 66 93 |
| Tellurwismuth | | 67 443 |
| Temskya | | 65 399 |
| Tentaculites maximus | | 65 52 |
| Tephrit | 1868 | 850 |
| Tephroit | 1864 360 | 69 233 |
| Teratosaurus Suevicus | | 61 69 |
| Terebratella | | 68 871 |
| „ repanda | | 61 171 |
| Terebratula aequivalvis | | 63 143 |
| „ bisuffarcinata | | 60 687 |
| „ Carteri | | 69 828 |
| „ chrysalis | | 65 145 |
| „ cyclogonia | | 61 170 |
| „ Czapskiana | | 60 689 |
| „ diphya | | 60 687 |
| „ „ | | 64 694 |
| „ „ | | 68 118 |
| „ elongata | | 64 671 |
| „ gracilis | | 65 145 |
| „ janitor | | 69 255 |
| „ immanis | | 60 685 |
| „ „ | | 61 170 |
| „ insignis | | 60 687 |
| „ lima | | 69 826 |
| „ magasiformis | | 60 689 |
| „ Noszkowskiana | | 60 686 |
| „ „ | | 61 170 |
| „ obesa | | 65 144 |
| „ pycnosticta | | 60 684 |
| „ „ | | 61 169 |
| „ rigida | | 69 827 |
| „ sacculus | | 63 391 |
| „ Schenkii | | 64 309 |
| „ (Waldheimia) sub- | | |
| „ „ alpina | | 64 308 |
| „ „ sub- | | |
| canaliculata | | 64 304 |
| „ subrotunda | | 69 827 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Terebratula striata | 1865 | 145 |
| „ tamarindus | 65 | 144 |
| „ (Waldheimia) tei-senbergensis | 64 | 307 |
| „ vulgaris | 69 | 61 |
| „ „ | 69 | 880 |
| Teredo Argonensis | 65 | 150 |
| „ rugosa | 65 | 150 |
| Terrain anthraxifère | 61 | 709 |
| „ à Chailles | 64 | 520 |
| „ pénéen | 63 | 396 |
| Terramara | 1865 768 | 66 253 |
| „ | | 67 636 |
| Tertiär-Flora | 61 349 | 61 507 |
| „ „ | 61 867 | 69 121 |
| „ Formationen | 60 201 | 60 477 |
| „ „ | 60 481 | 60 739 |
| „ „ | 61 103 | 61 191 |
| „ „ | 61 224 | 61 709 |
| „ „ | 61 726 | 63 861 |
| „ „ | 64 732 | 66 858 |
| „ „ | 67 117 | 67 245 |
| „ „ | 67 502 | 68 769 |
| Teschenit | 65 345 | 66 728 |
| „ | 67 629 | 68 207 |
| Tessarolax | | 65 732 |
| Tesseralkies | | 62 726 |
| Testudo marmorum | | 62 638 |
| Tetradymit | | 68 845 |
| Tetraedrit | | 67 197 |
| Tetragonolepis | | 60 254 |
| Tetragrapsus | | 63 867 |
| Tetralophodon | | 67 789 |
| Teuthopsis | | 62 250 |
| Texalith | | 61 698 |
| Textularia | | 67 583 |
| Thalassictis robusta | | 62 121 |
| Thamnograptus | | 66 123 |
| Thaumatopteris | | 63 409 |
| „ Brauniana | | 63 409 |
| Thecodontia | | 60 755 |
| Thenardit | | 63 566 |
| Thermalquellen | | 68 629 |
| Thermoelectricität | 66 201 | 67 205 |
| Thier-Fährten | 60 693 | 62 630 |
| „ „ | | 63 118 |
| Thinnfeldia | | 61 218 |
| Thomsonit | 60 58 | 67 100 |
| „ | 67 770 | 69 84 |
| Thon, plastischer | | 66 737 |
| Thonporphyroid | | 60 144 |
| Thonschiefer | 67 487 | 69 393 |
| Thoracophis rugosus | | 60 500 |
| Thorit | | 60 569 |
| Thulit | | 66 596 |
| Thylacoelo carnifex | | 60 869 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Thylacus | 1861 | 764 |
| Thylocoelo carnifex | 69 | 766 |
| Tinkal | 67 | 195 |
| Tinkalcit | 61 | 190 |
| Tiphys pungens | 60 | 322 |
| Titaneisen | 1860 604 | 60 791 |
| „ | 61 853 | 62 953 |
| „ | 63 594 | 67 479 |
| „ | | 69 513 |
| Titanit | 61 184 | 62 89 |
| „ | 62 484 | 62 912 |
| „ | 64 218 | 65 695 |
| „ | 66 44 | 66 195 |
| „ | 67 435 | 67 541 |
| Tithonische Etage | | 66 239 |
| Tonalit | | 64 718 |
| Topas | 60 810 | 61 78 |
| „ | 62 87 | 64 238 |
| „ | 66 208 | 66 364 |
| „ | | 69 721 |
| Topfstein | 64 79 | 67 368 |
| Torbanhillkohle | | 60 81 |
| Torbanit | | 63 685 |
| Torf | 61 81 | 61 224 |
| „ | 62 745 | 63 228 |
| Torfmoore | | 60 465 |
| Torfschwein | | 69 637 |
| Tornatellaea | | 61 764 |
| Torynocrinus | | 66 639 |
| Tourtia | | 65 253 |
| Trachydolerit | | 62 190 |
| Trachyt | 61 358 | 62 193 |
| „ | 62 205 | 62 356 |
| „ | 65 338 | 65 623 |
| „ | 66 647 | 66 735 |
| „ | 67 228 | 67 230 |
| „ -Pechstein | | 68 488 |
| Trass | | 63 177 |
| Travertin | | 64 580 |
| „ -Flora | | 61 509 |
| Trias | 60 850 | 64 735 |
| „ | 65 746 | 66 370 |
| „ | 66 482 | 66 504 |
| „ | 66 619 | 68 234 |
| „ | 68 362 | 68 727 |
| „ | 69 215 | 69 377 |
| „ | 69 583 | 69 595 |
| „ alpine | | 60 610 |
| Trichite | | 68 487 |
| Tridymit | 68 486 | 68 464 |
| „ | 68 723 | 68 744 |
| „ | | 69 66 |
| Trigonia | | 66 639 |
| „ Heva | 64 119 | 64 636 |
| Trigonocarpum Hookeri | | 62 512 |
| Trigonocarpus Rössleri | | 67 288 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Trilobiten . . . 1861 113 | 63 | 632 |
| „ . . . . 63 867 | 64 | 509 |
| „ . . . . . | 68 | 510 |
| „ , primordiale . . | 60 | 429 |
| Trilobites corpulentus . . . | 68 | 684 |
| „ praevalens . . . | 68 | 684 |
| Trilophodon . . . . . | 67 | 788 |
| Triphylin . . . . 60 77 | 63 | 828 |
| Triplit . . . . . | 65 | 327 |
| Trissops . . . . . | 64 | 253 |
| Tristichopterus . . . . . | 62 | 378 |
| Tritaxia . . . . . | 60 | 635 |
| Tritonium distortum . . . | 60 | 322 |
| „ secans . . . . | 62 | 28 |
| Trochacteon . . . . . | 63 | 503 |
| Trochactaeonina . . . . . | 63 | 504 |
| Trochammina . . . . . | 61 | 237 |
| Trochocystites . . . . . | 60 | 749 |
| Trochonema . . . . . | 62 | 247 |
| Trolleit . . . . . | 69 | 481 |
| Trybliocrinus . . . . . | 1867 | 284 |
| Tschewkinit . . 1863 202 | 66 | 834 |
| „ . . . . . | 69 | 480 |
| Tuff, vulcanischer . . . . | 66 | 252 |
| „ „ mit Pflanzen-Resten . | 62 | 1002 |
| Turbinopsis . . . . . | 61 | 764 |
| Turbo helicinus . . . . . | 64 | 668 |
| Turgit . . . . . | 68 | 352 |
| Turmalin . . . . 62 188 | 62 | 799 |
| „ . . . . 63 909 | 64 | 709 |
| „ . . . . 67 104 | 67 | 108 |
| „ . . . . 67 199 | 67 | 432 |
| „ . . . . 67 779 | 68 | 465 |
| „ . . . . . | 69 | 236 |
| „ -Granit . . . . | 64 | 399 |
| Turnerit . . . . . | 63 | 98 |
| Turnus . . . . . | 65 | 732 |
| Turrilepis Wrightii . . . . | 66 | 126 |
| Typhloniscus . . . . . | 61 | 639 |


## U.


| | | |
|---|---|---|
| Udora . . . . . 1863 | 377 | |
| Udorella . . . . . | 63 | 377 |
| Übergangs-Formation, Flora derselben . . | 61 | 628 |
| Uncina . . . . . | 63 | 376 |
| Unio carbonarius . . . . | 64 | 652 |
| „ Goldfussianus . . . | 64 | 653 |
| „ pachyodon . . . . | 65 | 52 |
| „ tellinarius . . . . | 64 | 652 |
| „ Thuringensis . . . . | 64 | 653 |
| Uphantaenia . . . . . | 67 | 287 |
| Uphantaenia Chemungensis | 1863 | 232 |
| Uralorthit . . . . . | 61 | 851 |
| Uranglimmer . . . . . | 65 | 457 |
| Uranit . . . . . | 62 | 601 |
| Uranophan . . . . . | 60 | 811 |
| Urosthenes australis . . . | 64 | 753 |
| Ursus Americanus . . . . | 60 | 244 |
| Urthonschiefer . . . . . | 67 | 487 |
| Uwarowit . . . . 65 837 | 66 | 457 |
| „ . . . . . | 67 | 106 |


## V.


| | | |
|---|---|---|
| Valait . . . . . 1868 | 84 | |
| Valentinit . . . . . | 61 | 302 |
| Vanadit . . . . 62 728 | 62 | 1000 |
| Vansschichten . . . . . | 65 | 351 |
| Vanuxemia . . . . . | 62 | 246 |
| Venus . . . . . 65 367 | 68 | 250 |
| „ Brongniartina . . . | 65 | 14 |
| „ faba . . . . . | 65 | 149 |
| „ gibbosa . . . . . | 65 | 149 |
| „ royana . . . . . | 65 | 149 |
| Vermilia depressa . . . . | 65 | 153 |
| Verneuiliana . . . . . | 66 | 489 |
| Verrucano . . . . 60 846 | 62 | 886 |
| „ . . . . . | 62 | 888 |
| Versandungen . . . . . | 61 | 228 |
| Verticardia . . . . . | 60 | 767 |
| Verwachsung zweier Mineralien . . . . | 61 | 575 |
| Vesuvian . . . . 62 354 | 65 | 435 |
| Vesuvian . . . 1867 306 | 67 | 433 |
| „ . . . . . | 67 | 778 |
| Vilser Kalk . . . 61 353 | 64 | 815 |
| Vincularia excavata . . . | 65 | 134 |
| Virgloria-Kalk . . . . . | 62 | 887 |
| Vitriolletten . . . . . | 64 | 483 |
| Viverra miocenica . . . . | 69 | 879 |
| Vivianit . . . . . | 62 | 1001 |
| „ . . . . . 64 80 | 67 | 591 |
| „ . . . . . | 69 | 575 |
| Vögel, fossile . . . . . | 64 | 484 |
| Völknerit . . . . . | 66 | 720 |
| Voigtit nach Biotit . 64 480 | 65 | 85 |
| Voltait . . . . . | 68 | 351 |
| Voluta . . . . . | 67 | 503 |
| Voltzia . . . . . | 64 | 279 |
| „ heterophylla 64 287 | 65 | 63 |
| Vulcanit . . . . . | 67 | 480 |
| Vulcane . . . . 66 523 | 66 | 607 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Vulcane | 1867 325 | 67 385 |
| „ | 67 455 | 68 433 |
| „ | | 69 686 |
| Vulsella Deshayesi | | 1864 120 |
| „ falcata | | 65 147 |
| „ trigona | | 65 147 |

## W.

| | | |
|---|---|---|
| Wachskohle | 1867 | 403 |
| Wagit | 62 | 882 |
| Walchia filiciformis | 69 | 458 |
| „ piniformis | 69 | 457 |
| Walchowit | 63 | 683 |
| Wälder, versteinerte | 60 | 378 |
| „ „ | 60 | 597 |
| „ „ | 60 | 606 |
| Waldheimia venosa | 68 | 247 |
| Wangenthal-Schichten | 66 | 608 |
| Waringtonit | 66 | 364 |
| Wavellit | 69 490 | 69 579 |
| Wealdenformation | 64 | 106 |
| Wehrlit | 69 | 344 |
| Wellendolomit | 64 | 739 |
| Wellenkalk | 64 739 | 67 450 |
| „ | 69 | 584 |
| Werfener Schiefer | 60 845 | 62 886 |
| Wernerit | 67 | 434 |
| „ -Fels | 60 | 132 |
| Westanit | 69 | 482 |
| Whitneya | 65 | 732 |
| Whitneyit | 62 485 | 66 458 |
| Wiederkäuer | 1867 | 377 |
| Wiener-Sandstein | 1860 835 | 65 748 |
| Willemit | 69 | 233 |
| Wirbelberg-Schichten | 66 | 609 |
| Wiserin | 64 454 | 64 690 |
| „ | 66 | 439 |
| Wismuth | 68 | 419 |
| „ -Kupfererz | 65 274 | 68 413 |
| „ -Silbererz | 64 | 221 |
| Witherit | 67 | 316 |
| Wittichenit | 69 337 | 69 862 |
| Wöhlerit | 66 | 90 |
| Wölchit | 64 478 | 65 49 |
| Wolfachit | 69 | 313 |
| Wolframit | 61 492 | 63 641 |
| Wollastonit | 67 314 | 67 340 |
| „ | 69 | 490 |
| Wolnyn | 61 | 190 |
| Woodia | 60 | 766 |
| Woodwardit | 67 | 100 |
| Würfelerz | 61 | 574 |
| Wulfenit | 66 727 | 67 192 |
| Wurtzit | 61 579 | 63 837 |

## X.

| | | |
|---|---|---|
| Xanthosiderit | 1861 | 663 |
| Xenacanthus Decheni | 67 | 505 |
| Xenotim | 66 440 | 67 338 |
| Xiphosuren | 67 | 505 |
| Xonaltit | 1866 | 718 |
| Xystracanthus arcuatus | 60 | 489 |
| Xystrodus finitimus | 60 | 695 |

## Y.

| | | |
|---|---|---|
| Yttroilmenit | 1865 | 856 |
| Yttrotantalit | 61 | 330 |
| Yttrotantalit | 1865 | 856 |
| Yttrotitanit | 60 | 78 |

## Z.

| | | |
|---|---|---|
| Zamites arcticus | 1866 | 134 |
| Zeacrinus | 60 | 589 |
| Zechstein | 66 520 | 67 10 |
| „ | 67 383 | 67 494 |
| „ | 67 576 | 67 757 |
| „ | 68 | 725 |
| Zinkblüthe | 65 | 324 |
| Zinkerze | 63 838 | 64 849 |
| „ | 67 | 619 |
| Zinkspath | 67 | 201 |
| Zinkspath nach Blende | 68 | 810 |
| Zinnerz | 60 360 | 60 440 |
| „ | 64 362 | 64 363 |
| „ | 65 237 | 65 866 |
| „ | 66 229 | 67 195 |
| „ | 67 | 437 |
| Zinnerz nach Quarz | 1864 | 480 |
| „ „ „ | 65 | 84 |
| Zinnober | 61 665 | 63 47 |
| „ | 64 723 | 67 195 |
| Zinnober | 67 | 717 |
| „ nach Fahlerz | 66 | 827 |
| Zinnstockwerk | 60 | 96 |
| Zirkon | 62 187 | 64 72 |
| „ | 65 326 | 67 313 |
| „ | 67 | 476 |
| Zoantharia perforata | 66 | 869 |
| „ rugosa | 66 | 870 |
| Zoisit | 67 | 772 |
| Zonites priscus | 68 | 373 |
| Zwieselit | 61 | 186 |
| Zwitterporphyr | 60 | 97 |

# III. Orts-Register.

Den citirten Seitenzahlen sind mehrere Zeichen beigefügt, deren Bedeutung folgende ist: g. bedeutet, dass die am angeführten Orte vorkommende Stelle hauptsächlich geognostischen und geologischen — m. dass sie mineralogischen — und p. dass sie paläontologischen Inhaltes seie.

## A.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Aachen g. . | 1862 | 609 |
| Abbeville p. . | 63 | 759 |
| „ p. . | 64 | 117 |
| „ g. . | 64 | 635 |
| Adamello - Gebirge g. . | 64 | 718 |
| Ägina g. . . | 68 | 212 |
| Ätna g. . . . | 69 | 694 |
| Agordo g. . . | 63 | 103 |
| Albérés g. . . | 62 | 607 |
| Almaden g. . | 63 | 479 |
| Alpen g. . . | 60 | 843 |
| „ . . | 60 | 856 |
| „ . . | 61 | 723 |
| „ . . | 61 | 862 |
| „ p. . . | 63 | 625 |
| „ g. . . | 63 | 759 |
| „ g. . . | 64 | 104 |
| „ 64 295 | 64 | 315 |
| „ 64 747 | 64 | 812 |
| „ p. . . | 65 | 14 |
| „ g. . . | 65 | 348 |
| Alpen g. 65 489 | 65 | 626 |
| „ 65 754 | 66 | 234 |
| „ 66 246 | 66 | 370 |
| „ 66 482 | 67 | 256 |
| „ 68 361 | 69 | 211 |
| „ . . . | 69 | 595 |
| „ p. . . | 69 | 628 |
| „ g. . . | 69 | 724 |
| Altai p. . . . | 69 | 462 |
| „ g. . . . | 69 | 487 |
| Altenberg g. . | 60 | 96 |
| Altenburg g. . | 67 | 868 |
| Alzey g. . . | 68 | 102 |
| Amarinenthal g. | 63 | 288 |
| Amiens g. . . | 69 | 129 |
| „ p. . . | 61 | 92 |
| Ammeberg g. . | 67 | 619 |
| Andreasberg g. | 66 | 99 |
| „ m. | 66 | 232 |
| „ | 69 | 445 |
| Antwerpen p. | 62 | 750 |
| Apenninen g. | 63 | 101 |
| Ardèche g. | 1862 | 500 |
| Ardennen g. . | 69 | 600 |
| Arendal m. . . | 60 | 790 |
| „ g. . . | 62 | 557 |
| Armenien m. . | 68 | 583 |
| Armissan p. . | 60 | 584 |
| Aschaffenburg g. | 62 | 111 |
| Astrachansk g. | 64 | 374 |
| Auckland g. . | 60 | 476 |
| Auerbach g. . | 61 | 495 |
| „ . | 64 | 94 |
| „ m. . | 67 | 452 |
| Aumale g. . . | 67 | 232 |
| Australien g. . | 61 | 726 |
| „ . | 61 | 730 |
| „ . . | 62 | 352 |
| Auvergne g. . | 65 | 485 |
| „ . | 65 | 623 |
| „ . | 69 | 194 |
| „ . | 69 | 641 |
| „ . | 69 | 843 |
| Azoren g. . . | 61 | 221 |


## B.


| | | |
|---|---|---|
| Baden g. . . | 1861 | 862 |
| Baden-Baden g. | 61 | 595 |
| Baierdorf m. | 68 | 207 |
| Bakonyer Gebirge g. | 60 | 838 |
| „ Wald g. | 62 | 886 |
| „ „ | 62 | 888 |
| Banat g. 64 492 | 64 | 822 |
| Barr g. . . . | 63 | 285 |
| Basel p. . . | 64 | 333 |
| Bayern p. . | 1861 | 246 |
| „ g. . . . | 61 | 356 |
| „ . . | 61 | 600 |
| „ . . | 61 | 709 |
| „ . . | 62 | 200 |
| Bayer. Wald g. | 69 | 94 |
| Bayreuth p. . | 62 | 895 |
| Baveno m. . . | 67 | 107 |
| Belgien g. . . | 63 | 769 |
| Bentheim g. . | 62 | 883 |
| Bentheim g. | 1862 | 890 |
| Beregh szasz g. | 60 | 832 |
| Bergstrasse g. | 61 | 495 |
| Bern g. 60 241 | 60 | 451 |
| Beskyden g. . | 67 | 628 |
| Biella g. . . | 66 | 255 |
| Bihar g. . . | 60 | 89 |
| Bilin p. 68 878 | 69 | 121 |
| Bianenthal m. . | 64 | 708 |
| Bodzentyn g. . | 66 | 513 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Böhmen m. | 1861 | 78 |
| „ . . | 61 | 180 |
| „ . . | 64 | 74 |
| „ g. . | 64 | 737 |
| „ m. . | 60 | 578 |
| „ g. . | 60 | 606 |
| Böhmen g. . | 1863 | 209 |
| „ . . | 66 | 482 |
| „ . . | 67 | 795 |
| „ . . | 69 | 493 |
| Bolivia g. . . | 62 | 622 |
| Bombachthal g. | 63 | 270 |
| Bretagne g. | 1863 | 852 |
| Brüssel p. . . | 63 | 861 |
| Bundenbach p. | 63 | 382 |
| Buenos Aires g. | 68 | 231 |


## C.


| | | |
|---|---|---|
| Cairo p. . . | 1860 | 597 |
| Californien g. . | 61 | 853 |
| „ m. . | 66 | 93 |
| „ g. . | 66 | 610 |
| „ . | 66 | 741 |
| „ . | 67 | 112 |
| „ m. . | 67 | 195 |
| Canada g. p. . | 61 | 286 |
| „ g. . . | 62 | 193 |
| „ p. . . | 62 | 238 |
| „ g. . . | 62 | 362 |
| „ . . | 64 | 488 |
| „ . . | 65 | 884 |
| „ . . | 69 | 615 |
| Canaria g. . | 1863 | 845 |
| Capland g. . . | 66 | 474 |
| Capverden g. . | 67 | 367 |
| Carrara m. . . | 68 | 828 |
| Cassana p. . . | 60 | 93 |
| Castelgomberto p. | 69 | 107 |
| Ceylon g. . . | 62 | 738 |
| Chemnitz g. . | 64 | 673 |
| „ . . | 69 | 586 |
| Chester m. . . | 67 | 102 |
| Chiachkotan g. | 60 | 88 |
| China g. 65 499 | 66 | 470 |
| Christiania g. . | 67 | 373 |
| „ . | 69 | 393 |
| Chrudim g. . | 1863 | 203 |
| Clausthal g. . | 65 | 336 |
| Colmar g. . . | 63 | 287 |
| Conchagua g. . | 69 | 692 |
| Constantinopel g. | 63 | 513 |
| „ p. | 65 | 247 |
| Constantine g. | 69 | 587 |
| Corbières g. . | 60 | 101 |
| Corbieren g. . | 63 | 744 |
| Cordilleren g. . | 62 | 743 |
| Crispalt g. . . | 69 | 581 |
| Cutch g. . . | 68 | 108 |
| Czaslau g. . . | 63 | 203 |


## D.


| | | |
|---|---|---|
| Dänemark g. | 1863 | 769 |
| Daghestan g. . | 62 | 371 |
| Dalmatien g. . | 63 | 474 |
| „ . | 64 | 92 |
| Damaraland g. | 61 | 513 |
| Dannemora m. | 60 | 788 |
| Deutschbrod g. | 63 | 731 |
| Devonshire g. | 69 | 760 |
| Dieburg g. . | 1862 | 373 |
| Diez g. . . . | 64 | 490 |
| Dillenburg m. . | 61 | 488 |
| „ g. . | 69 | 657 |
| Dobschau g. . | 61 | 604 |
| Donegal g. . . | 63 | 474 |
| „ . . | 63 | 850 |
| Donnersberg g. | 62 | 737 |
| Dorogomilow p. | 60 | 583 |
| „ | 60 | 612 |
| Drachenfels g. | 61 | 359 |
| Drammen m. . | 63 | 838 |
| „ g. . | 69 | 422 |
| Dürkheim g. . | 68 | 625 |
| Dun-Berg g. . | 65 | 94 |


## E.


| | | |
|---|---|---|
| Echternach p. | 1863 | 383 |
| Egersund m. . | 63 | 594 |
| Egg m. . . . | 65 | 82 |
| Ehrenfriedersdorf g. . | 65 | 863 |
| Eibenstock g. . | 69 | 257 |
| Eifel g. . . . | 61 | 95 |
| „ . . . | 61 | 360 |
| Eifel g. 61 606 | 62 | 1002 |
| „ 65 339 | 66 | 240 |
| Eker m. . . | 65 | 81 |
| Elba g. . . . | 65 | 95 |
| Elbingerode g. | 60 | 385 |
| Erzgebirge g. . | 63 | 108 |
| „ | 63 | 613 |
| „ | 65 | 1 |
| Erzgebirge g. | 1865 | 866 |
| „ | 67 | 225 |
| „ | 69 | 755 |
| Euganeen g. . | 62 | 107 |
| Euganäen g. . | 65 | 337 |
| Eulengebirge g. | 61 | 497 |
| „ | 65 | 291 |


## F.


| | | |
|---|---|---|
| Fähnernberg g. | 1868 | 39 |
| Fahlun m. . . | 60 | 789 |
| „ g. . . | 61 | 739 |
| Felsöbanya g. | 61 | 500 |
| Fichtelgebirge p. | 62 | 284 |
| „ g. | 63 | 738 |
| „ p. | 64 | 375 |
| Fichtelgebirge m. | 67 | 476 |
| Fimon p. . . | 68 | 255 |
| Firth of Forth g. | 62 | 732 |
| Formosa g. . | 62 | 613 |
| Framont g. . . | 63 | 293 |
| Franken g. . | 62 | 745 |
| „ . . | 63 | 786 |
| Franken g. . | 1865 | 349 |
| „ . . | 65 | 636 |
| Frankenberg g. | 67 | 10 |
| Franzensbad g. | 63 | 734 |
| Freiburg m. . | 62 | 432 |
| Fünfkirchen p. | 63 | 863 |

## G.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Galizien g. . | 1860 | 110 |
| „ . . | 60 | 589 |
| „ . . | 65 | 348 |
| „ . . | 66 | 367 |
| „ . . | 67 | 630 |
| Genf g. . . . | 60 | 830 |
| Georgia m. . . | 67 | 442 |
| Georgien m. . | 68 | 583 |
| Geyer g. . | 1865 | 863 |
| „ . . . | 66 | 229 |
| Gibraltar g. . | 66 | 473 |
| Glotterthal g. . | 63 | 596 |
| Godelberg g. . | 63 | 601 |
| Goslar m. . . | 61 | 585 |
| Grasslitz g. . . | 69 | 488 |
| Graubündten g. | 64 | 110 |
| Graupen g. . | 1864 | 361 |
| „ g. . | 68 | 248 |
| Grönland g. . | 69 | 613 |
| Grossetto g. . | 66 | 632 |
| Guatemala g. . | 69 | 769 |
| Gumeschewsk . | 67 | 208 |


## H.


| | | |
|---|---|---|
| Habachthal m. | 1864 | 233 |
| Haiti g. . . . | 60 | 213 |
| Halle g. . . . | 65 | 331 |
| Hallstadt p. . | 61 | 243 |
| Hannover g. . | 66 | 243 |
| „ . . | 66 | 376 |
| Harz g. 60 129 | 60 | 257 |
| „ 62 513 | 62 | 769 |
| „ 62 847 | 62 | 933 |
| „ p. . . . | 64 | 665 |
| „ g. 65 873 | 68 | 98 |
| „ 68 156 | 68 | 211 |
| Hawai g. . . | 66 | 607 |
| Heidelberg g. | 1861 | 142 |
| „ . | 69 | 714 |
| Heiligkreutz g. | 63 | 262 |
| Helgoland p. . | 64 | 383 |
| Helmstädt p. . | 64 | 202 |
| Helsingfors g. | 68 | 183 |
| „ | 69 | 353 |
| Hemsbach g. . | 63 | 264 |
| „ . | 63 | 266 |
| Herborn g. . . | 61 | 701 |
| Herm p. . . | 63 | 244 |
| Hermannstadt g. | 60 | 89 |
| Hierlatz p. . . | 62 | 65 |
| Himalaya m. | 1865 | 837 |
| „ g. . | 66 | 616 |
| Hirschberg (Hessen) g. . | 69 | 241 |
| Hochland (Insel) g. | 68 | 756 |
| Höhgau g. . | 62 | 356 |
| „ . . | 65 | 651 |
| Hof p. 64 119 | 68 | 641 |
| Herrsjöberg m. | 67 | 105 |
| Hotzendorf m. | 64 | 628 |
| Huelva m. . . | 64 | 85 |
| „ g. . , | 65 | 483 |


## I.


| | | |
|---|---|---|
| Java g. . . | 1864 | 426 |
| „ . . . | 64 | 436 |
| „ . . . | 65 | 641 |
| „ . . . | 67 | 115 |
| Ibbenbühren g. | 63 | 855 |
| Jena p. 62 765 | 63 | 541 |
| Jicin g. . . . | 63 | 211 |
| Ilfeld g. . . | 60 | 1 |
| Illinois g. . | 1868 | 138 |
| Iloba g. . . . | 66 | 605 |
| Indersk p. . . | 64 | 506 |
| Indien g. . . | 68 | 106 |
| Inwald p. . . | 60 | 629 |
| Joachimsthal m. | 68 | 349 |
| Irland g. . . | 63 | 369 |
| Irmelsberg p. . | 64 | 646 |
| Island g. . | 1864 | 99 |
| „ . . . | 68 | 58 |
| Istrien g. . . | 65 | 491 |
| Jura-Gebirge g. | 60 | 836 |
| Ivanec g. . . | 62 | 1003 |
| Izalco g. . . | 66 | 469 |


## K.


| | | |
|---|---|---|
| Kärnthen g. | 1860 | 610 |
| „ . . | 63 | 367 |
| „ . . | 63 | 729 |
| Kajetanow g. . | 66 | 520 |
| Kaiserstuhl g. . | 63 | 732 |
| „ m. . | 65 | 435 |
| Kapnik g. . . | 61 | 502 |
| Karimon m. . | 64 | 363 |
| Karlsbad g. . | 63 | 599 |
| „ . . | 63 | 600 |
| „ . . | 63 | 734 |
| „ . . | 66 | 145 |
| Karlsruhe g. . | 64 | 738 |
| Karpathen g. . | 64 | 483 |
| Karpathen g. | 1865 | 500 |
| Katzenbuckel m. | 69 | 337 |
| „ g. | 69 | 485 |
| Kaukasus m. . | 68 | 583 |
| Kellerwald g. . | 65 | 530 |
| Kertsch g. . . | 69 | 248 |
| Kinzigthal g. . | 66 | 233 |
| Kissingen g. . | 64 | 807 |
| „ . . | 66 | 840 |
| Kleinnamaqualand g. | 61 | 513 |
| Klettgau g. . . | 66 | 608 |
| „ . . | 67 | 39 |
| Knyahinya g. . | 67 | 371 |
| Königsberg p. | 1861 | 253 |
| Kongsberg m. . | 60 | 793 |
| „ g. . | 62 | 365 |
| „ m . | 63 | 464 |
| „ . . | 67 | 215 |
| „ g. . | 69 | 434 |
| Korsika g. . . | 63 | 102 |
| „ . . | 63 | 207 |
| Koumi p. . . | 60 | 742 |
| Krähenberg g. | 69 | 727 |
| Krageroe m. . | 60 | 791 |
| „ . | 61 | 491 |
| Krain g. 60 608 | 60 | 725 |
| Krakau g. . . | 00 | 457 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Kressenberg p. | 1865 | 129 |
| „ . | 65 | 769 |
| Kreuznach g. . | 68 | 625 |
| Kronstadt g. | 1861 | 94 |
| Kurland g. . . | 62 | 618 |
| Kyffhäuser g. . | 67 | 513 |
| Kyffhäuser g. | 1867 | 641 |


## L.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Laacher See m. | 1862 | 89 |
| „ „ | 62 | 484 |
| „ „ | 63 | 583 |
| „ „ g. | 64 | 496 |
| „ „ | 66 | 240 |
| „ „ | 67 | 864 |
| „ „ | 68 | 501 |
| Lähn g. . . . | 64 | 733 |
| Lahr g. . . . | 68 | 357 |
| Latdorf p. . . | 63 | 379 |
| Latdorf p. | 1865 | 378 |
| Lausitz p. . . | 66 | 52 |
| „ g. . . | 68 | 370 |
| Lemberg g. . | 60 | 605 |
| „ . . | 60 | 739 |
| Livland g. . . | 62 | 618 |
| Löbau g. . . | 67 | 868 |
| Löffelspitze g. | 65 | 751 |
| Löwenberg p. | 64 | 112 |
| Löwenburg g. | 61 | 88 |
| Lombardi g. | 1860 | 236 |
| „ . . | 61 | 211 |
| „ p. . | 61 | 736 |
| Lüneburg g. . | 63 | 865 |
| Lugano p. . . | 61 | 728 |
| Lunzenau g. . | 67 | 486 |
| Luxemburg g. | 63 | 217 |
| Lyon g. . . . | 63 | 298 |
| Lyonnais g. . | 61 | 859 |


## M.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Mackenzie g. | 1869 | 589 |
| Madeira g. . . | 63 | 811 |
| „ . . . | 64 | 493 |
| „ p. . | 64 | 869 |
| „ g. . | 65 | 343 |
| Madera m. . . | 61 | 129 |
| Maderaner Thal m. | 61 | 235 |
| „ „ g. | 67 | 368 |
| Magrathal g. . | 61 | 761 |
| Magurka m. . | 61 | 494 |
| Mai-Inseln g. . | 67 | 206 |
| Mainz p. 64 636 | 65 | 51 |
| „ . . . | 65 | 171 |
| „ g. . . . | 66 | 58 |
| Mainzer Becken g. | 60 | 177 |
| Malöwka p. . | 64 | 373 |
| Marienbad g. . | 63 | 734 |
| Maubach g. . | 61 | 609 |
| Mauna Loa g. | 1862 | 738 |
| „ „ . | 69 | 693 |
| Maurienne g. . | 60 | 749 |
| „ . | 61 | 709 |
| Meiches g. . | 65 | 672 |
| Meissner g. . | 69 | 241 |
| Melnik g. . . | 60 | 88 |
| Methana g. . . | 68 | 212 |
| Mexico m. . . | 66 | 409 |
| Mexico g. . . | 68 | 513 |
| Michigan g. . | 63 | 372 |
| „ . . | 68 | 99 |
| Minas Geraes g. | 61 | 232 |
| Mississippi-Gebiet m. | 64 | 240 |
| „ „ | 64 | 728 |
| Mittershausen g. | 63 | 273 |
| Moldava m. . | 61 | 278 |
| Moletein p. . | 1869 | 114 |
| Montdore g. . | 64 | 723 |
| Monte Bolca . | 68 | 254 |
| Monte nuovo g. | 65 | 34 |
| Monzoni g. . . | 63 | 16 |
| Morbegno g. . | 68 | 869 |
| Morvan g. . . | 63 | 478 |
| Moskau p. . . | 61 | 706 |
| „ g. . . | 62 | 363 |
| „ p. . . | 63 | 123 |
| „ g. . . | 69 | 758 |
| Münchberg g. . | 61 | 257 |
| „ | 63 | 1 |
| „ | 63 | 318 |
| „ | 63 | 531 |
| Mürtschenalp g. | 65 | 351 |
| Mussaalpe m. . | 64 | 847 |


## N.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Nagyag g. . | 1860 | 722 |
| „ . . . | 62 | 368 |
| „ . . . | 66 | 464 |
| Nagybanya g. . | 61 | 500 |
| Namiest g. . . | 67 | 866 |
| Nebraska p. . | 61 | 505 |
| „ g. . | 67 | 1 |
| Nelson g. . . | 60 | 476 |
| Neubraunschweig. g. | 1865 | 803 |
| Neurode g. . . | 64 | 257 |
| „ . . | 67 | 862 |
| Neuschottland g. | 63 | 472 |
| Neuseeland p. | 63 | 146 |
| „ g. | 64 | 367 |
| „ | 65 | 875 |
| Neutitschein g. | 1866 | 728 |
| Niederschöna p. | 68 | 243 |
| Nikobaren g. . | 67 | 234 |
| Norwegen g. . | 61 | 731 |
| „ . . | 62 | 129 |
| „ . . | 67 | 374 |
| „ . . | 69 | 385 |
| Novale p. . . | 61 | 867 |


## O.


| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Oberer See g. | 1864 | 741 |
| „ „ m. | 68 | 347 |
| „ „ | 69 | 1 |
| Oberhausen m. | 60 | 76 |
| Oberlaudenbach g. | 63 | 267 |
| Oberwiesenthal m. | 60 | 67 |
| Ochozk g. . . | 64 | 91 |
| Ochtrup g. . . | 65 | 480 |
| Odenwald g. . | 63 | 257 |
| Österreich p. . | 61 | 246 |
| Österreich g. | 1861 | 742 |
| Öningen p. . | 61 | 508 |
| Ötzthal g. . . | 65 | 243 |
| Ofen g. . . . | 64 | 491 |
| Offenbanya g. . | 61 | 603 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Offenburg g. | 1868 | 357 |
| Olalaposbanya g. | 61 | 502 |
| Olbrück g. . . | 61 | 219 |
| Olonez g. . | 1861 | 711 |
| Opatowitz g. . | 63 | 857 |
| Oppenau g. . | 64 | 484 |
| Osnabrück p. | 1869 | 507 |

## P.

| | | |
|---|---|---|
| Palma g. . | 1868 | 708 |
| Panama g. . . | 60 | 89 |
| Pargas g. . . | 67 | 731 |
| Paris g. 61 351 | 61 | 553 |
| „ 62 215 | 62 | 251 |
| „ p. . . | 64 | 121 |
| Paterno g. . . | 63 | 843 |
| Pflasterkaute m. | 60 | 56 |
| Pfundrersberg g. | 63 | 205 |
| Piemont p. . . | 62 | 255 |
| Pikermi p. . . | 61 | 372 |
| „ . . | 61 | 871 |
| Pikermi p. . | 1862 | 120 |
| „ . . | 68 | 113 |
| Plauenscher Grund g. . | 66 | 44 |
| Policzka g. . . | 63 | 481 |
| Port-de-la-France g. | 67 | 60 |
| Portugal g. . . | 68 | 221 |
| „ . . | 69 | 590 |
| Potsdam p. . . | 64 | 96 |
| Prag g. 60 239 | 60 | 593 |
| „ 62 740 | 63 | 370 |
| Prassberg m. | 1864 | 84 |
| Predazzo g. . | 63 | 16 |
| Pribram m. . | 60 | 713 |
| „ . . | 61 | 324 |
| Prinzen-Inseln g. | 69 | 108 |
| Provence g. . | 62 | 748 |
| Provins g. . . | 62 | 615 |
| Pultusk g. . . | 69 | 80 |
| Pyrenäen g. . | 64 | 727 |
| „ . . | 67 | 746 |
| „ . . | 68 | 233 |

## R.

| | | |
|---|---|---|
| Radicofani g. | 1866 | 98 |
| Raibl g. . . | 66 | 463 |
| „ p. . . | 66 | 841 |
| „ p. . . . | 67 | 124 |
| Rakonitz p. . | 61 | 212 |
| Rammelsberg m. | 61 | 585 |
| „ g. | 65 | 241 |
| Randen g. . . | 66 | 608 |
| Reichenstein m. | 68 | 78 |
| Remiremont g. | 63 | 279 |
| Rezbanya m. | 62 | 90 |
| Rhöngebirge p. | 1861 | 191 |
| „ | 61 | 255 |
| Ries g. . . . | 63 | 169 |
| Riesengebirge g. | 61 | 858 |
| „ | 63 | 213 |
| „ | 64 | 234 |
| „ | 65 | 344 |
| Roderberg g. . | 64 | 82 |
| Rodna g. . . | 66 | 101 |
| Rom g. . . . | 65 | 255 |
| Rossdorf m. . | 69 | 32 |
| Rothenfelde p. | 1869 | 808 |
| Russland p. . | 61 | 348 |
| „ g. . | 61 | 725 |
| „ p. . | 61 | 749 |
| „ . . | 61 | 835 |
| „ . . | 62 | 112 |
| „ m. . | 63 | 98 |
| „ g. . | 63 | 745 |
| „ g. . | 66 | 477 |

## S.

| | | |
|---|---|---|
| Saarbrücken g. | 1865 | 838 |
| „ | 64 | 654 |
| „ | 69 | 598 |
| Saarlouis g. . | 67 | 207 |
| Sadewitz p. . | 61 | 875 |
| Sahara g. . . | 64 | 726 |
| Sala m. . . . | 60 | 789 |
| Salvador g. . | 69 | 769 |
| Salzburg m. . | 61 | 335 |
| Salzgitter g. . | 60 | 514 |
| „ p. . | 62 | 167 |
| „ g. . | 65 | 822 |
| Samara g. . . | 69 | 247 |
| Samland g. . . | 68 | 234 |
| „ . . | 68 | 769 |
| St. Benigna m. | 68 | 81 |
| St. Cassian p. | 67 | 242 |
| „ „ | 68 | 637 |
| St. Gotthard m. | 63 | 96 |
| St. Paul . . . | 66 | 479 |
| S. Pedro da Cova g. | 1862 | 257 |
| Sandomierz g. | 68 | 797 |
| Sandwichinseln g. | 69 | 611 |
| Santa Maria g. | 62 | 1 |
| Santander g. . | 63 | 725 |
| „ m. . | 64 | 849 |
| Santorin g. . . | 66 | 374 |
| „ . . | 66 | 450 |
| „ . . | 66 | 769 |
| „ . . | 66 | 837 |
| „ . . | 67 | 325 |
| „ . . | 67 | 455 |
| „ . . | 67 | 485 |
| „ . . | 68 | 366 |
| „ . . | 68 | 433 |
| „ . . | 69 | 89 |
| „ . . | 69 | 692 |
| Schemnitz g. . | 68 | 363 |
| Schirmeck g. . | 63 | 294 |
| Schlaggenwald m. | 64 | 362 |
| „ | 64 | 713 |
| Schlesien p. . | 60 | 120 |
| „ g. . | 63 | 334 |
| „ m. . | 63 | 367 |
| „ g. . | 64 | 257 |
| „ . | 64 | 484 |
| „ . | 66 | 249 |
| „ . | 68 | 232 |
| „ . | 68 | 760 |
| Schönbuch g. . | 61 | 854 |
| Schonen g. . | 66 | 375 |
| Schotten g. . . | 61 | 93 |
| Schottland g. . | 63 | 111 |
| Schreiberhau m. | 67 | 106 |
| Schriesheim g. | 63 | 260 |
| „ . | 64 | 326 |
| „ . | 66 | 640 |
| Schussenried p. | 67 | 871 |
| Schwarzwald g. | 60 | 575 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Schwarzwald m. | 60 | 795 |
| „ m. | 62 | 465 |
| „ g. | 63 | 275 |
| „ m. | 64 | 221 |
| „ | 65 | 584 |
| „ | 67 | 340 |
| Schweden g. | 62 | 466 |
| „ | 63 | 129 |
| „ | 64 | 15 |
| „ | 64 | 641 |
| „ | 69 | 500 |
| Schweiz p. | 60 | 617 |
| „ m. | 62 | 353 |
| „ p. | 63 | 252 |
| „ m | 63 | 697 |
| „ | 64 | 217 |
| „ | 64 | 454 |
| „ g. | 64 | 659 |
| „ m. | 65 | 725 |
| „ | 65 | 835 |
| „ g. | 65 | 869 |
| „ m. | 66 | 193 |
| „ | 66 | 592 |
| „ | 66 | 804 |
| „ | 66 | 835 |
| „ | 67 | 107 |
| Schweiz m. | 1867 | 201 |
| „ | 67 | 337 |
| „ | 67 | 364 |
| „ | 67 | 831 |
| „ g. | 68 | 758 |
| Seeberg b. Gothag. | 60 | 293 |
| Seefeld p. | 67 | 125 |
| Seinstedt p. | 63 | 743 |
| Selters p. | 67 | 576 |
| Seo de Urgel g. | 60 | 87 |
| Serapistempel g. | 65 | 39 |
| Sereth p. | 60 | 858 |
| Siebenbürgen g. | 60 | 107 |
| „ p. | 61 | 217 |
| „ g. | 62 | 364 |
| „ | 64 | 724 |
| „ | 67 | 226 |
| Siebengebirge g. | 62 | 190 |
| Siegburg g. | 64 | 720 |
| Sinai g. | 67 | 622 |
| „ | 68 | 493 |
| Singhbhum m. | 64 | 129 |
| Skiddaw p. | 63 | 867 |
| Solfatara g. | 65 | 37 |
| Spanien g. | 64 | 769 |
| „ | 65 | 240 |
| Sperenberg g. | 1868 | 615 |
| Spezia g. | 63 | 765 |
| Spiemont g. | 69 | 374 |
| Spitzbergen g. | 69 | 376 |
| Staffel g. | 66 | 716 |
| Stassfurt m. | 64 | 713 |
| „ | 66 | 321 |
| „ g. | 67 | 221 |
| „ m. | 68 | 468 |
| Steigerwald g. | 68 | 61 |
| „ | 68 | 217 |
| Steinheim (Ulm) p. | 64 | 187 |
| „ | 65 | 843 |
| „ m. | 68 | 205 |
| Steinlah p. | 62 | 165 |
| Steyermark m | 68 | 352 |
| Stradonitz p. | 64 | 160 |
| Stramberg p. | 60 | 678 |
| „ | 69 | 251 |
| Streitberg p. | 63 | 120 |
| Striegau m. | 69 | 236 |
| Suggenthal g. | 63 | 596 |
| Sulzbach g. | 63 | 262 |
| Swojanow g. | 63 | 726 |


## T.


| | | |
|---|---|---|
| Tajowa m. | 1861 | 333 |
| Taman g. | 69 | 248 |
| Tauberthal g. | 69 | 583 |
| Telkibanya g. | 60 | 612 |
| Tellemarken g. | 62 | 603 |
| Tenerife g. | 68 | 367 |
| „ 68 752 | 68 | 849 |
| Terlink p. | 60 | 857 |
| Teschen g. | 66 | 728 |
| Texas g. | 62 | 763 |
| Thüringen g. | 63 | 494 |
| Thüringen m. | 1864 | 242 |
| „ g. | 64 | 734 |
| Thüringer Wald g. | 60 | 196 |
| Thumsenreuth m. | 64 | 10 |
| Timor p. | 65 | 886 |
| Tiefengletscher g. | 69 | 580 |
| Tivoli g. | 64 | 580 |
| Torro m. | 65 | 86 |
| Toscana p. | 61 | 509 |
| „ g. | 65 | 861 |
| Totos g. | 62 | 883 |
| Travemünde p. | 1860 | 320 |
| Tentschin g. | 60 | 855 |
| Tyrol g. | 62 | 178 |
| „ | 62 | 868 |
| „ | 64 | 372 |
| „ | 64 | 385 |
| „ | 66 | 1 |
| „ | 64 | 802 |
| „ | 65 | 345 |
| Türkei g. | 66 | 857 |


## U.


| | | |
|---|---|---|
| Überlingen g. | 1861 | 224 |
| Ungarn g. | 60 | 234 |
| „ | 62 | 199 |
| „ | 62 | 205 |
| „ | 63 | 506 |
| Ungarn g. | 1865 | 629 |
| „ | 66 | 235 |
| „ | 66 | 367 |
| Ural g. | 61 | 235 |
| „ | 63 | 631 |
| Ural p. | 1863 | 634 |
| „ g. | 63 | 853 |
| „ | 63 | 872 |
| „ m. | 66 | 598 |
| „ g. | 69 | 379 |


## V.


| | | |
|---|---|---|
| Valalta m. | 1864 | 722 |
| Valcuvia g. | 68 | 869 |
| Valdagno g. | 62 | 214 |
| Val Trompia p. | 62 | 767 |
| „ „ | 69 | 456 |
| Vancouvers-Insel g. | 1860 | 746 |
| Valenczeer Gebirge g. | 60 | 448 |
| Verona g. | 64 | 246 |
| Vertes-Gebirge g. | 62 | 886 |
| Vesuv g. | 65 | 31 |
| „ | 66 | 667 |
| „ | 68 | 500 |
| „ | 68 | 553 |

| | Jahrg. | Seite |
|---|---|---|
| Vesuv g. . | 1869 | 42 |
| „ . . . | 69 | 168 |
| „ . . . | 69 | 591 |
| „ . . . | 69 | 686 |
| Vicenza g. . . | 64 | 244 |
| Victoria g. . | 1863 | 115 |
| „ p. . . | 69 | 105 |
| Vils g. . . . | 61 | 353 |
| „ . . . | 63 | 748 |
| Vlotho p. . . | 62 | 170 |
| Vöröspatak g. | 1861 | 602 |
| „ m. | 63 | 463 |
| Vogelsgebirge g. | 63 | 696 |
| Vogesen g. . | 63 | 279 |

## W.

| | | |
|---|---|---|
| Waagthal g. | 1860 | 91 |
| „ . . | 60 | 450 |
| Weinheim g. . | 63 | 262 |
| Weissenfels g. | 67 | 403 |
| Westerwald g. | 67 | 213 |
| „ | 69 | 657 |
| Westphalen p. | 63 | 628 |
| „ | 63 | 756 |
| „ g. | 67 | 222 |
| „ p. | 69 | 507 |
| Wetterau m. . | 61 | 486 |
| „ . . | 61 | 574 |
| Wetternsee g. | 61 | 709 |
| Wettersteingebirge g. | 1862 | 736 |
| Wettin m. . | 64 | 687 |
| Wieliczka p. . | 67 | 764 |
| „ g. . | 69 | 243 |
| Wien g. . . | 61 | 504 |
| „ p. . . | 62 | 125 |
| „ . . . | 62 | 621 |
| „ . . . | 64 | 381 |
| „ g. . . | 64 | 858 |
| Wight g. . . | 64 | 731 |
| Wittichen m. . | 68 | 385 |
| „ . | 68 | 749 |
| Wittichen m. | 1869 | 205 |
| „ . | 69 | 862 |
| Wolfach m. . | 69 | 390 |
| Wolga g. . . | 61 | 228 |
| Wollin g . . | 61 | 860 |
| Wolkenburg g | 61 | 359 |
| Württemberg. m. | 60 | 611 |
| Würzburg g. . | 65 | 747 |
| „ . . | 68 | 234 |
| „ . . | 68 | 362 |
| „ . . | 68 | 623 |
| Wurzbach p. . | 64 | 1 |

## Y.

| | | |
|---|---|---|
| Yorkshire p. | 1861 | 752 |
| Ytterby m. . . | 60 | 790 |

## Z.

| | | |
|---|---|---|
| Zaleszcyky g. | 1862 | 327 |
| Zeitz g. . . . | 67 | 403 |
| Ziegelhausen g. | 63 | 259 |
| „ | 67 | 322 |
| Ziegelhausen g. | 69 | 714 |


## Berichtigung.

S. 1 Z. 6 von unten liess Deutschbrod statt Deutschland.

Allgemeines

# Repertorium

der

## Mineralogie, Geologie und Paläontologie

für das

Decennium 1860—1869.

**Ein Real-, Personal- und Lokal-Index**

zu den in

**Leonhard's & Geinitz's** Neuem Jahrbuch

für

Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Jahrgänge 1860—1869, enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Auszügen.

STUTTGART.

Druck und Verlag von Friedrich Schweizerbart.

1870.

Früher erschienen im gleichen Verlage:

**Repertorium, allgemeines**, der Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde. Ein Personal-, Real- und Local-Index zu den im »Neuen Jahrbuche« etc. enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Auszügen

für das Decennium 1830—1839, fl. 3. 20 kr. — R. 2. —
» » » 1840—1849, fl. 2. 24 kr. — R. 1. 15 sgr.
» » » 1850—1859, fl. 5. 48 kr. — R. 3. 10 sgr.

---

Neu eingetretene Abonnenten auf das

## Neue Jahrbuch für Mineralogie &c.

erlaube ich mir auf Nachstehendes aufmerksam zu machen:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| die Jahrgänge | 1833—1834, | (4 Hefte) | kosten | je | fl. | 6. | — | kr. | R. 3. | 20 sgr. |
| » | 1835—1840, | (6 » ) | » | je | » | 8. | — | » | » 4. | 25 » |
| » | 1841—1851, | (7 » ) | » | je | » | 9. | 20 | » | » 5. | 20 » |
| » | 1852, | (8 » ) | » | | » | 10. | 40 | » | » 6. | 15 » |
| » | 1853—1861, | (7 » ) | » | je | » | 9. | 20 | » | » 5. | 20 » |
| » | 1862, | (8 » ) | » | | » | 10. | 40 | » | » 6. | 15 » |
| » | 1863—1865, | (7 » ) | » | je | » | 9. | 20 | » | » 5. | 20 » |
| » | 1866—1869, | (7 » ) | » | | » | 10. | 48 | » | » 6. | 12 » |

Wer eine grössere Anzahl von Jahrgängen auf Einmal gegen baar bezieht, erhält sie zu einem bedeutend ermässigten Preise; dabei bemerke ich jedoch, dass von den ersten Jahrgängen nur noch 1 Ex. vorhanden ist.

Friedrich Schweizerbart.

891

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01368 9872